

COVID-19

BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE

(16 DÉCEMBRE 2022)

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#).

TABLE DES MATIÈRES

1. Points clés	2
2. Indicateurs clés - tendances	3
2.1. Tendances.....	4
2.2. Situation récente.....	5
2.3. Stratégie de gestion de l'épidémie.....	6
3. Description de l'épidémie à partir du 30/05/22	7
3.1. Distribution et évolution des cas de COVID-19	7
3.2. Tests COVID-19	8
3.3. Surveillance moléculaire du SARS-CoV-2.....	13
3.4. Vaccination	14
3.5. Hospitalisations pour COVID-19.....	24
3.6. Évolution de la mortalité COVID-19.....	27
3.7. Surveillance de la mortalité (toutes causes confondues).....	30
3.8. Surveillance en maison de repos et de soins	33
3.9. Situation COVID-19 pour les enfants.....	36
3.10. Surveillance basée sur les eaux usées	37
3.11. Surveillance par des médecins généralistes	40
3.12. Absences au travail pour cause de maladie	42
3.13. Ligne de temps: cas confirmés de COVID-19 et réponse à l'épidémie en Belgique.....	44
4. Modélisation	46
4.1. Taux de reproduction (R_t).....	46
4.2. Modèle de prédiction à court terme pour les nouvelles hospitalisations	48
4.3. Modèle de prédiction du taux d'occupation des lits en soins intensifs	49
5. Annexes	50
5.1. Résumé des indicateurs clés.....	50
5.2. Nombre de personnes diagnostiquées (PCR et antigène) entre le 7 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, présenté par jour et moyenne par semaine	51
5.3. Nombre de tests réalisés entre le 7 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, présenté par jour et moyenne par semaine.....	52
5.4. Nombre de personnes hospitalisées entre le 10 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, présenté par jour et moyenne par semaine	53
5.5. Nombre de personnes décédées entre le 7 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, présenté par jour et moyenne par semaine	54
5.6. Cas, hospitalisations, admissions en soins intensifs et taux de mortalité de patients Covid-19 par région, tranche d'âge et status vaccinal.	55

1. Points clés

- **Situation générale** : L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas pour la Belgique est de 157/100 000 habitants, l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 5,8/100 000 habitants.
- **Nombre de nouveaux cas** : Au niveau national, le nombre de nouveaux cas rapportés a encore augmenté (+ 21 %), au cours de la période du 5 au 11 décembre 2022 comparé à la période précédente de 7 jours. Le Rt, basé sur le nombre de cas diagnostiqués pour cette même période reste supérieur à 1 (1,109).
- **Tests et taux de positivité** : Le nombre de tests effectués a encore augmenté, avec une moyenne de 8 697 tests par jour au cours de la période 5 au 11 décembre 2022. Le taux de positivité pour la Belgique pour cette même période a également légèrement augmenté (17,4 %).
- **Hospitalisations** : Le nombre de nouvelles hospitalisations et le nombre de lits occupés aux soins intensifs ont augmenté au cours de la période du 8 au 14 décembre, comparé à la période précédente de 7 jours (+ 37 % et + 32 % respectivement).
- **Mortalité** : La mortalité liée au COVID-19 a également augmenté en semaine 49. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l'hôpital. La semaine 47 n'a pas présenté de surmortalité statistiquement significative au niveau national.
- **Vaccination** : L'efficacité vaccinale de la 1ère dose de rappel, chez les 65 ans et plus, est estimée à 76,5 % contre les hospitalisations et 86,7 % contre les admissions en USI pour les 50 premiers jours après son administration. La couverture vaccinale pour la deuxième dose de rappel était de 72,2 % pour les personnes âgées de 65 à 84 ans et de 71,2 % pour les personnes âgées de 85 ans et plus.
- **Surveillance par les médecins généralistes** : Le nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a légèrement augmenté au niveau national au cours de la semaine 49 (14 contacts cette semaine pour 100 000 habitants par jour, comparé à 13 la semaine précédente). L'incidence des consultations auprès d'un généraliste pour des symptômes grippaux a également augmenté, avec 206 consultations pour 100 000 habitants au cours de cette semaine. - voir [section 3.11](#).
- **Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS)** : Au niveau national, la situation épidémiologique montre toujours une augmentation de l'ensemble des indicateurs (nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations parmi les résidents de MR/MRS, nombre de nouveaux cas parmi les membres du personnel et nombre de clusters). - voir [section 3.8](#).
- **Surveillance basée sur les eaux usées** : Les résultats du 7 décembre 2022 montrent que les charges virales détectées dans les eaux usées ont encore augmenté dans les trois régions. – voir [section 3.10](#).

2. Indicateurs clés - tendances

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 6](#) de ce bulletin.

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	4 658 298	1 175	1 419*	+21%
Admis à l'hôpital	143 020***	80,0	109,4**	+37%
Décédés****	33 155	3,9	7,3*	+89%
<i>En hôpital</i>	22 523	3,1	7,1	+127%
<i>En maison de repos</i>	10 441	0,7	0,1	-80%

*Du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 8 décembre 2022 au 14 décembre 2022.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Mercredi 7 décembre 2022	Mercredi 14 décembre 2022	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 203	1 586	+32%
Nombre de lits USI occupés	53	70	+32%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

2.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


2.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe des cas rapportés pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 28/11/22 et le 11/12/22



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 28/11/22 et le 11/12/22



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges, voir point 2.4 du document [questions fréquemment posées](#).

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 148 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	28/11/22- 04/12/22	05/12/22- 11/12/22	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
Belgique	8 226	9 936	1 710	+21%	26	157
Antwerpen	1 205	1 376	171	+14%	37	137
Brabant wallon	447	490	43	+10%	53	229
Hainaut	1 098	1 397	299	+27%	20	185
Liège***	644	811	167	+26%	21	131
Limburg	551	663	112	+20%	26	137
Luxembourg	220	222	2	+1%	536	152
Namur	330	536	206	+62%	10	173
Oost-Vlaanderen	1 013	1 323	310	+31%	18	151
Vlaams-Brabant	858	1 011	153	+18%	30	159
West-Vlaanderen	739	898	159	+22%	25	135
Région bruxelloise	1 021	1 106	85	+8%	61	174
Deutschsprachige Gemeinschaft	24	40	16	+67%	9	81

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL.

***Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

2.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

Il a été demandé au Risk Assessment Group (RAG) de proposer des niveaux de gestion qui visent à soutenir une prise de décision politique, au niveau local ou national, quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque les seuils sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique en souligne le besoin. La décision concernant les mesures à prendre reste toujours une décision politique, qui prend en compte l'analyse et l'avis du RAG, mais également d'autres éléments considérés utiles. Les niveaux de gestion ne sont donc pas à considérer comme un outil mécanistique ou déterministe, mais comme un outil d'aide à la prise de décision politique.

Trois niveaux de gestion ont été déterminés pour permettre aux différents intervenants de coordonner leurs actions. Les indicateurs et les seuils utilisés pour la gestion du risque ont été déterminés par le RAG et sont publiés dans [l'avis du RAG du 15 décembre 2021](#).

Chaque semaine, le mercredi, le RAG détermine le niveau de gestion, au niveau national et provincial, sur base d'une évaluation de la situation épidémiologique qui tient compte, entre autre, des indicateurs suivants: le nombre de nouvelles hospitalisations, la proportion de lits en soins intensifs (USI) occupés par des patients confirmés COVID-19, le nombre de consultations pour suspicion de COVID-19 chez les médecins généralistes, l'incidence des infections sur 14 jours, la valeur R_t basée sur le nombre de cas et le taux de positivité. D'autres indicateurs plus spécifiques comme la charge de travail des médecins généralistes ou encore la couverture vaccinale peuvent également être analysés si nécessaire.

Selon [la dernière évaluation épidémiologique du RAG](#), la Belgique est au **niveau de gestion 2**, avec une augmentation du nombre de cas et une augmentation des indicateurs hospitaliers


3. Description de l'épidémie à partir du 30/05/22

Nous présentons les données à partir de la semaine du 30 mai 2022, semaine qui marque le début de la septième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#).

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022, 9 936 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 9 936 nouveaux cas, 5 271 (53%) étaient rapportés en Flandre, 3 456 (35%) en Wallonie, dont 40 cas pour la communauté germanophone, et 1 106 (11%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 103 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par semaine (date de diagnostic*) à partir de la semaine 22




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 14 décembre 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 30/05/22



Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par région à partir du 30/05/22




Les dénominateurs utilisés pour calculer l'incidence sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL.

Vous trouverez un résumé de la situation épidémiologique en Europe sur [le site web de l'ECDC](#).

3.2. TESTS COVID-19

3.2.1. Tests COVID-19 effectués et taux de positivité par province et par tranche d'âge

Au cours de la période du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022, 60 880 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 8 697 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 17,4%.



Note : Les données présentées n'incluent pas les données de la semaine en cours car celles-ci ne sont pas encore toutes consolidées.

Note : La plateforme fédérale de test n'est plus en activité depuis le 23 novembre 2022.

*Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

**Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'événements,.... Les autotests ne sont pas inclus.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022 (dernière période de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	5 814	468	355	6,1%
10-19	5 344	402	652	12,2%
20-39	12 968	446	2 603	20,1%
40-64	17 009	444	3 694	21,7%
65+	19 355	853	3 230	16,7%

*L'âge n'était pas disponible pour 390 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 30 mai 2022, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 30/05/22



Note : les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests effectués par groupe d'âge à partir du 30/05/22



Note : les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022 (dernière période de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	60 880	526	10 602	17,4%
Antwerpen	9 786	519	1 446	14,8%
Brabant wallon	2 380	581	515	21,6%
Hainaut	8 039	595	1 486	18,5%
Liège**	4 329	390	848	19,6%
Limburg	3 995	451	723	18,1%
Luxembourg	1 238	425	257	20,8%
Namur	2 687	538	545	20,3%
Oost-Vlaanderen	8 405	544	1 424	16,9%
Vlaams-Brabant	5 642	481	1 082	19,2%
West-Vlaanderen	7 516	622	972	12,9%
Région bruxelloise	6 335	518	1 197	18,9%
Deutschsprachige Gemeinschaft	260	331	43	16,5%


*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

**Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 05/12/22 et le 11/12/22



Taux de positivité par province entre le 05/12/22 et le 11/12/22




3.2.2. Tests rapides antigéniques COVID-19 effectués et rapportés par les pharmaciens

Depuis mi-juillet 2021, les pharmaciens ont la possibilité d'effectuer des tests antigéniques rapides pour les citoyens de plus de 6 ans ne présentant pas de symptômes de COVID-19 et ayant besoin d'un certificat COVID-19 pour un voyage ou un événement. Depuis le 1er novembre 2021 ils ont également la possibilité d'effectuer ces tests pour les voyageurs revenant d'une zone rouge et pour les personnes symptomatiques. Les pharmaciens participent de façon volontaire et rapportent les résultats des tests effectués à Sciensano. Ceci permet la création d'un certificat de test si le test s'avère négatif et le déclenchement du suivi des contacts et autres mesures si le test s'avère positif. Les données rapportées par les pharmaciens sont présentées ci-dessous.

Au cours de la période du 05/12/22 au 11/12/22 (semaine 49), 7 549 tests ont été effectués par les pharmaciens. Le taux de positivité pour la même période est de 25,3%.

Tests effectués et rapportés par les pharmacies et taux de positivité, par indication et par semaine à partir de la semaine 22



Note : Les données présentées n'incluent pas les données de la semaine en cours car celles-ci ne sont pas encore toutes consolidées.

3.2.3. Indications des prescriptions de tests COVID-19

En raison d'un problème technique, il n'est pas possible de faire le point sur les indications des tests COVID-19 prescrits cette semaine. Vous trouverez dans la section précédente les informations sur les indications spécifiques aux tests effectués et rapportés dans les pharmacies. Vous trouverez les dernières données disponibles concernant les indications des autres tests dans le bulletin hebdomadaire COVID-19 du 9 décembre 2022.

3.3. SURVEILLANCE MOLÉCULAIRE DU SARS-COV-2

En raison d'un problème technique, il n'est pas possible de faire le point sur la surveillance moléculaire du SARS-CoV-2 cette semaine. Vous trouverez les dernières données disponibles dans le bulletin hebdomadaire COVID-19 du 9 décembre 2022.

3.4. VACCINATION

3.4.1. Nombre de vaccinations et couverture

Le 28 décembre 2020, la phase pilote de la campagne de vaccination COVID-19, limitée à un nombre restreint de centres de soins résidentiels, a débuté en Belgique. [La campagne de vaccination](#) officielle a démarré le 5 janvier 2021.

Toutes les doses de vaccins COVID-19 administrées en Belgique sont, tel que défini par la loi, enregistrées dans [Vaccinnet+](#), le registre national des vaccins COVID-19. Seules les vaccinations enregistrées dans cette base de données sont incluses dans les chiffres et les analyses de Sciensano. Toutefois, un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible¹. La répartition géographique indiquée dans ce rapport est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du site de vaccination (les personnes dont le code postal est inconnu ne sont pas incluses dans les résultats présentant une distribution géographique).

Depuis septembre 2021, une ou plusieurs doses de rappel² sont administrées aux personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination et qui y sont éligibles. Au 12 décembre 2022, un total de 29 074 827 doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+. Cela correspond à une augmentation de 17 647 doses par rapport au nombre enregistré au 5 décembre 2022. Sept vaccins différents sont actuellement utilisés : Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), Spikevax® (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson), Nuvaxovid (Novavax), Comirnaty® Original/Omicron BA.1 (Pfizer/BioNtech), Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer/BioNtech) et Spikevax® Original/Omicron BA.1 (Moderna). Le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) n'est plus administré en Belgique. Le tableau ci-dessous présente **la contribution de chaque marque de vaccin à la couverture vaccinale globale en Belgique, pour chaque schéma de vaccination (nombre de doses)**.

¹ Sur l'ensemble des vaccinations enregistrées jusqu'au 12 décembre 2022, 94,8% ont été enregistrées dans les 3 jours suivant la date d'administration du vaccin.

² Le terme « dose de rappel » utilisé dans ce rapport inclut à la fois les doses additionnelles administrées aux personnes immunodéprimées pour compléter leur schéma de vaccination initial ainsi que les doses de rappel administrées à la population générale.

	Primo-vaccination complète ⁽¹⁾	1 ^{ère} dose de rappel	2 ^{nde} dose de rappel ⁽²⁾
Comirnaty® (Pfizer/BioNtech)	6 691 302 (72.28%)	4 321 971 (59.70%)	706 130 (18.41%)
Spikevax® (Moderna)	701 750 (7.58%)	2 883 939 (39.84%)	41 823 (1.09%)
COVID-19 Janssen® (Johnson & Johnson)	430 546 (4.65%)	527 (0.01%)	126 (0.00%)
Vaxzevria® (AstraZeneca-Oxford)	1 432 656 (15.48%)	0	0
Nuvaxovid (Novavax)	1 095 (0.01%)	280 (0.00%)	107 (0.00%)
Comirnaty® Original/Omicron BA.1 (Pfizer/BioNtech)	0	21 821 (0.30%)	2 628 648 (68.52%)
Spikevax® Original/Omicron BA.1 (Moderna)	0	487 (0.01%)	60 288 (1.57%)
Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer/BioNtech)	0	10 204 (0.14%)	399 400 (10.41%)

⁽¹⁾ Les schémas de primo-vaccination se basent sur la 1^{ère} dose de vaccin COVID-19 reçue.

⁽²⁾ Les chiffres du tableau ci-dessus peuvent être sujets à des modifications.


Le tableau ci-dessous présente la couverture vaccinale pour les personnes (population totale) **ayant complété un schéma de primo-vaccination, celles ayant reçu une dose de rappel ou deux doses de rappel**. En outre, le tableau indique le nombre total de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination et celles ayant reçu une et deux doses de rappel, depuis le début de la campagne de vaccination et au cours des sept derniers jours, pour la Belgique et par région/communauté.

		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie ⁽¹⁾	Communauté germanophone
Primo-vaccination complète	Nombre de personnes vaccinées	9 105 928	755 576	5 609 498	2 618 942	55 342
	Augmentation au cours des 7 derniers jours	281	27	232	13	0
	Couverture vaccinale (% de la population totale) ⁽²⁾	78,6%	61,8%	83,7%	73,1%	70,4%
Primo-vaccination complète + 1 dose de rappel	Nombre de personnes vaccinées	7 227 152	478 419	4 728 184	1 949 968	42 339
	Augmentation au cours des 7 derniers jours	563	140	230	170	1
	Couverture vaccinale (% de la population totale) ⁽²⁾	62,4%	39,1%	70,6%	54,4%	53,9%
Primo-vaccination complète + 2 doses de rappel	Nombre de personnes vaccinées	3 836 522	159 767	2 939 889	714 627	14 926
	Augmentation au cours des 7 derniers jours	12 284	2 273	5 630	4 239	79
	Couverture vaccinale (% de la population totale) ⁽²⁾	33,1%	13,1%	43,9%	19,9%	19%

⁽¹⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.


⁽²⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

La figure ci-dessous représente **les couvertures vaccinales par genre et groupe d'âge** dans l'ensemble de la population. Le 12 décembre 2022, la couverture vaccinale de primo-vaccination complète pour les femmes âgées de 18 ans et plus était de 90%, et de 89,7% pour les hommes. La couverture vaccinale pour la dose de rappel était de 77,1% pour les femmes de 18 ans et plus et de 75,7% pour les hommes de ce groupe d'âge. La couverture vaccinale pour 2 doses de rappel était de 42,5% pour les femmes de 18 ans et plus et de 40% pour les hommes de ce groupe d'âge.




Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

Les cartes ci-dessous montrent **la couverture vaccinale pour les personnes ayant reçu une dose de rappel (à gauche) et une seconde dose de rappel (à droite)**, pour la population belge âgée de 18 ans et plus, par province.



Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution de la couverture vaccinale des personnes âgées de 18 ans et plus ayant reçu une dose de rappel (à gauche) et une seconde dose de rappel (à droite), pour la Belgique, par région/communauté et par date d'administration du vaccin.



Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

Le tableau ci-dessous présente la couverture vaccinale pour une et deux doses de rappel, au 12 décembre 2022, pour la Belgique, par région/communauté et par groupe d'âge.

Groupe d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie ⁽¹⁾	Communauté germanophone
18 ans et plus	Couverture vaccinale pour une dose de rappel ⁽²⁾ (%)	76,3%	49,9%	85,0%	67,8%	66,2%
	Couverture vaccinale pour deux doses de rappel ⁽²⁾ (%)	41,3%	16,8%	54,2%	25,0%	23,5%
50 ans et plus	Couverture vaccinale pour une dose de rappel ⁽²⁾ (%)	87,7%	67,7%	93,1%	81,6%	77,4%
	Couverture vaccinale pour deux doses de rappel ⁽²⁾ (%)	61,5%	34,3%	73,4%	45,2%	35,2%
12 à 17 ans	Couverture vaccinale pour une dose de rappel ⁽²⁾ (%)	19,6%	5,5%	30,5%	5,5%	8,4%
	Couverture vaccinale pour deux doses de rappel ^(2,3) (%)	-	-	-	-	-
18 à 64 ans	Couverture vaccinale pour une dose de rappel ⁽²⁾ (%)	71,3%	44,5%	81,3%	61,8%	60,0%
	Couverture vaccinale pour deux doses de rappel ⁽²⁾ (%)	31,3%	10,6%	44,3%	14,9%	16,0%
65 à 84 ans	Couverture vaccinale pour une dose de rappel ⁽²⁾ (%)	91,6%	75,8%	95,5%	86,8%	85,0%
	Couverture vaccinale pour deux doses de rappel ⁽²⁾ (%)	72,2%	46,3%	83,0%	56,7%	46,4%
85 ans et plus	Couverture vaccinale pour une dose de rappel ⁽²⁾ (%)	92,3%	82,3%	96,0%	86,5%	83,0%
	Couverture vaccinale pour deux doses de rappel ⁽²⁾ (%)	71,2%	53,9%	80,2%	55,8%	45,1%

⁽¹⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

⁽²⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

⁽³⁾ Une seconde dose de rappel n'est pas actuellement recommandée pour tous les jeunes de 12 à 17 ans.

Le tableau ci-dessous présente la couverture vaccinale atteinte au 12 décembre 2022 chez les enfants âgés de moins de 18 ans ayant complété un schéma de primo-vaccination. Le tableau indique également le nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 17 ans ayant complété un schéma de primo-vaccination, depuis le début de la campagne de vaccination et au cours des sept derniers jours, pour la Belgique et par région/communauté.

		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie ⁽¹⁾	Communauté germanophone
5 à 11 ans	Nombre de personnes avec un schéma de primo-vaccination complet	227 934	7 848	190 398	28 401	816
	Augmentation au cours des 7 derniers jours	49	4	39	4	0
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽²⁾ (%)	24,7%	7,2%	36,8%	9,8%	13,7%
12 à 17 ans	Nombre de personnes avec un schéma de primo-vaccination complet	605 649	38 659	385 827	175 744	3 319
	Augmentation au cours des 7 derniers jours	26	1	24	0	0
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽²⁾ (%)	75,5%	44,8%	85,6%	67,5%	65%

⁽¹⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

⁽²⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

Les personnes immunodéprimées représentent une population particulièrement vulnérable aux infections causées par le SARS-CoV-2, avec un risque élevé de développer une forme sévère de la maladie COVID-19. Depuis le début de la campagne de vaccination, ces personnes ont fait l'objet de plusieurs recommandations et ont été invitées à plusieurs reprises à recevoir des doses supplémentaires de vaccin COVID-19. En Belgique jusqu'au 12 décembre 2022, 66,0% des personnes immunodéprimées ont reçu **2 doses de vaccin** et 45,6% ont reçu **3 doses de vaccin, après avoir complété un schéma de primo-vaccination**³.

³ Pour plus d'informations sur la méthode de calcul de la couverture vaccinale chez les personnes immunodéprimées, veuillez-vous référer à la section 10.4 du document des [questions fréquemment posées](#). Les informations présentées relatives aux personnes immunodéprimées proviennent de l'association entre le registre Vaccinnet+ et les données transmises par l'Agence Inter-Mutualiste.

3.4.2. Efficacité vaccinale

Sciensano dispose du statut vaccinal des personnes qui développent une infection COVID-19 et celui d'une partie des personnes qui nécessitent une hospitalisation ou une admission en unité de soins intensifs (USI). Ces données permettent la surveillance de l'impact de la vaccination sur le développement des infections COVID-19.


Jusqu'en août 2022 ce rapport présentait une estimation préliminaire de l'impact de la vaccination en montrant les incidences cumulées sur 14 jours, par groupes d'âge et statut vaccinal, et en calculant la réduction relative du risque (RRR) pour plusieurs évènements. Ces calculs ne tiennent pas compte de différences inhérentes entre les groupes ayant un statut vaccinal différent, telles que la fragilité (par exemple les pathologies ou troubles sous-jacents), le comportement ou la fréquence de dépistage entre les populations vaccinées et non vaccinées.

Afin d'intégrer certaines des distinctions susmentionnées, une nouvelle approche de l'impact de la vaccination, estimée au travers de l'efficacité vaccinale, est dorénavant présentée dans ce rapport. Ces estimations étant relativement stables, les graphiques présentés ci-dessous seront mis à jour de manière moins régulière. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée dans cette section, veuillez consulter les sections 10.7 et 10.8 du document ["Questions fréquemment posées"](#).

3.4.2.1. Surveillance des cas confirmés de COVID-19

Les graphiques ci-dessous présentent **une estimation de l'efficacité de la vaccination contre une infection symptomatique** pour les groupes d'âge de 5-17 ans, 18-44 ans, 45-64 ans et 65 ans et plus, à partir du 3 janvier 2022 (>80% des cas infectés avec le variant Omicron) et 20 novembre 2022 inclus. Pour chaque groupe d'âge, les statuts vaccinaux (les plus) pertinents sont présentés : pour les personnes de moins de 45 ans, l'impact d'un schéma de primo-vaccination complète et de la 1^{ère} dose de rappel est présenté ; pour les personnes de plus de 45 ans, l'impact de la 1^{ère} et de la 2^{ème} dose de rappel est présenté. Une première ou seconde dose de rappel peut être administrée au moins 3 mois (90 jours) après la dose précédente, lorsque la protection contre une infection symptomatique a diminué comparativement à la protection initiale offerte. Par exemple : pour les personnes âgées de 65 ans et plus et n'ayant jamais été infectées par le COVID-19, la protection par le premier rappel contre les infections symptomatiques est estimée à 28,0% après 100-150 jours, et est rétablie à 41,1% après avoir reçu une seconde dose de rappel.

En outre, la protection offerte par la combinaison de la vaccination et d'une infection antérieure (toute infection survenue depuis 2020) est également représentée dans les graphiques. L'axe des abscisses indique le nombre de jours suivant le début de la protection vaccinale (après la dernière dose + 14 jours), ce qui permet de suivre la durée de la protection. Pour tous les cas étudiés, le groupe de comparaison est constitué d'individus du même groupe d'âge qui n'ont pas été vaccinés et n'ont pas connu d'infection antérieure au COVID-19.



Les lignes verticales autour de chaque point du graphique représentent l'intervalle de confiance à 95%. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation de l'efficacité vaccinale est précise.

Le tableau ci-dessous présente une estimation du niveau de protection contre une infection symptomatique apportée par au moins une infection contractée depuis 2020 chez des individus non-vaccinés. Ceux-ci sont comparés à des individus non vaccinés n'ayant pas connu d'infection depuis le début de la pandémie.

Groupe d'âge	Protection estimée contre une infection symptomatique (intervalle de confiance de 95%)
5 à 17 ans	28,3% (26,6% - 30,1%)
18 à 44 ans	34,2% (32,7% - 35,7%)
45 à 64 ans	38,3% (35,7% - 40,7%)
65 ans et plus	46,6% (39,9% - 52,6%)


Les valeurs du tableau ci-dessus peuvent être interprétées comme suit : chez les personnes non vaccinées de 65 ans et plus, qui ont connu au moins une infection depuis 2020, la réduction du développement d'une infection symptomatique est de 46,6%, par rapport aux personnes non vaccinées sans infection antérieure (intervalle de confiance à 95%: 39,9% à 52,6%).

3.4.2.2. Surveillance hospitalière COVID-19

La [surveillance clinique](#) des patients hospitalisés suite à une infection COVID-19 permet de recueillir des données individuelles qui peuvent être reliées aux données de Vaccinnet+. Cela permet de déterminer le statut vaccinal des patients hospitalisés. Cependant ces données sont obtenues avec un certain délai (1 à 4 semaines) et seule une partie de toutes les hospitalisations liées au COVID-19 est rapportée, la participation à cette surveillance étant volontaire et non obligatoire pour les hôpitaux.

a) Admissions à l'hôpital


Les graphiques ci-dessous montrent **une estimation de l'efficacité de la vaccination contre une hospitalisation, suite à une infection COVID-19**, pour les groupes d'âge de 45-64 ans et 65 ans et plus, à partir du 3 janvier 2022 (>80% des cas infectés avec le variant Omicron) et jusqu'au 20 novembre 2022 inclus. Pour les plus jeunes (dont l'âge est inférieur à 45 ans), le nombre d'hospitalisations est très faible et par conséquent l'efficacité de la vaccination ne peut être calculée. Les personnes hospitalisées et ayant connu une infection antérieure (toute infection survenue depuis 2020) représentent un faible nombre d'individus, ainsi l'efficacité de la vaccination ne peut être également calculée. L'axe des abscisses indique le nombre de jours suivant le début de la protection vaccinale (après la dernière dose + 14 jours), ce qui permet de suivre la durée de la protection. Pour tous les cas étudiés, le groupe de comparaison est constitué d'individus du même groupe d'âge qui n'ont pas été vaccinés et n'ont pas connu d'infection antérieure au COVID-19.



Les lignes verticales autour de chaque point du graphique représentent l'intervalle de confiance à 95%. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation de l'efficacité vaccinale est précise.

b) Admissions en USI

Les graphiques ci-dessous montrent une estimation de l'efficacité de la vaccination contre une admission en USI, suite à une infection COVID-19, pour les groupes d'âge de 45-64 ans et 65 ans et plus à partir du 3 janvier 2022 (>80% des cas infectés avec le variant Omicron) et jusqu'au 20 novembre 2022 inclus. Pour les plus jeunes (dont l'âge est inférieur à 45 ans), le nombre d'admissions en USI est très faible et par conséquent l'efficacité de la vaccination ne peut être calculée. Les personnes admises en USI et ayant connu une infection antérieure (toute infection survenue depuis 2020) représentent un faible nombre d'individus, ainsi l'efficacité de la vaccination ne peut être également calculée. L'axe des abscisses indique le nombre de jours suivant le début de la protection vaccinale (après la dernière dose + 14 jours), permettant de suivre la durée de la protection. Pour tous les cas étudiés, le groupe de comparaison est constitué d'individus du même groupe d'âge qui n'ont pas été vaccinés et n'ont pas connu d'infection antérieure au COVID-19.




Les lignes verticales autour de chaque point du graphique représentent l'intervalle de confiance à 95%. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation de l'efficacité vaccinale est précise.

3.5. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


3.5.1. Situation dans les hôpitaux

Au cours de la période du 8 décembre 2022 au 14 décembre 2022, 766 patients ont été hospitalisés en raison de COVID-19 (“hospitalisation pour COVID-19”) et 712 patients ont été hospitalisés pour une autre raison mais ont été testés positifs au COVID-19 dans le cadre d’un screening (“hospitalisation avec COVID-19”). Les figures ci-dessous présentent l’évolution des entrées à l’hôpital pour et avec COVID-19. Sur cette même période, 946 personnes ont quitté l’hôpital (incluant les patients hospitalisés avec COVID-19).

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Note : Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 14 décembre 2022, 1 586 lits d’hôpital dont 70 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 20 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 0 une ECMO (Oxygénation par membrane extra-corporelle). Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 383, dont 17 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre de cas hospitalisés (données rapportées une fois par semaine)



Nombre d'hôpitaux participants : 103 (14 décembre 2022)


3.5.2. Provenance des patients hospitalisés pour COVID-19

Le nombre de nouvelles hospitalisations que nous rapportons comprend uniquement les patients présentant une infection COVID-19 confirmée et admis en raison de celle-ci. Les patients admis en raison d'une pathologie différente mais ayant un test positif au COVID-19 sont exclus. Les admissions hospitalières de patients avec une infection COVID-19 confirmée sont classées dans le graphe ci-dessous en fonction de la provenance des patients. Cela nous permet d'avoir une vue sur le nombre de nouveaux patients COVID-19 venant d'une maison de repos ou d'une autre institution de soins de longue durée.

Sur les 766 admissions rapportées pour la période du 8 décembre 2022 au 14 décembre 2022, 738 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 63 (sur les 738) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

La figure ci-dessous indique l'évolution du nombre de nouvelles hospitalisations COVID-19 pour l'ensemble des patients et pour les résidents de MR/MRS, ainsi que le pourcentage de résidents de MR/MRS parmi les patients hospitalisés.

Évolution des hospitalisations et de la proportion de résidents de MR/MRS admis, Belgique



Les caractéristiques des patients hospitalisés sont décrites dans [un rapport](#) publiés toutes les deux semaines.

3.5.3. Taux d'occupation des lits en USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 14 décembre 2022. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.

	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	70	4%
Antwerpen	301	8	3%
Brabant wallon	23	1	4%
Hainaut	259	9	3%
Limburg	145	2	1%
Liège	230	10	4%
Luxembourg	43	2	5%
Namur	97	2	2%
Oost-Vlaanderen	265	9	3%
Vlaams-Brabant	139	7	5%
West-Vlaanderen	221	8	4%
Région bruxelloise	269	12	4%


*Nombre total de lits USI accrédités en novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

3.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


3.6.1. Mortalité par région

Pour la période du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022, 51 décès ont été rapportés, 57% étaient des hommes et 43% des femmes; 29 en Flandre, 13 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Les décès sont présentés par semaine, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et par semaine




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et par semaine, depuis la semaine 22




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et par semaine




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et par semaine



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du taux hebdomadaire de mortalité COVID-19 par groupe d'âge et évolution de l'âge médian des personnes décédées.



Total des décès rapportés du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	28	97%	9	100%	13	100%	50	98%
<i>Cas confirmés</i>	28	100%	9	100%	13	100%	50	100%
<i>Cas possibles</i>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Maison de repos	1	3%	0	0%	0	0%	1	2%
<i>Cas confirmés</i>	0	0%	0	N/A	0	N/A	0	0%
<i>Cas possibles</i>	1	100%	0	N/A	0	N/A	1	100%
Autres collectivités résidentielles	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Domicile et autre	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	29	100%	9	100%	13	100%	51	100%

Les décès à l'hôpital incluent les résidents de maison de repos et maison de repos et de soin qui décèdent à l'hôpital. Des analyses complémentaires concernant les décès des résidents de maison de repos sont présentés dans le chapitre ci-dessous sur les maisons de repos.

Pour plus d'informations sur le lieu de décès, veuillez consulter le point 6 du document [questions fréquemment posées](#).

3.6.2. Mortalité par province

Le tableau ci-dessous indique la répartition des décès survenus du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022 ainsi que le taux de décès par 100 000 habitants, par province et pour la Région bruxelloise.

Provinces*	Nombre de décès	Taux de décès par 100 000 habitants
Antwerpen	11	0,58
Brabant wallon	0	0,00
Hainaut	8	0,59
Liège	3	0,27
Limburg	2	0,23
Luxembourg	0	0,00
Namur	2	0,40
Oost-Vlaanderen	4	0,26
Vlaams-Brabant	8	0,68
West-Vlaanderen	5	0,41
Région bruxelloise	8	0,65

*Quand la province de résidence n'est pas connue, la province où le décès a eu lieu a été utilisé

3.7. SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ (TOUTES CAUSES CONFONDUES)

3.7.1. Be-MOMO (Belgium Mortality Monitoring)

En Belgique, la surveillance de la mortalité (toutes causes confondues), Be-MOMO, est basée sur les données du Registre National. Il y a 2 semaines d'attente nécessaires pour obtenir une exhaustivité de plus de 95 %, les chiffres des dernières semaines sont donc préliminaires. Pour plus d'informations sur Be-MOMO : <https://epistat.sciensano.be/momo/>.

Plus d'information sur la surmortalité dans le [rapport sur la surmortalité durant la 1re et 2e vague de l'épidémie de COVID-19 en Belgique](#).


Plus d'information sur la surmortalité en 2021 dans le [communiqué de presse du 26 janvier 2022](#).

Plus d'information sur la surmortalité durant l'été 2022 dans le [communiqué de presse du 16 novembre 2022](#).

La semaine 47 (21 novembre 2022) n'a pas présenté de surmortalité statistiquement significative sur l'ensemble de la semaine à l'échelle de la Belgique, néanmoins nous observons un jour de surmortalité parmi l'ensemble de la population à Bruxelles, principalement chez les femmes de moins de 65 ans.

Durant la semaine 47, 1% de l'ensemble des décès observés étaient associés à la COVID-19 (1% en Flandre, 1% en Wallonie et 2% à Bruxelles).

Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 04/12/22 (sur base des données collectées jusqu'au 10/12/22), Belgique




Comment lire ce graphique ? Quand le nombre de décès par jour dépasse les limites supérieures ou inférieures des décès prévus par la modélisation (lignes pointillées grises), il y a une surmortalité ou une sous-mortalité statistiquement significative. La zone orange représente le nombre de décès lié à la COVID-19 (cas confirmés et possibles, tous lieux de décès) qui a été soustrait au nombre de décès toutes causes confondues.


Nombre de décès toutes causes confondues par semaine (Belgique)

Semaine	Date du lundi	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus (Be-MOMO)	Nombre de décès supplémentaires	Nombre de jours avec surmortalité	Excès de mortalité (%)	Taux brut de mortalité (100 000 habitants)
2022-W44	31,10,2022	1 983	2 144	-	0	-	17,1
2022-W45	07,11,2022	2 036	2 179	-	0	-	17,5
2022-W46	14,11,2022	2 057	2 211	-	0	-	17,7
2022-W47	21,11,2022	2 193	2 244	-	0	-	18,9


Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 04/12/22 (sur base des données collectées jusqu'au 10/12/22), Wallonie



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 04/12/22 (sur base des données collectées jusqu'au 10/12/22), Bruxelles



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 04/12/22 (sur base des données collectées jusqu'au 10/12/22), Flandre



La surmortalité durant l'épidémie de COVID-19

Vous trouverez un résumé de la surmortalité durant le printemps 2020 dans le [bulletin épidémiologique hebdomadaire du 19/06/2020](#).


EuroMOMO

EuroMOMO publie [un bulletin hebdomadaire](#) sur la mortalité toutes causes confondues dans les pays et régions participant au réseau de collaboration EuroMOMO. Le nombre de décès au cours des dernières semaines doit être interprété avec prudence car il y a un délai d'environ trois semaines pour obtenir des données significatives de surmortalité.

3.8. SURVEILLANCE EN MAISON DE REPOS ET DE SOINS


Afin de suivre la situation dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR/MRS), plusieurs indicateurs sont utilisés et suivis de manière hebdomadaire (du mercredi au mardi). Lors de l'interprétation de ces données, il est important de prendre en compte le taux de participation hebdomadaire (voir figure ci-dessous). Le taux de participation pour la semaine du 07/12/22 au 13/12/22 (inclus), est de 17 % en Flandre, 67 % en Wallonie, 20 % à Bruxelles et 44 % en Communauté germanophone.

Pourcentage de MR/MRS ayant envoyé leurs données au moins une fois au cours de la semaine concernée (du mercredi au mardi), depuis la semaine 22*



Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés par rapport au nombre de MR/MRS ayant participé ce jour-là, à partir du 30 mai 2022.


Pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés (le mardi), depuis la semaine 22*



*Les données pour la Wallonie ne comprennent pas celles de la communauté germanophone.

Le graphique ci-dessous montre l'incidence (nombre de nouveaux cas) par semaine (rapportés du mercredi au mardi) des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS pour 1 000 résidents, par région/communauté. La somme des nouveaux cas, rapportés une fois par semaine, est représentée sur le graphique.

Incidence par semaine des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS belges pour 1 000 résidents, par région/communauté, depuis la semaine 22.*




*Les données pour la Wallonie ne comprennent pas celles de la communauté germanophone.

Ces informations, ainsi que le nombre d'admissions à l'hôpital de résidents de MRS pour COVID-19 peuvent être consultées sur [le dashboard de Sciensano](#) (dasboard-Situation en MRS). A noter que sur le dashboard, les données sont présentées par semaine du lundi au dimanche.

Entre 5 décembre 2022 et 11 décembre 2022, 11 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 1 en MR/MRS (1 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 10 à l'hôpital (8 en Flandre, 1 à Bruxelles, 1 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux. Pour cette période, la proportion de résidents de MR/MRS par rapport au nombre total de décès COVID-19 est de 22%.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par semaine et par région des personnes de plus de 65 ans résidant ou non en maison de repos



Note : Les lignes verticales indiquent les dates auxquelles les différentes doses ont commencé à être administrées aux résidents de MR/MRS.

Nombre de décès COVID-19 (confirmés et probables) parmi les résidents des maisons de repos par lieu de décès et par région pour la période du 30/05/22 au 11/12/22

Lieu de décès	Wallonia		Flandres		Bruxelles		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	83	83	87	40	35	95	205	58
Maisons de repos	17	17	128	60	2	5	147	42
TOTAL	100	100	215	100	37	100	352	100


3.9. SITUATION COVID-19 POUR LES ENFANTS

La situation épidémiologique des enfants entre 3 et 17 ans est suivie de près depuis le début de l'épidémie.

Les graphiques utilisés dans cette section sont produits à partir de la surveillance des laboratoires cliniques qui rapportent tous les tests analysés par âge.


L'évolution du nombre de cas confirmés est calculée à partir des résultats de tests rapportés par les laboratoires. Le nombre de tests effectués (positifs et négatifs) permet d'interpréter l'évolution de l'incidence par tranche d'âge dans le contexte des changements de stratégie de testing. Les groupes d'âge utilisés pour l'analyse de l'incidence et du nombre de tests sont définis en fonction des niveaux scolaires (bien que les tranches d'âge ne correspondent pas parfaitement aux niveaux scolaires).

Incidence cumulée sur 14 jours, par tranche d'âge, par 100 000 habitants de la tranche d'âge, 30/05/22 (semaine 22) au 11/12/22 (semaine 49), Belgique.



Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires. Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires (les périodes de vacances diffèrent en Communauté française et flamande).

Nombre de tests effectués (moyenne glissante sur 7 jours) par tranche d'âge et pour 100 000 habitants de la tranche d'âge, 30/05/22 (semaine 22) au 11/12/22 (semaine 49), Belgique.



Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires. Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires (les périodes de vacances diffèrent en Communauté française et flamande).

3.10. SURVEILLANCE BASÉE SUR LES EAUX USÉES

La surveillance de la circulation du SARS-CoV-2 via les eaux usées a démarré en septembre 2020. Depuis cette date, la concentration de SARS-CoV-2 à l'entrée de 42 stations d'épuration est mesurée deux fois par semaine. Le suivi de l'évolution de la quantité de SARS-CoV-2 excrétée par les patients infectés permet de détecter une résurgence de circulation ainsi que l'atteinte de la circulation maximale lors d'une vague. Cette surveillance est considérée comme complémentaire à la surveillance basée sur les cas.

Les stations d'épuration suivies, ainsi que leur couverture géographique et de population, peuvent être consultées en ligne sur [le Dashboard COVID-19 de Sciensano](#). Au total, cette surveillance couvre 45 % de la population en Belgique, avec une couverture plus importante pour les zones citadines, telles que les régions autour de Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Charleroi.

La présente surveillance est basée sur trois indicateurs d'alertes :

- L'indicateur nommé « Haute circulation » indique les zones de circulation élevée du virus pour la semaine en cours. Cela correspond à une situation où la charge virale surpasse la moitié de la valeur la plus haute enregistrée durant la 5ème vague, qui a débuté le 27 décembre 2021. Plus d'information sur les dates des vagues peut être consulté en ligne dans la [FAQ](#) .
- L'indicateur « Augmentation rapide » indique les zones dans lesquelles la circulation virale a augmenté rapidement par rapport à la semaine précédente, avec une pente de plus de 70 %.
- Enfin, l'indicateur « Tendance à la hausse » indique les zones où les charges virales sont en hausse depuis plus de six jours.


Généralement, lorsque les charges virales dans les eaux usées commencent à augmenter dans une région, l'indicateur « Tendance à la hausse » sera le premier à devenir positif. Si les charges virales augmentent rapidement, l'indicateur « Augmentation rapide » sera alors positif. Enfin, l'indicateur « Haute circulation » deviendra positif si les charges virales atteignent des niveaux équivalents à la moitié de ceux enregistrés lors de la 5ème vague.

Les derniers résultats mesurés le 07/12/2022 durant la semaine 50 indiquent que:

- Au niveau national: Depuis le 16 novembre 2022, le nombre de zones en Tendance à la hausse augmente, avec désormais trois quarts des zones positives. L'indicateur Haute Circulation est encore positif dans moins de cinq zones. Globalement, les charges virales sont à des niveaux bas par rapport à la 5e vague et sont en augmentation.
- Au niveau régional: L'indicateur Tendance à la hausse est positif en Flandre et en Wallonie. La semaine dernière, cet indicateur était positif à Bruxelles, ce qui n'est plus le cas.

La Figure ci-dessous présente l'évolution de la somme du nombre de stations positives pour chaque indicateur. Cela permet d'avoir une vue dynamique de l'évolution des indicateurs d'alerte au niveau national.


Nombre de zones couvertes par les stations d'épuration des eaux usées présentant des indicateurs d'alerte positifs.



Les barres noires représentent le nombre de stations positives pour chaque indicateur, les barres blanches représentent le nombre total de zones considérées chaque semaine dans la surveillance des eaux usées.


La figure ci-dessous, présente une représentation géographique des trois indicateurs pour chaque zone couverte par la surveillance. La positivité des indicateurs « Haute circulation », « Augmentation rapide » et « Tendance à la hausse » est indiquée par un quartier rose, bleu et orange, respectivement.

Représentation géographique des indicateurs pour les zones couvertes par la surveillance.



Les charges virales mesurées dans chaque région sont présentées sur les figures ci-dessous, avec en parallèle l'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas.

Charge virale de SARS-CoV-2 et incidence des cas sur 14 jours dans la population couverte par la surveillance des eaux usées.



* moyenne mobile sur 14 jours du nombre de copies de SARS CoV-2 par jour et par 100 000 habitants. Les résultats des tests PCR sont exprimés en copies du virus par ml. En prenant en compte le débit à l'entrée des stations d'épuration et la population qu'elles représentent, les résultats peuvent être exprimés en copies du virus par jour et par 100 000 habitants.

Les indicateurs d'alerte pour chaque région sont repris dans le tableau ci-dessous.

Indicateurs d'alerte remplis (1) ou non (0) par région.

Régions	Couverture de la population	Haute Circulat.	Augment. Rapide	Tendance à la Hausse	Charge virale normalisée (%) ¹	Charge virale moyenne ²	Évolution de la charge virale (%/semaine) ³	Jours d'augment. ⁴
Bruxelles	100%	0	0	0	14	7.17	8	2
Flandre	41%	0	0	1	11	1.06	69	7
Wallonie	31%	0	0	1	28	0.99	23	13

¹ : la charge virale, normalisée par rapport à la charge virale maximale mesurée dans la zone correspondante durant la cinquième vague (27 décembre 2021 – 27 février 2022).

² : la charge virale calculée sur la réplique des trois fragments de gènes ciblés (N1, N2 et E). La charge virale est exprimée en 10¹² copies/jour/100 000 habitants.

³ : la pente (%/semaine) de la moyenne mobile des 7 derniers jours de la charge virale (si la concentration correspondante est supérieure à la limite de quantification estimée).

⁴ : le nombre cumulé de jours d'augmentation de la moyenne mobile des 14 derniers jours de la charge virale.

Plus d'informations sur la méthodologie et l'analyse des résultats peuvent être obtenus dans [le dernier rapport hebdomadaire](#) de la surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées ainsi que dans le document sur la [méthodologie](#), accessibles en ligne sur le site de Sciensano.

3.11. SURVEILLANCE PAR DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

3.11.1. Surveillance des syndromes grippaux par le réseau des médecins vigies


Le réseau sentinelle des médecins généralistes enregistre en continu les consultations en médecine générale pour les syndromes grippaux et les infections aiguës des voies respiratoires. Etant donné que ces symptômes peuvent être causés par des pathogènes différents du virus de la grippe, des échantillons sont prélevés de façon aléatoire et sont analysés par le Centre national de référence de la grippe. Ces échantillons sont prélevés via un écouvillon nasal et sont testés pour le virus de la grippe mais également pour un certain nombre d'autres virus respiratoires (y compris, depuis mars 2020, pour le SARS-CoV-2). Le réseau compte environ 100 cabinets de médecins généralistes répartis dans toute la Belgique qui enregistrent les données sur base volontaire.

La figure ci-dessous montre le nombre de consultations par semaine pour syndromes grippaux et infections respiratoires aiguës pour 100 000 habitants, pour les 5 dernières saisons de grippe.

Au cours de la saison de grippe de 2019-2020, une dichotomie claire a été observée, le premier pic étant expliqué par la grippe et le deuxième pic et ses ramifications par l'émergence du SARS-CoV-2. Les pics ultérieurs s'expliquent également par une vague de COVID-19 ou une épidémie de grippe.

Au cours de la semaine du 5 décembre 2022 au 11 décembre 2022, l'incidence des consultations en médecine générale pour symptômes grippaux a augmenté à 206 consultations pour 100000 habitants.

Symptômes de la grippe: Incidence des consultations chez le généraliste




3.11.2. Enregistrement des patients avec suspicion de COVID-19 dans le baromètre des médecins généralistes

Le baromètre des médecins généralistes est actif depuis octobre 2020. Il a pour but de cartographier les diagnostics de symptômes similaires à ceux du COVID-19, à savoir un cas de COVID-19 possible ou confirmé, un syndrome viral, un syndrome grippal ou une autre infection respiratoire aiguë. Le total (par diagnostic) est calculé en fin de journée sur base des diagnostics codés dans les dossiers médicaux électroniques des médecins généralistes participants.

Le nombre de consultations pour suspicion de COVID-19 chez les médecins généralistes a augmenté en semaine 48, avec une moyenne nationale de 14 contacts pour 100 000 habitants par jour, comparé à 9/100 000 la semaine précédente. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du nombre moyen de ces contacts. L'évolution est montrée pour la Belgique ainsi que pour la Flandre, la Wallonie et la Région bruxelloise.

Nombre de contact par jour pour suspicion de COVID-19 par 100 000 habitants, extrapolé à population par district et médecin généraliste




L'intégralité du bulletin hebdomadaire sur les différents virus respiratoires détectés par la surveillance hospitalière des syndromes respiratoires aigus sévères et par le réseau des laboratoires vigies, est disponible via [ce lien](#).

3.12. ABSENCES AU TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE

L'administration de l'expertise médicale (MEDEX) est responsable du contrôle de la santé des travailleurs issus du service publique fédéral. Cela permet de mesurer les conséquences des maladies, des accidents du travail ou d'autres types d'absence chez les fonctionnaires du gouvernement belge (base de données MEDEX, n = 80 529 le 1er janvier 2022). Les données MEDEX des absences journalières des fonctionnaires par maladie sont utilisées pour la surveillance, car elles peuvent être considérées comme un indicateur de l'impact du COVID-19 sur la population active. Il convient de souligner cependant que toutes les absences ne sont pas forcément liées à une infection causée par le SARS-CoV-2. De plus, les certificats de quarantaine ne sont pas inclus dans cette surveillance et ne sont donc pas repris dans les données ci-dessous.


La figure ci-dessous montre les absences journalières pour maladie chez ces fonctionnaires par rapport aux années précédentes.



Les dénominateurs par an sont basés sur le nombre de fonctionnaires enregistrés auprès de Medex au 1er janvier de l'année concernée. Source: [MEDEX](https://www.meDEX.be)


Le diagnostic apposé par le médecin est disponible sur le certificat MEDEX d'incapacité de travail. Ces données sont regroupées sur base des codes ICD 9 (Nomenclature OMS) et de texte libre. La figure ci-dessous indique le nombre de fonctionnaires atteint de maladie respiratoire, par diagnostic mentionné sur le certificat.

Nombre de fonctionnaires malades (MEDEX), par diagnostic (maladies respiratoires uniquement) mentionné sur le certificat, évolution journalière depuis le 30/05/22



Source: [MEDEX](#)

3.13. LIGNE DE TEMPS: CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 ET REPONSE À L'ÉPIDÉMIE EN BELGIQUE



*CST = COVID-safe-ticket

**La date exacte de début des phases de vaccination peut varier selon les régions, les dates indiquées sont celles de la région qui a implémenté en premier la phase de vaccination.

***Voir [les procédures](#) de sciensano pour des informations plus détaillées

Note : Les codes jaune et orange correspondent respectivement à la première et deuxième des trois phases définies par le Baromètre Corona. Plus d'informations sur le baromètre peuvent être trouvées sur <https://www.info-coronavirus.be/fr/barometre-corona/>

Cette ligne de temps présente en parallèle le nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés en Belgique et les principales mesures mises en œuvre au niveau national après la septième vague, c'est-à-dire à partir du 30 mai 2022.

La figure montre également les **stratégies de test** mises en œuvre pendant la période décrite. Ces stratégies sont adaptées au cours du temps en fonction de l'évolution de l'épidémie, de l'organisation des soins de santé en Belgique et des ressources disponibles à un moment donné.

Il est important de souligner que le nombre de cas diagnostiqués dépend de la stratégie de test.

Finalement, cette figure permet également de visualiser les dates de début des différentes phases de la campagne de vaccination pour la population belge et de comprendre comment cette stratégie a été implémentée.

Note: Cette ligne de temps a uniquement une visée descriptive et n'a pas pour objet d'estimer l'impact des différentes interventions.


4. Modélisation

4.1. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

4.1.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le R_t estimé à partir des nouvelles hospitalisations est présenté ci-dessous sous forme de graphique et en tableau.



Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (08/12/22 au 14/12/22)	1,214	1,130-1,302

4.1.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Belgique	1,109	1,087	1,131
Antwerpen	1,075	1,019	1,133
Brabant wallon	1,059	0,967	1,155
Hainaut	1,134	1,075	1,194
Liège*	1,135	1,058	1,214
Limburg	1,114	1,031	1,200
Luxembourg	1,024	0,894	1,162
Namur	1,211	1,111	1,316
Oost-Vlaanderen	1,153	1,092	1,216
Vlaams-Brabant	1,093	1,026	1,161
West-Vlaanderen	1,114	1,042	1,188
Région bruxelloise	1,074	1,012	1,138
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,218	0,874	1,618


*Les estimations pour la province de Liège incluent les valeurs de la Communauté germanophone

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

4.2. MODÈLE DE PRÉDICTION À COURT TERME POUR LES NOUVELLES HOSPITALISATIONS

Les prédictions ci-dessous sont basées sur deux modèles différents réalisés par l'Université d'Hasselt (GAM) et Sciensano (INLA). Ces modèles utilisent différents indicateurs tels que, par exemple, le nombre de cas confirmés, ou l'absentéisme, pour prédire le nombre de nouvelles hospitalisations de cas confirmés de COVID-19 pour les 14 prochains jours. Ces modèles utilisent des indicateurs multiples et différents, les prévisions qui en résultent peuvent donc varier. Plus de détails sur les modèles ainsi que des analyses supplémentaires sont disponibles sur le [site epistat](#).

Dans la figure ci-dessous, la ligne noire montre le nombre de nouvelles hospitalisations observé et les lignes pointillées colorées indiquent les prévisions de chaque modèle. L'intervalle de confiance de chaque modèle est indiqué dans la couleur correspondante.




Une note explicative sur les modèles de prédiction utilisés ci-dessus est disponible via [ce lien](#).

4.3. MODÈLE DE PRÉDICTION DU TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN SOINS INTENSIFS

La figure ci-dessous montre l'occupation des lits en soins intensifs. L'occupation des lits observée est indiquée par la ligne pointillée. Les prévisions (ligne pleine) et leur intervalle de confiance (zone vert clair) sont présentés jusqu'aux 14 jours à venir.

Le modèle utilise toutes les données disponibles jusqu'au moment présent et fournit la meilleure approximation possible sur base de toutes les valeurs observées. En conséquence, les valeurs de prédiction pour une période passée peuvent toujours évoluer.

Le nombre de lits de soins intensifs disponibles en phases 1 et 2 (voir section 3.4) sont indiqués par les lignes horizontales correspondantes (Phase 1 ligne grise; phase 2 ligne rouge).



Les prévisions et leur intervalle de confiance à 95% pour le nombre de lits en soins intensifs occupés sont présentés ci-dessous jusqu'au 21 décembre. Un éventuel dépassement de la capacité de l'USI est présenté en rouge.

Date	Valeur observée	Valeur prédite	2,5% IC	97,5% IC
2022-12-13	68	82	41	133
2022-12-14	70	81	38	133
2022-12-15		84	42	139
2022-12-16		86	41	140
2022-12-17		92	49	146
2022-12-21		88	48	138

5. Annexes

5.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	14/11-20/11	21/11-27/11	28/11-4/12	5/12-11/12
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	756	969	1 175	1 419
Temps de doublement ^(b)	29	20	25	26
Taux de reproduction ^(c)	1,127	1,137	1,083	1,109
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	367	412	454	526
Taux de positivité ^(a)	13,8%	15,2%	16,7%	17,4%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	84	104	130	157
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	47	59	76	95
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	2,85	3,59	4,60	5,75
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	669	839	1 039	1 387
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	51	41	51	65
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	3%	2%	3%	3%
Moyenne journalière de décès COVID-19	4	4	4	7
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	1	1	1	2
Indicateurs de vaccination				
Couverture vaccinale (primo-vaccination complète, population totale)	79,1%	79,1%	79,1%	79,1%
Couverture vaccinale 1 ^{ère} dose de rappel, 18 – 64 ans	71,3%	71,3%	71,3%	71,3%
Couverture vaccinale 1 ^{ère} dose de rappel, 65 ans et +	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%
Couverture vaccinale 2 ^{de} dose de rappel, 65 ans et +	60,8%	61,0%	61,2%	61,4%
Efficacité vaccinale (1^{ère} dose de rappel, 65 ans et +)	0-49 jours	50-99 jours	100-149 jours	150-199 jours
Infection symptomatique	51,4%	39,6%	28,0%	20,0%
Hospitalisation	76,5%	71,0%	69,2%	65,7%
USI	86,7%	79,9%	84,5%	84,0%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

5.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 7 NOVEMBRE 2022 ET LE 14 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
07/11/22	1 321	
08/11/22	908	
09/11/22	801	4 485 cas au cours de cette période de 7 jours
10/11/22	714	Soit 640,7 cas en moyenne par jour
11/11/22	194	Soit une incidence sur une semaine de 38,7/100 000 habitants
12/11/22	346	
13/11/22	201	
14/11/22	1 153	
15/11/22	924	
16/11/22	908	5 289 cas au cours de cette période de 7 jours
17/11/22	859	Soit 755,6 cas en moyenne par jour
18/11/22	842	Soit une incidence sur une semaine de 45,7/100 000 habitants
19/11/22	384	
20/11/22	219	
21/11/22	1 436	
22/11/22	1 144	
23/11/22	1 185	6 783 cas au cours de cette période de 7 jours
24/11/22	1 158	Soit 969,0 cas en moyenne par jour
25/11/22	1 079	Soit une incidence sur une semaine de 58,6/100 000 habitants
26/11/22	502	
27/11/22	279	
28/11/22	1 966	
29/11/22	1 443	
30/11/22	1 422	8 226 cas au cours de cette période de 7 jours
01/12/22	1 315	Soit 1 175,1 cas en moyenne par jour
02/12/22	1 214	Soit une incidence sur une semaine de 71,0/100 000 habitants
03/12/22	550	
04/12/22	316	Soit 20,8% d'augmentation entre les deux périodes
05/12/22	2 098	Soit une incidence sur une période 14 jours de 156,8 nouveaux cas/100 000 habitants
06/12/22	1 804	
07/12/22	1 760	9 936 cas au cours de cette période de 7 jours
08/12/22	1 610	Soit 1 419,4 cas en moyenne par jour
09/12/22	1 563	Soit une incidence sur une semaine de 85,8/100 000 habitants
10/12/22	674	
11/12/22	427	
12/12/22	2 334	
13/12/22	1 288	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
14/12/22	8	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

5.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 7 NOVEMBRE 2022 ET LE 14 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
07/11/22	8 081	
08/11/22	8 254	
09/11/22	6 950	
10/11/22	5 990	38 821 tests au cours de la semaine, soit 5 546/jour
11/11/22	3 117	
12/11/22	3 756	
13/11/22	2 673	
14/11/22	7 479	
15/11/22	8 169	
16/11/22	7 311	
17/11/22	6 505	42 553 tests au cours de la semaine, soit 6 079/jour
18/11/22	6 415	
19/11/22	4 249	
20/11/22	2 425	
21/11/22	8 347	
22/11/22	8 826	
23/11/22	7 970	
24/11/22	7 698	47 757 tests au cours de la semaine, soit 6 822/jour
25/11/22	7 375	
26/11/22	4 796	
27/11/22	2 745	
28/11/22	9 705	
29/11/22	9 875	
30/11/22	8 891	
01/12/22	8 266	52 598 tests au cours de la semaine, soit 7 514/jour
02/12/22	7 976	
03/12/22	5 012	
04/12/22	2 873	
05/12/22	10 238	
06/12/22	11 233	
07/12/22	10 418	
08/12/22	10 187	60 880 tests au cours de la semaine, soit 8 697/jour
09/12/22	9 583	
10/12/22	5 592	
11/12/22	3 629	
12/12/22	11 254	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
13/12/22	12 785	
14/12/22	180	

5.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 10 NOVEMBRE 2022 ET LE 14 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions pour COVID-19 /jour*		Nombre de nouvelles admissions avec COVID-19 /jour**	Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI
10/11/22	68		57	97	810	46
11/11/22	47		30	108	776	50
12/11/22	40	315 nouvelles hospitalisations Soit 45,0/jour en moyenne	22	44	757	54
13/11/22	25		20	38	780	57
14/11/22	51		51	66	791	55
15/11/22	38		52	147	724	49
16/11/22	46		40	103	696	45
17/11/22	52		42	111	653	40
18/11/22	68		48	93	672	44
19/11/22	41	360 nouvelles hospitalisations Soit 51,4/jour en moyenne	43	96	654	49
20/11/22	34		23	39	669	51
21/11/22	36		45	38	709	49
22/11/22	71		57	111	714	53
23/11/22	58		56	90	736	46
24/11/22	74		64	104	762	44
25/11/22	76		65	106	790	36
26/11/22	63	489 nouvelles hospitalisations Soit 69,9/jour en moyenne	71	113	797	37
27/11/22	38		54	48	839	41
28/11/22	61		50	50	872	45
29/11/22	99		95	147	928	51
30/11/22	78		75	116	957	48
01/12/22	84		78	117	974	48
02/12/22	70		97	129	1 011	43
03/12/22	78	560 nouvelles hospitalisations Soit 80,0/jour en moyenne	58	116	996	45
04/12/22	63		42	46	1 039	51
05/12/22	70		62	58	1 124	60
06/12/22	112		98	134	1 176	52
07/12/22	83		100	153	1 203	53
08/12/22	109		87	153	1 242	62
09/12/22	103		105	146	1 272	63
10/12/22	116	766 nouvelles hospitalisations Soit 109,4/jour en moyenne	102	153	1 318	58
11/12/22	73		57	61	1 387	65
12/12/22	98		103	72	1 496	66
13/12/22	130		117	202	1 495	68
14/12/22	137		141	159	1 586	70

* Hospitalisations en raison de COVID-19.

** Hospitalisations pour une autre raison mais test COVID-19 positif dans le cadre d'un screening.

5.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 7 NOVEMBRE 2022 ET LE 14 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
07/11/22	5	
08/11/22	5	
09/11/22	4	
10/11/22	3	37 décès au cours de la semaine, soit 5,3/jour
11/11/22	6	
12/11/22	7	
13/11/22	7	
14/11/22	9	
15/11/22	6	
16/11/22	5	
17/11/22	2	28 décès au cours de la semaine, soit 4,0/jour
18/11/22	2	
19/11/22	1	
20/11/22	3	
21/11/22	5	
22/11/22	6	
23/11/22	4	
24/11/22	1	29 décès au cours de la semaine, soit 4,1/jour
25/11/22	6	
26/11/22	4	
27/11/22	3	
28/11/22	0	
29/11/22	4	
30/11/22	6	
01/12/22	1	27 décès au cours de la semaine, soit 3,9/jour
02/12/22	3	
03/12/22	3	
04/12/22	10	
05/12/22	9	
06/12/22	6	
07/12/22	6	
08/12/22	5	51 décès au cours de la semaine, soit 7,3/jour
09/12/22	6	
10/12/22	9	
11/12/22	10	
12/12/22	5	
13/12/22	11	
14/12/22	0	

5.6. CAS, HOSPITALISATIONS, ADMISSIONS EN SOINS INTENSIFS ET TAUX DE MORTALITÉ DE PATIENTS COVID-19 PAR RÉGION, TRANCHE D'ÂGE ET STATUS VACCINAL.

En raison d'un problème technique, il n'est pas possible de faire le point sur les **cas de COVID-19**, par région, groupe d'âge et statut vaccinal cette semaine. Vous trouverez les dernières données disponibles dans le bulletin hebdomadaire COVID-19 du 9 décembre 2022.

Le tableau ci-dessous présente l'incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants et les valeurs absolues (entre parenthèses) des **hospitalisations** pour COVID-19, par région, groupe d'âge et statut vaccinal, pour la période du 28 novembre au 11 décembre 2022.

Groupe d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie
0-11	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	-	-	-	-
	Primo-vaccination complète	0 (n = 1)	0 (n = 0)	1 (n = 1)	0 (n = 0)
	Non vacciné	10 (n = 125)	12 (n = 21)	11 (n = 72)	7 (n = 32)
12-17	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)
	Primo-vaccination complète	1 (n = 3)	0 (n = 0)	1 (n = 3)	0 (n = 0)
	Non vacciné	3 (n = 5)	2 (n = 1)	3 (n = 2)	2 (n = 2)
18-64	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	2 (n = 85)	3 (n = 9)	2 (n = 59)	1 (n = 17)
	Primo-vaccination complète	3 (n = 32)	3 (n = 7)	3 (n = 12)	3 (n = 13)
	Non vacciné	1 (n = 12)	1 (n = 3)	1 (n = 4)	1 (n = 5)
65-84	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	19 (n = 333)	27 (n = 28)	22 (n = 247)	11 (n = 58)
	Primo-vaccination complète	98 (n = 68)	81 (n = 12)	109 (n = 24)	103 (n = 32)
	Non vacciné	26 (n = 24)	6 (n = 1)	48 (n = 14)	19 (n = 9)
85+	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	64 (n = 199)	38 (n = 8)	81 (n = 168)	27 (n = 23)
	Primo-vaccination complète	311 (n = 32)	58 (n = 1)	339 (n = 13)	392 (n = 18)
	Non vacciné	116 (n = 17)	38 (n = 1)	119 (n = 5)	141 (n = 11)

Les dénominateurs pour les analyses de ce tableau sont basés sur les chiffres de la population belge au 1er janvier 2022, une correction concernant les personnes vaccinées, et décédées en 2021, est faite dans les différents calculs. Les âges utilisés dans les numérateurs sont soit ceux au 1er janvier 2022 (pour les cas de maladie), soit l'âge au moment de l'hospitalisation, de l'admission en USI ou du décès causé par une infection COVID-19. De plus amples informations sont reprises dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

Le tableau ci-dessous présente l'incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants et les valeurs absolues (entre parenthèses) des **admissions en USI** pour COVID-19, par région, groupe d'âge et statut vaccinal, pour la période du 28 novembre au 11 décembre 2022.

Groupe d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie
0-11	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	-	-	-	-
	Primo-vaccination complète	0 (n = 1)	0 (n = 0)	1 (n = 1)	0 (n = 0)
	Non vacciné	0 (n = 3)	0 (n = 0)	0 (n = 3)	0 (n = 0)
12-17	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	1 (n = 1)	0 (n = 0)	1 (n = 1)	0 (n = 0)
	Primo-vaccination complète	0 (n = 1)	3 (n = 1)	0 (n = 0)	0 (n = 0)
	Non vacciné	1 (n = 1)	0 (n = 0)	0 (n = 0)	1 (n = 1)
18-64	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	0 (n = 24)	1 (n = 4)	0 (n = 15)	0 (n = 5)
	Primo-vaccination complète	1 (n = 6)	1 (n = 3)	0 (n = 1)	0 (n = 2)
	Non vacciné	0 (n = 1)	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 1)
65-84	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	3 (n = 49)	3 (n = 3)	3 (n = 38)	2 (n = 8)
	Primo-vaccination complète	10 (n = 7)	7 (n = 1)	18 (n = 4)	6 (n = 2)
	Non vacciné	6 (n = 6)	6 (n = 1)	7 (n = 2)	6 (n = 3)
85+	Primo-vaccination complète + dose(s) de rappel	3 (n = 9)	9 (n = 2)	3 (n = 7)	0 (n = 0)
	Primo-vaccination complète	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)
	Non vacciné	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)

Les dénominateurs pour les analyses de ce tableau sont basés sur les chiffres de la population belge au 1er janvier 2022, une correction concernant les personnes vaccinées, et décédées en 2021, est faite dans les différents calculs. Les âges utilisés dans les numérateurs sont soit ceux au 1er janvier 2022 (pour les cas de maladie), soit l'âge au moment de l'hospitalisation, de l'admission en USI ou du décès causé par une infection COVID-19. De plus amples informations sont reprises dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

Le tableau ci-dessous présente **le taux de mortalité** pour 100 000 habitants sur 14 jours et les valeurs absolues (entre parenthèses) pour les décès hospitaliers suite à une infection COVID-19, en Belgique, par groupe d'âge et statut vaccinal, pour la période du 28 novembre au 11 décembre 2022.

	18-64	65-84	85+
Primo-vaccination complète + dose de rappel	0 (n = 3)	1 (n = 18)	6 (n = 19)
Primo-vaccination complète	0 (n = 0)	0 (n = 0)	0 (n = 0)
Non vacciné	0 (n = 1)	4 (n = 4)	14 (n = 2)

Les dénominateurs pour les analyses de ce tableau sont basés sur les chiffres de la population belge au 1er janvier 2022, une correction concernant les personnes vaccinées, et décédées en 2021, est faite dans les différents calculs. Les âges utilisés dans les numérateurs sont soit ceux au 1er janvier 2022 (pour les cas de maladie), soit l'âge au moment de l'hospitalisation, de l'admission en USI ou du décès causé par une infection COVID-19. De plus amples informations sont reprises dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

Le tableau ci-dessous présente le nombre et le pourcentage de personnes non vaccinées par région et par groupe d'âge, pour la période du 28 novembre au 11 décembre 2022.

Groupe d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie
0-11	% non vaccinés	83.7 %	95.3 %	75.7 %	93.2 %
	Nombre non vaccinés	1 269 099	178 484	642 798	447 817
12-17	% non vaccinés	23.8 %	53.8 %	13.6 %	31.4 %
	Nombre non vaccinés	190 861	46 515	61 049	83 297
18-64	% non vaccinés	12.8 %	26.5 %	7.8 %	17.0 %
	Nombre non vaccinés	895 678	208 792	311 473	375 384
65-84	% non vaccinés	4.9 %	12.6 %	2.5 %	7.8 %
	Nombre non vaccinés	94 113	16 991	29 294	47 787
85+	% non vaccinés	4.3 %	10.3 %	1.9 %	8.0 %
	Nombre non vaccinés	14 679	2 651	4 191	7 824

Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).