

COVID-19
EPIDEMIOLOGISCHER BERICHT AUF
WOCHENBASIS
(18. MÄRZ 2022)

Dieser Text ist eine Übersetzung von ausgewählten Wochenberichtsauszügen über COVID 19. Dieser Bericht wurde auf Französisch verfasst. Bei Abweichungen zwischen den verschiedenen Versionen ist die französische Version maßgebend.

1. Kernpunkte

- **Allgemeine Lage:** Die 14-Tage-Inzidenz für die Fallzahl in Belgien beträgt 945/100.000 Einwohner, die 7-Tage-Inzidenz für die Anzahl der Hospitalisationen liegt bei 8,8/100.000 Einwohner.
- **Anzahl neuer Fälle:** Auf nationaler Ebene steigt die Anzahl der neu gemeldeten Fälle im Zeitraum vom 8. bis 14. März 2022 im Vergleich zum vorherigen 7-Tage-Zeitraum weiter an (+ 24 %). Der R-Wert, der auf der Anzahl der diagnostizierten Fälle basiert, steigt im selben Zeitraum weiter an (1,147 verglichen mit 1,131 in der Vorwoche).
- **Tests und Positivrate:** Die Anzahl der durchgeführten Tests stieg leicht an und lag im Zeitraum vom 8. bis 14. März 2022 bei durchschnittlich 35 208 Tests pro Tag. Die Positivrate in Belgien stieg im selben Zeitraum ebenfalls weiterhin an (26,0 %).
- **Hospitalisationen:** Die Anzahl der neuen Hospitalisationen stieg weiter an (+ 14 %) aber die Anzahl der belegten Betten in der Intensivpflege ging im Zeitraum vom 11. bis 17. März im Vergleich zum vorherigen 7-Tage-Zeitraum weiter leicht zurück (- 6 %).
- **Mortalität:** Die Mortalität im Zusammenhang mit COVID-19 stieg in Woche 10 leicht an. Die gemeldeten Todesfälle ereigneten sich überwiegend in Krankenhäusern. In Woche 8 wurde in der Gesamtbevölkerung keine Übersterblichkeit (alle Ursachen zusammengenommen) beobachtet.
- **Impfung:** Laut den am 15. März 2022 in Vaccinnet+ gespeicherten Daten sind 29,9 % der Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren vollständig geimpft. Die Durchimpfungsrate für die Auffrischungsdosis lag bei Personen ab 18 Jahren bei 74,8 %. Das Risiko von Infektionen, Hospitalisationen und Einweisungen in die Intensivstation wurde bei Personen ab 65 Jahren mit Auffrischungsdosis im Vergleich zu vollständig geimpften Personen derselben Altersgruppe ohne Auffrischungsdosis um 35 %, 57 % und 73 % (Werte nicht adjustiert) gesenkt.
- **Molekulare Surveillance:** In den letzten zwei Wochen (28. Februar bis 13. März 2022) wurden im Rahmen des Basismonitoring 887 Proben sequenziert. Die Omikron-Variante BA.1/BA.1.1 machte 32,5 % dieser Proben aus, die Omikron-Variante BA.2 67,3 %.
- **Surveillance durch Allgemeinmediziner:** Die durchschnittliche Anzahl der Kontakte mit einem Allgemeinmediziner wegen COVID-19-Verdachts stieg in Woche 10 weiterhin an (73 Kontakte in dieser Woche pro 100.000 Einwohner pro Tag im Vergleich zu 47 Kontakten in der Vorwoche).
- **Die COVID-19-Situation für Kinder:** Die kumulative 14-Tages-Inzidenz für Kinder stieg leicht an. Der niedrigste Wert wird für die Altersgruppen 0-2 und 3-5 Jahre verzeichnet und der höchste Wert für die Altersgruppe 12-17 Jahre.
- **Mobilität in Belgien:** Die Mobilitätsindikatoren zeigen einen Anstieg der Fahrten zum Arbeitsplatz und einen Rückgang der Fahrten im Zusammenhang mit dem Besuch von Geschäften & Freizeitzentren, was zu einem Kontext passt, in dem die Arbeitsaktivitäten nach den Schulferien wieder aufgenommen werden.

2. Schlüsselindikatoren – Trends

Zur Überwachung der Entwicklung der Epidemie werden vier Indikatoren verwendet: bestätigte Fälle, neue Hospitalisierungen von laborbestätigten COVID-19-Fällen, Belegung der Intensivstationen (ITS) und Todesfälle. Die Schlüsselindikatoren konzentrieren sich auf das Datum der Diagnose, des Todesfalls oder der Aufnahme in das Krankenhaus. Für die Berechnung dieser Indikatoren werden Daten aus 7-Tage-Zeiträumen verwendet, ebenso wie für deren Vergleich. Die Daten für die 7-Tage-Zeiträume werden als Tagesmittelwerte ausgedrückt; die Entwicklung gibt die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden 7-Tage-Zeiträumen in % an.

Anzahl der Patienten	Insgesamt	Tagesmittelwert während des vorletzten 7-Tage-Zeitraums	Tagesmittelwert während des letzten 7-Tage-Zeitraums	Entwicklung
Bestätigte COVID-19-Fälle	3 696 059	6 937	8 614*	+24%
In ein Krankenhaus aufgenommen	113 991***	143,3	163,3**	+14%
Todesfälle****	30 510	17,0	21,4*	+26%
<i>Im Krankenhaus</i>	<i>20 231</i>	<i>13,4</i>	<i>17,4</i>	<i>+30%</i>
<i>Im Seniorenheim</i>	<i>10 092</i>	<i>3,6</i>	<i>4,0</i>	<i>+12%</i>

*Vom 8 März 2022 bis 14 März 2022 (Daten der letzten 3 Tage nicht konsolidiert).

**Vom 11 März 2022 bis 17 März 2022.

*** Anzahl der Hospitalisationen seit dem 15. März 2020. Ausführlichere Informationen über die Anzahl der Hospitalisationen finden Sie unter Punkt 5 des Dokuments [Häufig gestellte Fragen](#).

****Todesfälle in allen Einrichtungen.


Belegung von Krankenhausbetten	Donnerstag 10 März 2022	Donnerstag 17 März 2022	Entwicklung
Anzahl der belegten Krankenhausbetten	1 970	2 262	+15%
Anzahl der belegten ITS-Betten	185	173	-6%

Die Daten in dieser Tabelle können nicht mit der vorhergehenden verglichen werden. Grund dafür sind mögliche Verzögerungen bei der Meldung der Daten und kleine Korrekturen, die laufend vorgenommen werden können.

2.1. TRENDS


Die vier Schlüsselindikatoren sind unten mit dem gleitenden Durchschnitt über 7 Tage (grüne Linie) dargestellt. Dieser gleitende Durchschnitt wird verwendet, um einen Trend zu veranschaulichen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Kurve geglättet und die täglichen Schwankungen abgeschwächt werden.

Entwicklung der neuen bestätigten Fälle




Quelle: Netzwerk klinischer Labors und nationale Plattform

Entwicklung der Neuaufnahmen von laborbestätigten COVID-19-Fällen in Krankenhäuser




Quelle: Surveillance/Überwachung von Krankenhäusern (Sciensano)

Entwicklung der Anzahl von Patienten auf der ITS



Quelle: Surveillance/Überwachung von Krankenhäusern (Sciensano)

Entwicklung der Anzahl der Todesfälle




Quelle: Surveillance/Überwachung der Mortalität bei COVID-19 (Sciensano)


2.2. AKTUELLE LAGE

Die folgenden Abbildungen zeigen die geografische Verteilung und die Verteilung nach Alter und Geschlecht für die letzten 14 Tage (konsolidierte Daten).

Verteilung der bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner zwischen dem 01/03/22 und dem 14/03/22



Anzahl der bestätigten Fälle nach Altersgruppe und Geschlecht pro 100 000 Einwohner zwischen dem 01/03/22 und dem 14/03/22



Quelle: Netzwerk klinischer Labors und nationale Plattform.
Die für diese Karte verwendete Farbskala ist eine kontinuierliche Skala, die sich automatisch entsprechend der niedrigsten und höchsten gemeldeten Inzidenzen in jeder der belgischen Gemeinden verändert.

Hinweis: Für 644 Fälle waren keine Informationen über Alter und/oder Geschlecht verfügbar.

Sie unter Punkt 2.4 des Dokuments Häufig gestellte Fragen [Häufig gestellte Fragen](#).

Die Verteilung der Anzahl neu diagnostizierter Fälle sowie die Zeit bis zur Verdoppelung (oder Halbierung) der Fälle für Belgien, die einzelnen Provinzen, die Region Brüssel und die deutschsprachige Gemeinschaft sind in der unten folgenden Tabelle dargestellt.

	01/03/22-07/03/22	08/03/22-14/03/22	Veränderung (absoluter Wert)	Veränderung (Prozent)	Zeit für Verdoppelung/Halbierung (Tage)*	Inzidenz pro 100 000 (14 Tage)**
Belgien	48 557	60 301	11 744	+24%	22	945
Antwerpen	11 959	16 228	4 269	+36%	16	1 503
Brabant wallon	913	1 000	87	+10%	53	470
Hainaut	2 468	2 617	149	+6%	83	378
Liège***	2 264	2 048	-216	-10%	48	389
Limburg	5 521	7 513	1 992	+36%	16	1 480
Luxembourg	894	1 025	131	+15%	35	665
Namur	1 060	1 034	-26	-2%	195	421
Oost-Vlaanderen	8 174	10 427	2 253	+28%	20	1 214
Vlaams-Brabant	6 279	7 517	1 238	+20%	27	1 187
West-Vlaanderen	5 639	7 053	1 414	+25%	22	1 055
Region Brüssel-Hauptstadt	2 770	3 264	494	+18%	30	495
Deutschsprachige Gemeinschaft	554	442	-112	-20%	21	1 275

*Die Verdopplungszeit (orange) ist ein Maß für exponentielles Wachstum. Es wird die Zeit dargestellt, die benötigt wird, bis sich der Wert der diagnostizierten Fälle verdoppelt. Die Halbierungszeit (grün) hingegen gibt an, wie lange es dauert, bis die Anzahl der diagnostizierten Fälle ihren Wert halbiert hat.

**Die für diese Berechnungen verwendeten Nenner sind die von STATBEL veröffentlichten belgischen Bevölkerungszahlen vom 01.01.2021.

***Die Daten für die Provinz Lüttich beinhalten die der deutschsprachigen Gemeinschaft.

2.3. 2.3. STRATEGIE FÜR DAS EPIDEMIE-MANAGEMENT UND AUSBLICK

Die Risk Assessment Group (RAG) wurde gebeten, Warnstufen vorzuschlagen, die eine politische Entscheidungsfindung auf lokaler oder nationaler Ebene darüber unterstützen sollen, welche Maßnahmen anzuwenden oder zu lockern sind, sobald die Schwellenwerte erreicht werden und die wöchentliche Bewertung der epidemiologischen Lage die Notwendigkeit dafür unterstreicht. Die Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen bleibt immer eine politische Entscheidung, bei der die Analyse und die Meinung der RAG, aber auch andere als nützlich erachtete Elemente berücksichtigt werden. Die Warnstufen sind daher nicht als mechanistisches oder deterministisches Instrument zu betrachten, sondern als Hilfsmittel für die politische Entscheidungsfindung.

Es wurden drei Warnstufen festgelegt, damit die verschiedenen Akteure ihre Maßnahmen koordinieren können. Je nach Warnstufe werden Maßnahmen entweder auf lokaler oder auf nationaler Ebene ergriffen. Die für das Risikomanagement verwendeten Indikatoren und Schwellenwerte wurden von der RAG festgelegt und wurden in der [Bekanntmachung der RAG vom 15. Dezember 2021](#) veröffentlicht.

Jede Woche am Mittwoch bestimmt die RAG die Warnstufe auf nationaler Ebene und Provinzebene auf der Grundlage einer Bewertung der epidemiologischen Situation, bei der unter anderem folgende Indikatoren berücksichtigt werden: Anzahl der neuen Hospitalisationen, Anteil der Betten in der Intensivpflege (ITS), die mit COVID-19-bestätigten Patienten belegt sind, Anzahl der Konsultationen mit Verdacht auf COVID-19 bei Allgemeinmedizinerinnen, Infektionsinzidenz über 14 Tage, R-Wert auf der Grundlage der Anzahl der Fälle, Positivrate. Andere spezifischere Indikatoren wie die Arbeitsbelastung der Allgemeinmediziner oder auch die Durchimpfungsrate können bei Bedarf ebenfalls analysiert werden.

Laut der neuesten epidemiologischen Bewertung der RAG befindet sich Belgien auf **Entscheidungsebene 2** mit einer Tendenz zunehmender Infektionen und Hospitalisationen.