

ARCHIEF

PROCEDURE VOOR HUISARTSEN IN GEVAL VAN EEN MOGELIJK GEVAL VAN COVID-19

Versie 31 december 2020

De ontwikkeling van procedures wordt door Sciensano gecoördineerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten op het gebied van preventie, gezondheidszorg, bestrijding van infectieziekten en risico-/crisisbeheer. Deze procedures worden in de loop van de tijd bepaald en aangepast in functie van de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en ontdekkingen, de mening van experts en de wetenschappelijke wereld, en de beschikbare middelen. De richtlijnen vervat in deze procedures moeten zo goed mogelijk worden uitgevoerd in functie van de plaatselijke beperkingen.

Een samenvatting van de actuele wetenschappelijke kennis is beschikbaar in een "fact sheet" die u hier kan vinden:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_fact_sheet_ENG.pdf

Belangrijkste wijzigingen:


- Maatregelen voor reizigers uit een rode zone (31 december)
- Gebruik van specifiek elektronisch formulier « COVID-19 : Mededeling resultaat COVID-19 sneltest » (annexe 7) bij het gebruik van een antigeen sneltest uitgevoerd door de arts (10 december).
- De quarantaine duurt maximum 10 dagen met een test op dag 7, voor iedereen (23 november).
- Verduidelijking richtlijnen voor COVID+ personeel / personeel na hoog-risicocontact
- Tijdelijk stopzetten van testen van asymptomatische hoog-risico contactpersonen en bijgevolg verlengen van de standaard duur van de quarantaine tot 10 dagen (21 oktober-22 november).
- Wijzigingen in de maatregelen voor hoog-risico contacten en reizigers (duurtijd quarantaine en test) (1 oktober) - verduidelijkingen van die maatregelen (7 oktober)
- Toevoegen informatie over de Coronalert smartphone applicatie (1 oktober)
- Addendum over de interpretatie van een PCR-resultaat (14 augustus)
- Maatregelen om bepaalde personen vrij te stellen van het dragen van maskers (15 juli)
- Aanpassing testing strategie contacten (08 juli)
- Testen van alle nauwe contacten (12 juni)
- Een antwoord op veelgestelde vragen rond contact tracing is beschikbaar op https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf. Er werden eveneens richtlijnen gepubliceerd rond het gebruik van anticoagulantia bij patiënten met COVID-19. (30 mei)
- Aanpassingen van de definitie voor een mogelijk geval (15 mei)
- Nieuwe definitie voor een mogelijk geval (4 mei)
- Elk mogelijk geval moet getest worden (4 mei)
- Verandering modaliteiten verplichte melding om contact tracing mogelijk te maken (4 mei)
- Wijziging in maatregelen voor contacten (4 mei)

INHOUDSTABEL


1. Beslisboom	3
1.1. Testen en isoleren van symptomatische personen	3
1.2. Testen en isolatie/quarantaine van asymptomatische personen	4
2. Gevalsdefinitie	5
2.1. Definitie mogelijk geval	5
2.2. Definitie van een radiologisch bevestigd geval	5
2.3. Definitie bevestigd geval	5
3. Eerste lijn	5
3.1. Algemeen	5
3.2. De patiënt vereist een ziekenhuisopname	6
3.3. De patiënt vertoont milde of matige symptomen	7
3.4. Hulplijnen en meer info	9
4. Beleid bij asymptomatische personen	10
4.1. Algemeen	10
4.2. Zorgprofessionals	11
5. Voorzorgsmaatregelen voor de huisarts	12
5.1. Bij het klinisch onderzoek	12
5.2. Algemene overwegingen	12
6. Verdere overwegingen	13
7. Praktische richtlijnen bij het vaststellen van een overlijden	13
8. Contactgegevens dienst Infectieziektebestrijding van uw regio	14
9. Samenvatting	15
10. Schema Call Center (voor meer info: zie procedure contact)	17
BIJLAGE 1: Getuigschrift van quarantaine en arbeidsongeschiktheid	18
BIJLAGE 2: eFormulier “Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2”	20
BIJLAGE 3: eFormulier 2: “Aanvraag contactopvolging bij negatief testresultaat”	22
BIJLAGE 4: eFormulier 3: “Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van besmetting COVID-19, onafhankelijk van het testresultaat”	24
BIJLAGE 5: Formulier oplistingscontacten	25
BIJLAGE 6: Advies voor de patiënt en zijn contacten	29
BIJLAGE 7: eFormulier COVID-19 : Mededeling resultaat COVID-19 sneltest	30

1. Beslisboom

1.1. TESTEN EN ISOLEREN VAN SYMPTOMATISCHE PERSONEN



1.2. TESTEN EN ISOLATIE/QUARANTAINES VAN ASYMPTOMATISCHE PERSONEN



2. Gevalsdefinitie

2.1. DEFINITIE MOGELIJK GEVAL

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie;

OF

- minstens twee¹ van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree²; acute verwardheid²; plotse val²;

OF

- verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...), zonder andere duidelijke oorzaak.

2.2. DEFINITIE VAN EEN RADIOLOGISCH BEVESTIGD GEVAL

Een radiologisch bevestigd geval is een persoon bij wie de PCR voor COVID-19 negatief is, maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie **EN** een compatibele CT thorax.

2.3. DEFINITIE BEVESTIGD GEVAL

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon waar de diagnose van COVID-19 infectie bevestigd werd door een moleculaire test³.

3. Eerste lijn

3.1. ALGEMEEN

- De huisarts is voor de bevolking een belangrijke bron van informatie in verband met gezondheid. Omwille van de COVID-19 pandemie wordt aan de bevolking, ook zij die geen symptomen vertonen, bijzondere aandacht gevraagd voor preventieve handelingen, zoals handen wassen en het dragen van een **mondmasker op openbare plaatsen**. Bespreek dit met uw patiënt. Als een patiënt niettemin een aandoening heeft die het dragen van een mondmasker verhindert, kan de huisarts een certificaat opstellen dat de patiënt vrijstelt van deze plicht. De arts oordeelt zelf op basis van een klinische inschatting voor welke patiënten dit geldt en welke bijkomende preventieve handelingen voor hen aangewezen zijn (bv. het mijden van drukke publieke plaatsen).
- Patiënten die voldoen aan de definitie van een mogelijk geval, nemen telefonisch contact op met de huisarts.
- Alle patiënten vanaf 6 jaar die voldoen aan de definitie van een mogelijk geval of nauwe contacten van een bevestigd geval, dienen getest te worden. **Voor kinderen onder de 6 jaar is een test niet altijd nodig: zie procedure voor kinderen.**

¹ Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie. Voor kinderen onder de 6 jaar is een test niet altijd nodig: zie procedure voor kinderen.

² Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.

³ Moleculaire test: PCR of antigeen sneltest. Behalve de twee indicaties die hier vermeld worden, moet een negatief resultaat van een antigeen sneltest altijd bevestigd worden met een bijkomende PCR test.

- Personen zijn het meest besmettelijk juist voor en na het verschijnen van de symptomen. Het is daarom belangrijk dat patiënten zo snel mogelijk contact opnemen met hun huisarts zodat die indien nodig de patiënt kan isoleren. In afwachting van het resultaat van de test worden in de regel nog geen bijkomende maatregelen genomen. Enkel bij een sterk klinisch vermoeden van SARS-CoV-2 (epidemiologische link en/of het vertonen van typische symptomen zoals anosmie), kan de huisarts beslissen om de huisgenoten en andere nauwe contacten al in quarantaine te plaatsen.
- De patiënt zelf is ziek, voor hem kan dus een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld worden. Voor de asymptomatische personen in hetzelfde huishouden wordt indien nodig een getuigschrift van quarantaine⁴ opgemaakt (zie ook verderop en bijlage 1).
- Alle mogelijke gevallen dienen eveneens verplicht gemeld te worden, zodat contactopvolging indien nodig gestart kan worden.
- Voor de testen uitgevoerd in het laboratorium gebeurt deze verplichte melding gebeurt via een eFormulier 1 “COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2” (zie bijlage 2 voor een voorbeeld) dat geïntegreerd werd in de elektronische softwarepakketten⁵ voor huisartsen. De contactopvolging gebeurt vervolgens door een centraal call center (zie verderop). De contactopvolging gebeurt enkel na bevestiging van een geval met een positief laboresultaat, behalve indien de huisarts inschat dat het opvolgen van de contacten nodig is ondanks een negatief resultaat of nog voor het verkrijgen van de resultaten (zie verder 2.3.3).
- Voor de antigeen sneltesten uitgevoerd door de arts zelf, moet het resultaat (positief of negatief) worden verstuurd via een specifiek elektronisch formulier: “COVID-19 : Mededeling resultaat COVID-19 sneltest”, geïmplementeerd in de software van de huisarts. De contact-tracing wordt dan uitgevoerd voor positieve gevallen (zie verderop).
- Bij het opvolgen van contacten kan het call center of de bedrijfsarts, schoolarts, of coördinerend arts van een collectiviteit (bv. asielcentrum, WZC, gevangenis) een PCR test aanraden. Deze personen ontvangen een SMS met een “corona test prescription code” (combinatie van 16 cijfers en letters). Met deze code kan de persoon in kwestie rechtstreeks een test in een testcentrum reserveren via een webportaal⁶ (ook toegankelijk via mijngezondheid.be). Het call center kan eveneens een “quarantaine code” per sms uitsenden, waarmee de persoon een gepersonaliseerd quarantaine-attest kan downloaden via <https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine>.

Het antwoord op veelgestelde vragen rond contact tracing kan gevonden worden op https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf

3.2. DE PATIËNT VEREIST EEN ZIEKENHUISOPNAME

Indien de huisarts op basis van de telefonische anamnese oordeelt dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is:

- verwijst hij de patiënt naar het ziekenhuis;
- verwittigt hij het ambulancepersoneel en het ziekenhuis van de komst van een “mogelijke COVID-19 patiënt met zorgwekkende klinische toestand”;
- vult hij het eFormulier 1 (bijlage 2) in met de (contact)gegevens van de patiënt en vermeldt aan de patiënt (of zijn naaste) dat het mogelijk is dat ze zullen opgebeld worden door het call center.

⁴ Meer informatie hierover vindt u hier: <https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriften-veranderingen-gedurende-covid19.aspx>

⁵ Voor meer informatie en IT ondersteuning: <https://covid19lab.healthdata.be/nl/node/25>

⁶ Alle informatie beschikbaar via <https://www.corona-tracking.info/overgang-naar-het-nieuwe-systeem/>

3.3. DE PATIËNT VERTOONT MILDE OF MATIGE SYMPTOMEN

Indien de huisarts op basis van de telefonische anamnese oordeelt dat de patiënt voldoet aan de criteria van een mogelijk COVID-19 geval, dient een test en eventueel een klinisch onderzoek uitgevoerd te worden. Testen en klinisch onderzoek van mogelijke COVID-19 besmette patiënten wordt preferentieel in een test/triagepost gedaan en kan enkel in het eigen kabinet gebeuren indien aan strikte voorwaarden voldaan is.

De huisarts kan de test zelf afnemen indien hij beschikt over:

- 1) het juiste beschermingsmateriaal: chirurgisch masker⁷, overschort, spatbril en handschoenen, zie ook punt 4;
- 2) het afnamemateriaal voor een PCR test;
- 3) het eFormulier "Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2" (zie bijlage 2) of het eFormulier "COVID-19 : Mededeling resultaat COVID-19 snelttest" (zie bijlage 7) afhankelijk van de uitgevoerde/gewenste test.

De huisarts stuurt in het geval van een PCR test, het staal naar zijn gebruikelijk labo. Indien de patiënt de Coronalert app gebruikt, vult de huisarts ook de code in die door de app gegenereerd werd.

Indien hij over één van deze zaken niet beschikt, of indien er lokaal afgesproken is om voor alle mogelijke COVID-19 patiënten via de test/triagecentra te werken, verwijst hij de patiënt door naar een **test/triagecentrum**. De huisarts vult dan een eFormulier in en genereert daarmee een code (combinatie van 16 cijfers en letters, de zogenaamde corona test prescription code, CTPC). Het is niet meer nodig in het eFormulier aan te duiden naar welk test/triagecentrum men de patiënt verwijst. Met deze code, die automatisch per sms naar de patiënt gestuurd wordt op het telefoonnummer dat in het eFormulier werd ingevuld, kan de patiënt vervolgens zelf een afspraak maken bij een test/triagecentrum via het [webportaal](#)⁶ (ook toegankelijk via mijngezondheid.be). De patiënt geeft via deze reservatietool dan zelf een aantal bijkomende gegevens in, zoals zijn rijksregisternummer, een mailadres om een eventueel quarantainecertificaat te ontvangen en de code van de Coronalert-app (als hij die gebruikt).

In elk geval geeft de huisarts al de volgende informatie mee aan de patiënt:

- om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moet de patiënt zich isoleren tot het resultaat van de test bekend is. Bij een sterk vermoeden van COVID-19 moeten ook de huisgenoten zich reeds in quarantaine plaatsen.
- Indien mogelijk, dient de patiënt al na te denken over met welke personen hij de afgelopen dagen in contact is geweest. Het formulier in bijlage 5 kan daarbij helpen (ook beschikbaar als fysiek formulier in de test/triagecentra, op de website van Sciensano en op www.info-coronavirus.be).
- Indien het vermoeden van COVID-19 bevestigd wordt, zal het call center contact opnemen met de patiënt en zullen ook huisgenoten en andere nauwe contacten van de patiënt gevraagd worden om in quarantaine te blijven en om zich te laten testen, ten vroegste op dag 7 na de dag van het laatste hoog-risico contact.

⁷ In geval van schaarste in de context van een epidemie, mag dit gedurende 8u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, onder bepaalde voorwaarden (cfr advies Hoge Gezondheidsraad 2020):

- mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden;
- moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil;
- mag met dat doel bijgehouden worden maar nooit in de zak;
- mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak);

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de officiële aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.

Elke arts met een therapeutische relatie met de patiënt kan de resultaten consulteren in de hub (CoZo, Vlaams Ziekenhuis Netwerk, Brussels Gezondheidsnetwerk en Réseau Santé Wallon). De patiënt kan zelf zijn testresultaat terugvinden via mijngezondheid.be of in de CoronAlert app (als hij/zij die gedownload heeft).

- Bij een **positief resultaat**: de patiënt is een **bevestigd geval**

1. SYMPTOMATISCHE BEHANDELING

- Het off-label gebruik van medicamenten of experimentele behandeling tegen COVID-19 is voorbehouden voor gehospitaliseerde patiënten. Paracetamol blijft de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts, de gebruikelijke (contra-) indicaties voor NSAIDs blijven geldig.
- Richtlijnen rond het gebruik van anticoagulantia bij COVID-19 patiënten werden opgesteld door de Belgian Society of Thrombosis and Haemostasis en zijn beschikbaar op de website van Sciensano.
- Er zijn ook richtlijnen beschikbaar voor het goed gebruik van zuurstof bij COVID-19 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of verblijvend in woonzorgcentra

2. THUIS-ISOLATIE:

- Schrijf een attest van arbeidsongeschiktheid voor 7 dagen; het huis verlaten is niet toegestaan.
- Leg uit aan de patiënt dat hij het huis niet mag verlaten.
- Overhandig de hygiënische maatregelen die de verspreiding van het virus kunnen vermijden (zie bijlage 6 of https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26household_NL.pdf)
- Vraag de patiënt om opnieuw telefonisch contact met u op te nemen:
 - indien de symptomen verergeren;
 - indien er nieuwe symptomen optreden;
 - op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid indien de symptomen aanhouden, om te evalueren of de thuis-isolatie kan opgeheven worden.
- De isolatie wordt opgeheven ten vroegste **7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen**. Zorgpersoneel moet bij de terugkeer naar het werk nog te allen tijde een chirurgisch mondkapje dragen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen. Het is NIET aanbevolen om een nieuwe test uit te voeren alvorens de isolatie te beëindigen. Het is gekend dat PCR testen nog lange tijd na de besmettelijke periode positief kunnen blijven⁸.

3. CONTACT-OPVOLGING

- De huisgenoten van de patiënt dienen **in quarantaine** te worden geplaatst. Hiervoor maakt de huisarts of het call center een getuigschrift van quarantaine op voor de maximale periode van 10 dagen na de dag van het laatste risico-contact (zie bijlage 1). Meer info over de maatregelen voor contacten kan gevonden worden in punt 3 “maatregelen voor asymptomatische personen” en de specifieke richtlijn https://epidemiologie.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
- Het call center wordt automatisch op de hoogte gebracht van het test-resultaat en zal

⁸ patiënten met ernstige symptomen of ernstig immuungecompromiteerd: zie richtlijnen punt 7. in procedure voor ziekenhuizen

contact opnemen met de patiënt voor het in kaart brengen van zijn nauwe contacten die daarna ook gecontacteerd worden.

- Bij een **negatief resultaat**:
 - De patiënt kan weer aan het werk zodra de klinische toestand dat toelaat, er zijn geen verdere maatregelen nodig.
 - Indien de huisarts op basis van de klinische inschatting oordeelt dat een **vals-negatief resultaat** waarschijnlijk is (bv. aard en evolutie van de symptomen, mogelijke blootstelling aan bevestigd geval, geen andere meer waarschijnlijke etiologie, labo-parameters...)
 - gelden dezelfde maatregelen rond arbeidsongeschiktheid als voor een bevestigd geval;
 - moet de huisarts het negatieve laboresultaat in de centrale database overschrijven door het invullen van eFormulier 2 “COVID-19: Aanvraag contactopvolging bij negatief labo-onderzoek SARS-CoV-2” (zie bijlage 3). Dit zorgt ervoor dat in het call center voor deze patiënt de contactopvolging geactiveerd wordt.
- Bij **afwezigheid labo-resultaat**:
 - alles moet in het werk gesteld worden om een klinische verdenking te bevestigen met een labo-test;
 - indien het echter onmogelijk is om een resultaat te bekomen (bv. omdat de patiënt de test weigert) en de huisarts heeft op basis van de kliniek een sterk vermoeden dat het een COVID-19 infectie betreft, dient de patiënt eveneens de maatregelen voor een bevestigd geval te volgen en dient de huisarts de contactopvolging te activeren door achtereenvolgens
 - het eFormulier “Labo-aanvraag bij vermoeden besmetting SARS-CoV-2” in te vullen en daar aan te duiden dat geen staal werd afgenomen (bijlage 2)
 - het afwezig laboresultaat in de centrale database te overschrijven en contact onderzoek te starten door eFormulier 3 in te vullen “Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van besmetting COVID-19, onafhankelijk van het laboresultaat” in te vullen (bijlage 4).

3.4. HULPLIJNEN EN MEER INFO

- Antwoord op veelgestelde vragen rond contactopvolging zijn beschikbaar in een FAQ die u hier kan terugvinden: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf
- In verband met de **procedures**: op de website van Sciensano bevindt zich steeds de meest actuele info. De belangrijkste documenten voor huisartsen zijn:
 - Procedure voor **contacten** : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 - Procedure voor **kinderen**: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf
 - **Informatie voor patiënten**: <https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-communicatiemateriaal#accordion2>
 - indien u niettemin vragen heeft over de procedures, kan u deze richten aan sbb-covid19@sciensano.be
- Vragen over het gebruik van / resultaten in **Cyberlab**: biss@memo.be of 02 223 00 00 (24/7)
- Meer info/handleiding over het ‘valideren’ van de **PCR-codes**: <https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/05/Verification-PCR-Test-Prescription-Gebruikershandleiding.pdf>

- Gebruik van de **elektronische formulieren** in de professionele software: contacteer de helpdesk van uw software of uw softwareverantwoordelijke. Meer info ook op <https://covid19lab.healthdata.be/nl/node/21>
- Het proces van contactopvolging: <https://www.corona-tracking.info/>
- Elke andere vraag rond **opvolging van contacten**: 0800 980 06 (elke dag van 10u-18u)

4. Beleid bij asymptomatische personen

4.1. ALGEMEEN

Het uitvoeren van een test bij een asymptomatische persoon dient beperkt te worden tot **welbepaalde indicaties en moet zoveel mogelijk buiten de huisartspraktijk gehouden worden.**

De test-indicaties zijn hier terug te vinden. Uitgebreide info rond maatregelen bij hoog- en laag-risico contacten vindt u in de procedure contact.

- **Alle asymptomatische hoog-risico contacten en alle reizigers uit een rode zone** moeten zo snel mogelijk in quarantaine geplaatst worden, voor een periode van maximaal 10 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van het laatste hoog-risico contact. De quarantaine kan vroeger gestopt worden indien een negatief testresultaat beschikbaar is van een test die ten vroegste dag 7 na de dag van het laatste hoog-risico contact werd uitgevoerd.
- Asymptomatische hoog-risico contacten en reizigers die terugkeren uit rode zones (en die volgens het zelfbeoordelingsformulier een hoog-risico liepen), vanaf de leeftijd van 6 jaar, zullen allemaal uitgenodigd worden om getest te worden. **De test gebeurt ten vroegste op dag 7 na de dag van het laatste hoog-risico contact.** Ze zullen daarvoor per SMS een code toegestuurd krijgen waarmee ze online een afspraak voor een test kunnen maken en zich vervolgens rechtstreeks naar een test/triagecentrum kunnen begeven, zonder tussenkomst van de huisarts.
 - Indien de **test positief** is moet de persoon verder 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de datum van staalname (of start van symptomen). De persoon moet hiervoor de huisarts contacteren.
 - Indien de **test negatief** is wordt de quarantaine beëindigd (dus ten vroegste 7 dagen na de dag van het laatste hoog-risico contact). De persoon blijft nog gedurende de gehele potentiële incubatietijd (dus tot 14 dagen na het laatste hoog-risico contact) extra waakzaam voor het ontwikkelen van nieuwe symptomen en moet zijn contacten strikt beperken (zeker met personen die risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte) en de hygiënische maatregelen toepassen.
- **“Dag 0” is steeds de dag van het laatste hoog-risico contact.** Voor personen die onder hetzelfde dak wonen, kan dat laatste hoog-risico contact op verschillende momenten vallen, afhankelijk van het gedrag van het indexgeval. Indien het indexgeval zich niet kan of wil isoleren van zijn huisgenoten (bv. in geval van jonge kinderen), zal het laatste hoog-risico contact pas op het einde van de besmettelijke periode (isolatieperiode) van het indexgeval zijn. Om een langdurige quarantaine en secundaire besmettingen binnen het huishouden te vermijden, is het aan te raden om ook binnen het huishouden de isolatieregels strikt toe te passen, zie hygiëneadvies voor de patiënt en zijn omgeving.
- Hoog-risico contacten die symptomen ontwikkelen die bij COVID-19 kunnen passen moeten zich isoleren en een afspraak maken voor een test.

- Vanaf 31 december 2020 moeten **alle reizigers die terugkeren uit een rode zone⁹ (>48H)** zichzelf bij terugkeer onmiddellijk in quarantaine plaatsen. Meer uitleg vindt u in de procedure voor reizigers.
- Terugkerende reizigers uit een oranje zone worden niet langer getest, noch in quarantaine geplaatst.
- **Personen die minder dan twee maanden geleden een positieve PCR-test hadden voor COVID-19 en nu geïdentificeerd werden als hoog-risico contact van een COVID-geval, moeten niet in quarantaine.** Dit geldt enkel voor personen waarbij de infectie bevestigd werd met behulp van een positieve PCR test. Het is wel belangrijk op te merken dat er in de huidige wetenschappelijke literatuur nog veel onduidelijkheid heerst over immuniteit na een doorgemaakte infectie, bv. of er ook bescherming is tegen dragerschap, of iedereen antistoffen aanmaakt en hoelang de immuniteit duurt.

4.2. ZORGPROFESSIONALS

- Na **hoog-risico contact met een bevestigd geval** (zie procedure contact):
 - De algemene regel is dat personen na een hoog-risico contact in quarantaine geplaatst en getest moeten worden worden, volgens de regels in de procedure contact. Dit geldt ook voor zorgprofessionals.
 - Indien de persoon asymptomatisch blijft, kan een test uitgevoerd worden op dag 7 na de dag van het laatste hoog-risico contact. Bij negatief resultaat kan het werk hervat worden.
 - Bij hoge uitzondering kan een asymptomatisch hoog-risico contact verder werken om de continuïteit van de zorgen te garanderen. Deze uitzondering kan enkel ingeroepen worden voor personeel dat noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen, niet voor ondersteunend personeel zoals kuispersoneel en keukenpersoneel. Voor personeel in ziekenhuizen wordt de beslissing steeds genomen in samenspraak met de directie en de dienst ziekenhuishygiëne/coördinerend raadgever arts, voor gezondheidspersoneel in 1e lijn dient afgestemd worden met de 1e lijnszone/wachtkring. Deze uitzondering geldt enkel voor preventieve quarantaine, niet voor isolatie na een positieve test (zie verder).
- Na een **positieve test** bij een zorgprofessional die zelf asymptomatisch is:
 - De regel is dat er 7 dagen strikte thuisisolatie moeten volgen, te tellen vanaf de datum van staalname.
 - Bij **hoge uitzondering**, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan gevraagd worden om te komen werken. Er moet dan aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
 - Deze uitzondering kan enkel ingeroepen worden voor personeel dat noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen. Voor ondersteunend personeel zoals kuispersoneel en keukenpersoneel kan deze uitzondering niet ingeroepen worden.
 - De beslissing wordt altijd genomen in samenspraak met de directie en de dienst ziekenhuishygiëne of coördinerend raadgevend arts. Voor de 1e lijn dient afgestemd te worden met de 1e lijnszone/wachtkring.
 - Deze personeelsleden mogen enkel ingezet worden voor de zorg van COVID-19 patiënten in een COVID-19 eenheid.
 - Personeelsleden kunnen nooit verplicht worden om tijdens hun isolatieperiode te werken.
 - Contact met andere personen en collega's moet vermeden worden. De COVID-positieve werknemers gebruiken indien mogelijk een aparte ingang, aparte

⁹ Uitzonderingen bv voor professionele reizen vindt u hier : <https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/>

kleedkamer, aparte ontspanningsruimten, eigen vervoer (geen openbaar vervoer) enz.

- Daarenboven is het inzetten van COVID-positieve asymptomatische personeelsleden tijdens de isolatieperiode NOOIT toegestaan in de volgende omstandigheden:
 - Het testresultaat toont een hoge virale lading/ lage ct-waarde (≤ 25)
 - Het personeelslid testte positief met een rapid antigen test
 - Het personeelslid voelt zich angstig/oncomfortabel bij de gedachte te moeten werken tijdens de isolatieperiode
 - Het personeelslid wordt ingezet op een niet-COVID afdeling

5. Voorzorgsmaatregelen voor de huisarts

5.1. BIJ HET KLINISCH ONDERZOEK

Als u in fysiek contact komt met een mogelijke COVID-19 patiënt, tijdens de consultatie/het huisbezoek:

1. Geef de patiënt een chirurgisch mondmasker (het virus verspreidt zich hoofdzakelijk via druppelinfectie over +/- 1,5 m).
2. Draag een chirurgisch mondmasker¹⁰, overschort, spatbril en handschoenen tijdens het klinisch onderzoek.
3. Was na de raadpleging uw handen met zeep of gebruik handalcohol.
4. Ontsmet uw stethoscoop en ander medisch materiaal dat mogelijks in contact gekomen is met de patiënt.
5. Ontsmet oppervlakken (van onderzoekstafel, deurklinken, bureau...) met het ontsmettingsmiddel dat u gewoonlijk gebruikt (*het coronavirus wordt geïnactiveerd door zeep en bijna alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen*).

N.B. Problemen rond bevoorrading van beschermingsmiddelen en ander medisch materiaal kunnen gemeld worden via https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl.

5.2. ALGEMENE OVERWEGINGEN

Net als elke andere persoon kan ook de arts zelf besmet worden met COVID-19. Hij moet ten allen tijde extra aandacht besteden aan de algemene hygiënische maatregelen en op het eventuele verschijnen van symptomen suggestief voor COVID-19.

Indien zich symptomen ontwikkelen dient een test afgenomen te worden.

Het is aangeraden dat de huisarts bij elk klinisch onderzoek van patiënten zonder COVID-symptomen een mondmasker draagt. Dit is bij voorkeur een chirurgisch mondmasker maar kan vervangen worden door een mondmasker van textiel indien geen chirurgische maskers voorradig zijn.

Algemene informatie over de organisatie van de praktijk, is te vinden in https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf

¹⁰ Kan in epidemische omstandigheden 8 uur worden gedragen (zie advies van de Hoge Gezondheidsraad 2020)

6. Verdere overwegingen

- De uitgebreide teststrategie en het toenemende aantal asymptomatische personen dat wordt getest, bv. pre-operatief of voor een reis, leiden soms tot problemen bij interpretatie van een zwak-positief PCR-resultaat. Het is gekend uit de literatuur dat patiënten soms (zeer) lange tijd positief kunnen testen zonder dat ze besmettelijk zijn. Onderstaande criteria hebben tot doel om microbiologen en klinici te helpen bij de interpretatie van een zwak-positief PCR resultaat. Ze zijn geen vervanging van de indicaties voor testen en de geldende procedures: personen die reeds gediagnosticeerd werden met een positieve PCR dienen in het algemeen niet hertest te worden in de daaropvolgende 8 weken.
- Een positief PCR testresultaat kan in de praktijk als **oude infectie** beschouwd worden (en de patiënt dus als niet-infectieus) indien alle 4 onderstaande criteria vervuld waren op het moment van staalname:
 - de persoon vertoonde geen COVID-symptomen gedurende minstens 1 week. Indien er tevoren ernstige symptomen waren, moet de start daarvan minstens 4 weken geleden zijn;
 - de persoon had geen contact met een bevestigd positief geval in de afgelopen 3 weken (2 weken incubatie + 1 week infectieuze periode);
 - het PCR-resultaat toonde een lage virale RNA-belasting (bvb. hoge Ct-waarde, <100.000 RNA-kopieën/ml, ...) ¹¹
 - er was een eerdere positieve PCR-test, minstens 1 week voor de staalname, of een gekende positieve serologie.
- RISICOGROEPEN** voor een ernstig verloop van COVID-19: u vindt aanbevelingen voor volwassenen [hier](#) en voor kinderen [hier](#)

7. Praktische richtlijnen bij het vaststellen van een overlijden

- Uitgebreide info is beschikbaar in een aparte procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_deaths_NL.pdf
- Bij het overlijden van een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19 moet de arts op het overlijdensattest (Model IIIC of IIID) op strook A bij rubriek 'bezwaar tegen schenking lichaam (2)' "ja" aankruisen (zie voorbeeldformulier hieronder). Kisting in een hermetische doods-kist is **niet** noodzakelijk.
- Op de strook A moet gespecificeerd worden dat het gaat om een (mogelijk) overlijden aan COVID-19 (zie voorbeeldformulier hieronder).

Model IIIC
STROOK A
AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR OF OUDER
(Beroep in te vullen door de geneesheer en te bevestigen door het gemeentebestuur)

Naam en voornaam van de overledene: _____
 Burgerschap(s) (of woonplaats) van: _____
 Overlevingsplaats: gemeente: _____
 straat, nr.: _____
 Datum (DOMINIAAL) en uur (SUMMA) van overlijden: _____
 Adres van overlijden: gemeente: _____
 straat, nr.: _____
 Nummer van de overlijdensakte: _____
 Geslacht van de overledene: ☐ mannelijk ☐ vrouwelijk ☐ onbekend

Een (mogelijk) COVID-19 overlijden

Bezwaar tegen eventuele
 • crematie (4) ☐ ja ☐ neen
 • conserveringstechnieken (5) ☐ ja ☐ neen
 • vervoer zonder kist (6) ☐ ja ☒ neen

Risico voor blootstelling aan
 ioniserende stralen (3) ☐ ja ☐ neen

Gerechtigd-geneeskundig bezwaar
 tegen begraving of crematie (1) ☐ ja ☐ neen

Bezwaar tegen
 schenking van het lichaam (2) ☒ ja ☐ neen

Verplichte onmiddellijke kisting
 • in een hermetische kist (3) ☐ ja ☒ neen

Bezwaar tegen eventuele
 • crematie (4) ☐ ja ☐ neen
 • conserveringstechnieken (5) ☐ ja ☐ neen
 • vervoer zonder kist (6) ☐ ja ☒ neen

Risico voor blootstelling aan
 ioniserende stralen (3) ☐ ja ☐ neen

¹¹ Zie voor meer info: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19-PCR_INTERPRETATION_NL.pdf

8. Contactgegevens dienst Infectieziektebestrijding van uw regio

De huisarts contacteert de dienst infectieziektebestrijding indien hij vragen heeft, er zich een bijzondere situatie voordoet of voor de verplichte meldingen (cf. kader hieronder).

- VLAANDEREN:**

Binnen de kantooruren: www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie

- Antwerpen: 03/224.62.06
- Limburg: 011/74.22.42
- Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
- Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
- West-Vlaanderen: 050/24.79.15

Buiten de kantooruren: 02/512.93.89

Infectieziektebestrijding@vlaanderen.be

Webform voor het registreren van clusters in Vlaanderen:
<https://www.zorg-en-gezondheid.be/bron-en-clusteronderzoek>

- BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST – RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE:**

02 552 01 91

COVID-hyg@ccc.brussels

Interface Matra –Bru: <https://www.wiv-isp.be/matra/bru/connexion.aspx>

- WALLONIË (AVIQ) EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP :**

071/337.777

surveillance.sante@aviq.be

<https://www.aviq.be/coronavirus-professionnels.html>

- o Meld de mogelijke en bevestigde gevallen van COVID-19 (inclusief overlijdens veroorzaakt door een mogelijke of bevestigde COVID-19 infectie) van bewoners en personeelsleden van door AVIQ erkende residentiële collectiviteiten via de online toepassing: <https://portail-plasma.aviq.be>
- o Overlijdens door COVID-19 buiten de ziekenhuizen of door AVIQ erkende residentiële collectiviteiten dienen gemeld te worden op de MATRA interface:
https://www.wiv-isp.be/matra/CF/aviq_covid.aspx


WELKE GEVALLEN MOETEN GEMELD WORDEN

De verplichte melding van alle verdachte gevallen gebeurt via het eFormulier Huisartsen moeten ENKEL nog volgende gevallen melden:


- overlijdens veroorzaakt door mogelijke of bevestigde COVID-19 buiten het ziekenhuis of woonzorgcentrum
- clusters van bevestigde COVID-19 in residentiële collectiviteiten (gevangenis, opvangcentrum...), uitgezonderd woonzorgcentra die reeds over hun eigen surveillance-systeem beschikken.
- In Vlaanderen: alle clusters (≥2 besmettingen in een groep binnen 14d) via het webformulier of de mspoc van de zorgraad

9. Samenvatting


A) Patiënt vereist ziekenhuisopname



B) Patiënt met milde of matige klachten



10. Schema Call Center (voor meer info: zie [procedure contact](#))



* Werken is per hoge uitzondering toegestaan indien dit nodig is voor de continuïteit van de zorgen, mits bijkomende maatregelen gerespecteerd worden, zie voor details de procedure contact

BIJLAGE 1: Getuigschrift van quarantaine en arbeidsongeschiktheid

GETUIGSCHRIFT VAN "QUARANTAINÉ"

bestemd voor de werkgever van de patiënt / voor de patiënt die zelfstandig is

Ik, ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar vandaag te hebben ondervraagd

Naam, voornaam van de patiënt:

.....

Identificatienummer van het rijksregister van de patiënt:

.....

Ik verklaar het volgende:

Deze persoon is arbeidsgeschikt, maar mag zich niet naar de werkplek begeven

van ... / ... / 2020 tot ... / ... / 2020 (inbegrepen).

Dit getuigschrift betreft:

- het begin van de quarantaine
- een verlenging van de quarantaine.

De woning verlaten is niet toegestaan.

Identificatie van de arts met RIZIV-nummer:

Handtekening

Datum : ... / ... / 2020

GETUIGSCHRIFT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

bestemd voor de werkgever van de patiënt / voor de patiënt die zelfstandig is

Ik, ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar vandaag te hebben ondervraagd

Naam, voornaam van de patiënt:

.....

Identificatienummer van het rijksregister van de patiënt:

.....

Ik verklaar het volgende:

Deze persoon is arbeidsongeschikt van ... / ... / 2020 tot ... / ... / 2020 (inbegrepen) wegens
ziekte/ongeval/zwangerschap.

Dit getuigschrift van arbeidsongeschiktheid betreft:

- het begin van de ongeschiktheid
- een verlenging van die ongeschiktheid.

Woning verlaten toegestaan: JA / NEE

Identificatie van de arts met RIZIV-nummer:

Handtekening

Datum : ... / ... / 2020



BIJLAGE 2: eFormulier “Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2”

COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19

Ga na

Voor aanvraag van serologie dient geen formulier ingevuld te worden

1 Gegevens aanvragende arts

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RIZIV nummer (arts) - verplicht

Werkt u (huidige voorschrijver) vanuit een ziekenhuis of andere zorgorganisatie - verplicht

Stuur een kopie van de resultaten naar

2 Patiëntgegevens

Persoonlijke informatie

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RRN - verplicht

Geboortedatum - verplicht

Geslacht - verplicht

Contact informatie van de patiënt

Bevestiging patiënt vragen dat dit het juiste telefoonnummer is waarop hij/zij gecontacteerd kan worden

Telefoonnummer - verplicht

Bijkomend telefoonnummer

Noodnummer(s) patiënt

U kan maximaal 2 noodnummers toevoegen.

[+ Noodnummer toevoegen](#)

Verblijfsadres in België

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Land waar de patiënt woont

Land - verplicht

Is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker? - verplicht

3 Klinische gegevens

Type contact met de zorgverlener

Contact type

De datum en het tijdstip waarop het contact heeft plaatsgevonden - verplicht

25-08-2020 08:50



Vertoont de patiënt symptomen - verplicht

Ja Nee

Reden van aanvraag analyse - verplicht

Screening ziekenhuisopname (non-COVID) en dagziekenhuis



Is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis - verplicht

Ja Nee

Aantal afnames per ziekteperiode - verplicht

1e afname 2e afname >2e afname

4 Gegevens over het staal

Werd er een staal afgenomen? - verplicht

Ja Nee

Waarom werd er geen staal afgenomen? - verplicht

Doorverwezen naar laboratorium



Naam laboratorium - verplicht

Zoek een labo

4 Coronalert mobiele app

Deze sectie is reeds toegevoegd in het kader van de app CoronAlert. Deze app zal beschikbaar zijn in september en deze velden moeten dus nog niet ingevuld worden.

Heeft de patiënt de Coronalert-app geïnstalleerd op zijn/haar smartphone? - verplicht

Ja Nee

Identificatiecode (17 cijfers) gegenereerd in de Coronalert-app op de telefoon van de patient en door de patiënt aan de arts doorgegeven. Koppelt een test aan een telefoon - verplicht

Bevat de datum waarop de patiënt besmettelijk werd en wordt weergegeven in de Coronalert-app van de patient. - verplicht

01-01-1970



Patiënt heeft een waarschuwing voor hoog risico ontvangen in de Coronalert-app. - verplicht

Ja Nee

Altijd op "versturen" drukken voor de melding bij vermoeden van COVID-19, anders kan er géén contact opvolging opgestart worden indien nodig. Er is een pdf van het formulier beschikbaar in uw elektronisch medisch dossier dat afgeprint kan worden.

BIJLAGE 3: eFormulier 2: “Aanvraag contactopvolging bij negatief testresultaat”



Met dit formulier vraagt u contacttracing van uw patiënt aan want u heeft een zeer sterk vermoeden dat de patiënt besmet is met COVID-19 ondanks een negatief testresultaat.

1 Gegevens aanvragende arts

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RIZIV nummer (arts) - verplicht

Werkt u (huidige voorschrijver) vanuit een ziekenhuis of andere zorgorganisatie

Ja

Nee

2 Patiëntgegevens

Persoonlijke informatie

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RRN - verplicht

Geboortedatum - verplicht

Geslacht - verplicht

Man

Vrouw

Onbekend

Contact informatie van de patiënt

Bevestiging patiënt vragen dat dit het juiste telefoonnummer is waarop hij/zij gecontacteerd kan worden

Telefoonnummer - verplicht

Bijkomend telefoonnummer

Verblijfsadres in België

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Land waar de patiënt woont

Land - verplicht

3 Gegevens over het staal

Identificatienummer van het afgenomen staal

De datum waarop de test uitgevoerd is - verplicht

01-01-1970 

Het resultaat van de test. Indien niet uitgevoerd of onbepaald, rapporteer als 'Niet conclusief' - verplicht

☐ Gedetecteerd ☐ Niet conclusief ☐ Niet gedetecteerd ☐ Specimen niet geschikt voor analyse

Waar werd het staal getest? - verplicht

☐ Cyberlab federaal platform ☐ Labo

4 Coronalert mobiele app

Deze sectie is reeds toegevoegd in het kader van de app CoronAlert. Deze app zal beschikbaar zijn in september en deze velden moeten dus nog niet ingevuld worden.

Heeft de patiënt de Coronalert-app geïnstalleerd op zijn/haar smartphone? - verplicht

☒ Ja ☐ Nee

Identificatiecode (17 cijfers) gegenereerd in de Coronalert-app op de telefoon van de patient en door de patiënt aan de arts doorgegeven. Koppelt een test aan een telefoon - verplicht

Bevat de datum waarop de patiënt besmettelijk werd en wordt weergegeven in de Coronalert-app van de patient. - verplicht

01-01-1970 

Patiënt heeft een waarschuwing voor hoog risico ontvangen in de Coronalert-app. - verplicht

☐ Ja ☐ Nee

Altijd op "versturen" drukken voor de aanvraag contactopvolging bij negatief testresultaat COVID-19.

BIJLAGE 4: eFormulier 3: “Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van besmetting COVID-19, onafhankelijk van het testresultaat”

COVID-19: Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van COVID-19

Ga naar 

Indien u reeds het eFormulier “Melding Sciensano - Labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2” heeft ingevuld en wacht op de resultaten is het niet nodig dit formulier in te vullen. Dit formulier kan gebruikt worden om direct contacttracing aan te vragen wanneer u heeft een zeer sterk vermoeden heeft van besmetting met COVID-19 heeft (ongeacht het test resultaat), of voor mensen die niet kunnen of willen getest worden.

1 Gegevens meldende arts

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RIZIV nummer (arts) - verplicht

2 Patiëntgegevens

Persoonlijke informatie

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RRN - verplicht

Geboortedatum - verplicht

Geslacht - verplicht

Contact informatie van de patiënt

Bevestiging patiënt vragen dat dit het juiste telefoonnummer is waarop hij/zij gecontacteerd kan worden

Telefoonnummer - verplicht

Bijkomend telefoonnummer

Noodnummer(s) patiënt

U kan maximaal 2 noodnummers toevoegen.

 [Noodnummer toevoegen](#)

Verblijfadres in België

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Verblijfadres in België

Land - verplicht

Is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker? - verplicht

BIJLAGE 5: Formulier oplisting contacten

Lijst met contacten in verband met besmetting met het coronavirus (Covid-19)

Een lijst maken van de personen waarmee u de laatste dagen contact had, is niet altijd gemakkelijk.

Dat heeft in de eerste plaats met de tijd te maken. Hoe verder u in het verleden terug gaat, hoe lastiger het is om zich alles te herinneren. Ga dus volgens een plan te werk. Begin bij “vandaag”. Dat is waarschijnlijk de dag dat een test bij u afgenomen is. Begin bij de ochtend, dan de namiddag en dan de avond. Hebt u contacten waarvan u liever niet wil dat iemand ze kent? Weet dat de persoon die u zal bellen vanuit het “Covid-19 Contact Tracing Team call center” tot geheimhouding verplicht is: uw naam, uw lijst met contacten en andere informatie die u geeft voor dit contactonderzoek blijven strikt vertrouwelijk en zullen nooit gedeeld worden met de politie, gezins- en familieleden of huisgenoten, werkgever of school... Het contactonderzoek wordt ook op geen enkele manier gebruikt om te controleren of u zich aan de COVID-19-maatregelen van de overheid hebt gehouden. We gebruiken de informatie uit het contactonderzoek enkel en alleen om uw contactpersonen advies te geven over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze de ziekte verspreiden. Ook aan uw contactpersonen zeggen we uw naam niet, u blijft anoniem.

Denk aan verschillende **types** contact. Sommige contacten zal u zich gemakkelijk herinneren, anderen schieten u mogelijk later te binnen en dat is geen probleem.

- Mensen die met u samen wonen zoals uw gezinsleden of huisgenoten
- Uw lief of partner die niet met u onder 1 dak woont
- Uw klasgenoten, naaste collega's of andere personen die eenzelfde ruimte met u deelden
- Personen met wie u zich samen hebt verplaatst in een auto, bus, vliegtuig ...
- Personen met wie u om een andere redenen samen was
- ...

Lijst in de volgende tabellen uw contacten op tot en met twee dagen voor u zich ziek begon te voelen of ziekteklachten kreeg hebt gevoeld zoals hoest, koorts, kortademigheid, griepig gevoel

U hebt net een Corona-test gehad. We beseffen dat het zeker onder deze omstandigheden voor u niet eenvoudig is om na te denken over met wie u contact had en ook niet om die op te lijsten. We willen u van harte bedanken dat u hier aan meewerkt en ons zo helpt om de verdere verspreiding van de ziekte tegen te houden in uw buurt en gemeente, in Vlaanderen en België.

Uw huisarts en het Covid-19 Contact Tracing Team.

DAG VAN de Coronatest:												
Naam	Voornaam	Telefoon	Huisgenoten	Lief / partner niet samenwonend	klasgenoten	collega	Zelfde transportmiddel (auto, bus, vliegtuig,...)	Ander contact	Contact op een afstand kleiner dan 1,5 meter?	Contact duurde langer dan 15 minuten?	Was er lichamelijk contact?	Werkt de persoon in de zorg als verpleegkundige, verzorgende, arts, kinesist,...
			J/ N	J/N	J/ N	J/ N	J/N		Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen
	water											

Dag VOOR DE AFNAME van de Coronatest:												
Naam	Voornaam	Telefoon	Huisgenoten	Lief / partner niet samenwonend	klasgenoten	collega	Zelfde transportmiddel (auto, bus, vliegtuig,...)	Ander contact	Contact op een afstand kleiner dan 1,5 meter?	Contact duurde langer dan 15 minuten?	Was er lichamelijk contact?	Werkt de persoon in de zorg als verpleegkundige, verzorgende, arts, kinesist,...
			J/ N	J/N	J/ N	J/ N	J/N		Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen

TWEE DAGEN VOOR de Corona testafname:

Naam	Voornaam	Telefoon	Type contact?	Contact op een afstand kleiner dan 1,5 meter?	Contact duurde langer dan 15 minuten?	Was er lichamelijk contact?	Werkt de persoon in de zorg als verpleegkundige, verzorgende, arts, kinesist,...
			(zie uitleg hierboven)	Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen

..... DAGEN VOOR de Corona testafname:

Naam	voornaam	telefoon	Type contact?	Contact op een afstand kleiner dan 1,5 meter?	Contact duurde langer dan 15 minuten?	Was er lichamelijk contact?	Werkt in de zorg als verpleegkundige, verzorgende, arts, kinesist,...

			(zie uitleg hierboven)	Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen	Ja / Neen

ARCHIEF

BIJLAGE 6: Advies voor de patiënt en zijn contacten

Hygiëadvies voor de patiënt met symptomen van COVID-19 die thuis geïsoleerd is:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_NL.pdf

Hygiëadvies voor asymptomatische hoog-risico contacten van een patiënt met COVID-19:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf

Hygiëadvies voor asymptomatische laag-risico contacten van een patiënt met COVID-19:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_lowriskcontact_NL.pdf

BIJLAGE 7: eFormulier COVID-19 : Mededeling resultaat COVID-19 sneltest

COVID-19: Mededeling resultaat COVID-19 sneltest

Ga naar

1

Gegevens arts die de test afneemt

RIZIV nummer (arts) - verplicht

0-00000-00-000

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

2

Patiëntgegevens

Persoonlijke informatie

Voornaam - verplicht

Achternaam - verplicht

RRN - verplicht

74.05.12-141.21

Geboortedatum - verplicht

12-05-1974

Geslacht - verplicht

Man

Vrouw

Onbekend

Contact informatie van de patiënt

Bevestiging patiënt vragen dat dit het juiste telefoonnummer is waarop hij/zij gecontacteerd kan worden

Telefoonnummer - verplicht

+32 3 664 75 89

Bijkomend telefoonnummer

055 55 55 55

Noodnummer(s) patiënt

U kan maximaal 2 noodnummers toevoegen.

Noodnummer toevoegen

Verblijfsadres in België

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Land waar de patiënt woont

Land - verplicht

Is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker? - verplicht

Ja

Nee

3

Klinische gegevens

Type contact met de zorgverlener

Contact type

De datum en het tijdstip waarop het contact heeft plaatsgevonden - verplicht

09-12-2020 15:57

Vertoont de patiënt symptomen - verplicht

Ja

Nee

Aanvang van de symptomen - verplicht

09-12-2020

Reden van aanvraag analyse - verplicht

Is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis - verplicht

Ja

Nee

4 Gegevens over het staal

Identificatienummer van het afgenomen staal (barcode van de wisser) - verplicht

☐ Identificatienummer is niet beschikbaar

Afnametijdstip - verplicht

09-12-2020 15:57 

Type staal - verplicht

Uitstrijk van nasofarynx

Uitstrijk van orofarynx

Uitstrijk van inwendige neus

Uitstrijk van uitwendig neusgat

Speeksel specimen

Gecombineerde uitstrijk van orofarynx en het uitwendig neusgat

5 Test uitgevoerd op het staal

Tijdstip waarop de test is uitgevoerd - verplicht

09-12-2020 15:57 

Resultaat staal - verplicht

Gedetecteerd

Niet conclusief

Niet gedetecteerd

Specimen niet geschikt voor analyse

6 Coronalert mobiele app

Heeft de patiënt de Coronalert-app geïnstalleerd op zijn/haar smartphone? - verplicht

Ja

Nee

Bevat de datum waarop de patiënt besmettelijk werd en wordt weergegeven in de Coronalert-app van de patiënt. - verplicht

01-01-1970 

Identificatiecode (17 cijfers) gegenereerd in de Coronalert-app op de telefoon van de patiënt en door de patiënt aan de arts doorgegeven. Koppelt een test aan een telefoon - verplicht

Patiënt heeft een waarschuwing voor hoog risico ontvangen in de Coronalert-app. - verplicht

Ja

Nee

Altijd op "versturen" drukken voor de melding bij vermoeden van COVID-19, anders kan er géén contact opvolging opgestart worden indien nodig. Er is een pdf van het formulier beschikbaar in uw elektronisch medisch dossier dat afgeprint kan worden.

7 CTPC (COVID19 Test Prescription Code)

Al gebruikt u een antigen rapidtest, dan is het nog aangeraden om een CTPC code aan te vragen. Deze code (CTPC) vindt u nadien terug in de print-out van dit formulier.

Nadat je een CTPC hebt aangevraagd kan je de gegevens in het formulier niet meer wijzigen!

Vraag CTPC-code aan.

CTPC code - verplicht

XXXX XXXX XXXX XXXX