

## SOP (Standard Operating Procedure) Coronavirus: Aanbevelingen voor de apotheek/ apotheker (versie 11)

APB in samenwerking met AUP, VAN en OPHACO hebben een Task Force opgericht die een aantal **aanbevelingen** heeft opgesteld. Deze zullen u helpen je missie op het vlak van volksgezondheid in de best mogelijke omstandigheden te vervullen.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de algemene richtlijnen van de overheid, en ook op documenten van het CDC (center for disease control), WHO (World Health Organisation), NHS (National Health Service) en overkoepelende apothekersorganisaties zoals FIP (International Pharmaceutical Federation) en PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) en werden tevens goedgekeurd door de vakbonden.



### SOP (Standard Operating Procedure) Coronavirus: Aanbevelingen voor de apotheek/ apotheker (versie 11)

#### Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn apotheek en het personeel niet besmet geraakt?

1. Hoe vermijden dat zieke patiënten in de apotheek komen ?
2. Hoe zorgt u ervoor dat de apotheek een veilige zone blijft?
3. Wat moet ik doen na contact met een mogelijks besmette persoon?
4. Hoe gebeurt de afhandeling van medicatieoverdracht met/voor een covid+ patiënt
5. Wat bij sluiting apotheek door ziekte, wat met de wachtdienst?

Bijlage: Procedure onderhoud lokalen

Documentatiedienst APB ● Redactedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april , 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 en 31 augustus 2021

Download : [MyAPB](#) > [All news content](#) > [Professioneel nieuws](#) > [FAQ Coronavirus](#)

### 1. Hoe vermijden dat zieke patiënten in de apotheek komen ?

- COVID + patiënten dienen in thuisisolatie te blijven en kunnen geholpen worden via thuislevering. [Meer info over thuislevering](#) .
- Afficheer aan de buitenkant van de apotheek duidelijk dat patiënten die beantwoorden aan de definitie van een "mogelijk geval van COVID-19" in de eerste plaats hun huisarts moeten raadplegen. Ze dienen een mondkmasker te dragen vooraleer binnen te komen. Overhandig indien nodig zelf een mondkmasker. Laat deze patiënt ook zijn handen desinfecteren vooraleer te bedienen.

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met<sup>1</sup>:

- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, dyspnoe, thoracale pijn, acute anosmie of dysgeusie;  
OF
- minstens twee<sup>2</sup> van de volgende symptomen zonder andere duidelijke oorzaak: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val<sup>3</sup>.  
OF
- verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...), zonder andere duidelijke oorzaak.

Een affiche is [hier](#) beschikbaar.

- Dring er bij twijfel over de etiologie van de klachten op aan om zich zo snel mogelijk te laten testen. Patiënten waarbij u COVID-19 vermoedt, dienen zo snel mogelijk de apotheek te verlaten.

<sup>1</sup> <https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsedefinitie-en-testing>

<sup>2</sup> Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie

<sup>3</sup> Deze laatste symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.

## 2. Hoe zorgt u ervoor dat de apotheek een veilige zone blijft?

### PATIËNTEN

- Hang de preventiemaatregelen duidelijk zichtbaar uit in uw apotheek. Een mogelijke affiche vindt u [hier](#)
- Hou 1,5 m afstand. Een lijn kleven op de grond kan helpen om deze afstandsregel aan de patiënten duidelijk te maken.
- Organiseer de toegang tot de apotheek maximaal in functie van het bewaren van de afstand > 1,5m :
  - Streef naar maximaal één bezoeker per 10m<sup>2</sup> publieksruimte; voorziet indien mogelijk éénrichtingsverkeer met markeringen of andere aanduidingen en voorrangsregels aan de deuropeningen (buitengaand krijgt voorrang) Indien de publieksruimte kleiner is dan 20m<sup>2</sup> kunnen maximaal 2 externe personen toegelaten worden.
  - Onafhankelijk hiervan kan er één bezoeker per geopende balie in de apotheek toegelaten worden.
  - Bezoekers komen alleen binnen. Deze persoon kan worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft.
  - Voorzie indien nodig buiten, maar ook in de apotheek afstandsmarkeringen op 1.5 meter van elkaar, zodat mensen afstand houden bij het aanschrijven.
  - Plexiglas of een andere afscherming aan de toeg, biedt bijkomende bescherming. Een mondkap is evenwel verplicht.
  - Beperk de displays in de apotheek, zodat voldoende ruimte blijft voor mensen om de afstandsregels te respecteren, en het onderhoud van vloeren, displays enz niet nodeloos bemoeilijkt wordt.
- Voorzie voor de patiënten een dispenser met hydro-alcoholische oplossing of gel in de publieke ruimte van de apotheek, indien mogelijk nabij de ingang. Voorzie ook chirurgische mondkapen voor de patiënt indien fysiek contact nodig is. Evenals papieren zakdoeken en een af te sluiten vuilnisbak.

- Betalingen:
  - Vraag met aandrang om digitaal te betalen ([affiche](#) ).

De meeste betaalkaarten en terminals kunnen een contactloze betaling verwerken tot €50 zonder vereiste ingave van de code.

Indien betaling via bancontacttoestel mét code: Voorzie voor de patiënt materiaal om contact met het klavier te voorkomen (wattenstaafjes, papieren zakdoekjes, ... om de toetsen mee in te duwen). Voorzie ook een vuilnisbakje om dat materiaal achteraf weg te gooien. Verwijder dat afval dagelijks in een gesloten plastic zak die je bij het gewone huisvuil kan meegeven. Neem reiniging en ontsmetting van het toestel mee op in de reinigingsprocedure van de balie. Werk bij voorkeur met een toestel dat gekoppeld is een de apotheksoftware, of bestaat uit een aparte klant- en handelaar interface.
  - Aanvaard alleen in uitzonderlijke gevallen cash geld en was dan je handen achteraf.
- Bedien COVID-19 verdachte patiënten met persoonlijke bescherming voor zowel personeel (masker en plexi) als patiënt (masker).

### PERSONEEL

- De apothek-eigenaar / werkgever is verantwoordelijk voor het voorzien van het materiaal dat noodzakelijk is voor de gepaste hygiënemaatregelen en het psychosociaal welbevinden van het personeel.
- **Vaccinatie EN** mondmasker vormen de eerste bescherming naar de patiënten toe.
- Het dragen van een witte schort is geen verplichting maar een raadgeving. Naast een witte schort voor bereidingen raden wij aan bij het bedienen van de patiënten ook een schort te dragen. In het geval van vermoeden van contact met een besmette patiënt kan snel van schort gewisseld worden. Was de schorten op 60°, al dan niet met ander te wassen materiaal, zoals handdoeken. Alle schorten en ander te wassen materiaal worden op één locatie gewassen, en in zo weinig mogelijk beurten. Als de schorten drie dagen onaangeraakt bewaard kunnen worden in een daarvoor voorziene container of vuilzak, is er een sterk verlaagd risico op overdracht. Markeer die container of zak duidelijk met inhoud en datum.
- De beschermingschort wordt verwijderd en de handen worden gewassen vooraleer er gegeten wordt.

**Documentatiedienst APB** ● Redactiedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april , 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 **en 31 augustus 2021**

Download : [MyAPB](#) > [All news content](#) > [Professioneel nieuws](#) > [FAQ Coronavirus](#)

- Voorzie in de lunch- of pauzeruimtes een afstand van 1.5m tussen de personeelsleden of werk met plexischermen. Spreid indien nodig pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen, en beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen in lunch- of pauzeruimtes.
- Maak op voorhand duidelijke afspraken indien nauw contact met de patiënt nodig is (< 1,5m), zowel binnen het team als naar de patiënt toe:
  - ~~De basisregel blijft om lichamelijk contact te vermijden.~~
  - ~~Niemand van het personeel kan verplicht worden tot fysiek contact met een patiënt of klant. Indien in het hele apotheek team niemand bereid is, dient dit correct aan de patiënt meegedeeld te worden, en in de mate van het mogelijke een oplossing voorgesteld te worden.~~
    - Bij fysiek contact draagt zowel de patiënt als het lid van het apotheekteam een chirurgisch masker. Bijvoorbeeld opmeten steunkousen, bloeddruk,...
    - Plexiglas of een andere afscherming aan de toeg, biedt bijkomende persoonlijke bescherming, ook bij gesprekken voorafgaand aan fysiek contact.
    - Wanneer je niet achter plexiglas kan werken, is een masker een absoluut minimum.
- Zorg ervoor dat de leden van het apotheek team ook de aanduidingen respecteren (bv gebruik deur, éénrichtingsverkeer, ...).
- Indien teamleden onderling op minder dan 1.5m van elkaar opereren gedurende meer dan 15 minuten (cumulatief), is een masker sterk aangewezen.
- Bewaar een goede desinfectie/ hygiëne:
  - Duid een verantwoordelijke aan voor desinfecteren en reinigen: organisatie, opvolging uitvoering en afvoer afval (risicovol of niet).
  - Let erop dat alle teamleden de tijd krijgen om geregeld hun handen te wassen. Herinner daar regelmatig en actief aan. Stel eventueel een automatische *reminder* in op aflever-pc of gsm. Het kan handig zijn dat iedereen een flesje alcogel op zak heeft.
  - Voor en na elk fysiek contact met de patiënt worden de handen ontsmet.
  - Het gebruik van handschoenen vervangt een correcte handhygiëne niet. De gebruikelijke regels voor correcte handhygiëne dienen toegepast te worden (geen juwelen of polshorloges, zuivere kortgeknipte nagels).

**Documentatiedienst APB** ● Redactedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april , 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 **en 31 augustus 2021**

Download : [MyAPB](#) > [All news content](#) > [Professioneel nieuws](#) > [FAQ Coronavirus](#)

~~o Personeel kan best werken zonder juwelen. Lang haar wordt best opgestoken en lenzendragers kunnen beter opteren om een bril te dragen.~~

- o Vermijd de aanwezigheid van onnodige spullen, papier etc op uw toonbank en werkblad zodat dit makkelijk gereinigd kan worden.
- o Reinig regelmatig (elke 2 uur) alle risicovolle oppervlakten, zoals togen, deurklink, telefoon, lichtknoppen, trapleuning, toetsenbord, computermuis, bereidingsblad, betaalautomaat, ...) met 70%-85% alcohol.
- o Wees aandachtig voor ziektesymptomen bij het personeel van de apothek. Stuur personeelsleden met verdachte symptomen ogenblikkelijk naar huis. Zie ook punt 5 van dit document.

~~o Reinig indien mogelijk dagelijks de vloer van de apothek met water dat 2% – 4% bleekwater bevat (20 tot 40 ml bleekwater in een fles van 1 liter, aangevuld met leidingwater. Meer info over verdunning van bleekwater. Een aangepast document voor het reinigen van lokalen vindt u onderaan dit document.~~

- o Verlucht regelmatig de lokalen (bv. minstens 2 maal 30 minuten per dag). Als je een ventilatiesysteem hebt met aanvoer van verse buitenlucht, zet dan de stand hoger. Als je een aircosysteem hebt dat lucht hergebruikt en circuleert, zet dan het systeem uit voorzorg uit zolang de temperatuur beneden de 25°C blijft. Verplaatsbare ventilators vormen een gevaar voor een verdere verspreiding van virusaerosols en kunnen niet gebruikt worden.
- o Werk zoveel mogelijk met open deuren.
- o Toiletgebruik door patiënten is verboden, tenzij hiervoor een apart sanitair voorzien is.
  - o Het deksel van de toiletpot moet gesloten worden voor het doorspoelen. Er zijn geen bevestigde rapporten van faeco-orale transmissie maar viraal RNA is teruggevonden in stoelgang en urine van sommige COVID-19 patiënten. Door het deksel te sluiten voor het doorspoelen wordt vermeden dat er zich infectieuze druppeltjes vormen die in de ruimte kunnen blijven hangen<sup>4</sup>.
  - o De handen moeten gewassen worden na gebruik van het toilet.
  - o Reinig dagelijks de toiletbril, rand van het toiletdeksel, kraan en deurklink (gebruik hiervoor bv. verdund bleekwater of alcohol).

<sup>4</sup> [https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19\\_procedure\\_out%20patients\\_NL.pdf](https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf)

### 3. Wat moet ik doen na contact met een mogelijk besmette persoon?

Het beleid is er op gericht COVID+ patiënten in isolatie te plaatsen (testing, tracing, isolating).

Concreet komen er geen gekende COVID+ patiënten in de apotheek.

- Geef patiënten met symptomen liever een chirurgisch masker indien ze een masker uit textiel dragen en laat hen de handen desinfecteren om de andere aanwezigen zoveel mogelijk te beschermen.
- Herhaal de richtlijnen van de overheid, informeer de patiënt dat hij er alles moet aan doen om de besmetting van anderen te vermijden. Dit kan door zich af te zonderen en de persoonlijke hygiëne op te voeren. Een manier om dit te vragen kan bijvoorbeeld zijn: kreeg u de raadgeving zich te isoleren?
- Verwijder COVID+ patiënten zo snel mogelijk uit de apotheekruimte en spreek een thuislevering af.
- Het personeel dat in contact was met een symptomatische patiënt moet zich enkel isoleren bij een vastgesteld hoogrisico contact (chirurgische maskers en plexi bieden hier bescherming), **tenzij volledig gevaccineerd**. Zie verdere details in punt 5.

### 4. Hoe gebeurt de afhandeling van medicatieoverdracht met/voor een COVID+ patiënt (opm: iemand die getest is en nog op resultaat wacht, wordt op dat moment beschouwd als COVID+)

Als de patiënt een voorschrift elektronisch (via sms, e-mail, enz.) naar zijn vertrouwde apotheker stuurt of als hij voorschriftvrije geneesmiddelen nodig heeft, dan moet hij de apotheker vooraf telefonisch contacteren (de apotheker moet er vooraf van op de hoogte gebracht worden, hij moet farmaceutische zorg verlenen en samen met de patiënt bepalen hoe de geneesmiddelen moeten geleverd worden).

Hoe doet u dit concreet?

- Afhankelijk van de toestand van de patiënt, stel de patiënt gerust en vraag hem eerst telefonisch contact op te nemen met zijn arts indien dit nog niet gebeurd is.
- Herinner hem eraan **niet** naar de apotheek te komen, en ook niet spontaan naar de spoeddienst of een artsenkabinet te gaan.
- Indien de patiënt voorschriftplichtige geneesmiddelen nodig heeft kan u, indien het om een elektronisch voorschrift gaat, deze **ophalen**. Indien het niet gaat om een elektronisch

**Documentatiedienst APB** ● Redactedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april, 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 **en 31 augustus 2021**

Download : [MyAPB](#) > [All news content](#) > [Professioneel nieuws](#) > [FAQ Coronavirus](#)

voorschrift, spreek dan af hoe de overdracht van het voorschrift zal verlopen. Via de mandataris van de patiënt, een asymptomatisch persoon of via digitale weg (foto, scan).

- Voorzie en bespreek de modaliteiten voor aflevering
  - De patiënt stuurt een niet-symptomatische contactpersoon (mandataris)
  - De patiënt komt naar de apotheek met de auto, en claxonneert of belt de apotheek, en u komt naar buiten
  - De aflevering gebeurt via het wachtloket. [Meer info over aflevering via wachtloket](#)
  - De apotheker verzorgt levering aan huis. [Meer info over thuislevering](#)
- Bereid de bestelling voor, registreer alles in het farmaceutisch dossier van de patiënt en noteer duidelijk op elke verpakking een dosering én inname moment.
- Zorg voor de nodige farmaceutische zorg en nodige informatie over de geneesmiddelen en andere afgeleverde producten.
- Voorzie de modaliteiten voor betaling: zie supra; overweeg draagbare, contactloze toepassingen: APP op smartphone (of draagbare BC).
- Deze aanbevelingen kunnen verspreid worden via de apotheekschermen en op [Apotheek.be](#) en zijn overgemaakt aan de federale en regionale overheden. Ze kunnen aangepast worden naargelang de situatie evolueert.

### 5. wat bij ziekte personeel, meldingen contacttracing of sluiting apotheek door ziekte, wat met de wachtdienst?

- De maatregelen na een hoogrisicocontact verschillen tussen volledig gevaccineerd personeel en niet- of onvolledig gevaccineerd personeel <sup>5</sup>.

**Hoog risico contact** (~~ten opzichte van patiënten~~ <1.5m, zonder beschermmaatregelen zoals masker of plexischerm ~~over de volledige hoogte~~; ~~ten opzichte van collega's < 1.5m gedurende > 15 min (cumulatief)~~ ~~zonder beschermmaatregelen of bij terugkeer uit een land of regio met een hoog infectierisico~~); procedure voor zorgverleners:

- Binnen 72 uur na contact een eerste test, gevolgd door een tweede test minimum 7 dagen na contact. Het vroeger uitvoeren van een test heeft geen bijkomende waarde gezien de lange incubatieperiode.
- **Niet volledig gevaccineerd** (Men is "volledig gevaccineerd" twee weken na de

<sup>5</sup> <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen>



- laatste aanbevolen dosis): Quarantaine tot minimum 7 dagen na het laatste risico contact.
- **Volledig gevaccineerd:** quarantaine tot neg resultaat van eerste test.
  - Extra maatregelen tot 14 dagen na het laatste risico contact (handhygiëne, mondk masker, contacten beperken, lichaamstemperatuur opvolgen)

Gelet op de mogelijkheid tot vaccinatie en met in acht name van een verminderd absentieïsme, worden uitzonderingen op de quarantaineregels voor de gezondheidszorg niet langer toegestaan.

De regels voor terugkeer uit het buitenland vindt u [hier](#)

Het is het voor zorgverleners uitzonderlijk toegestaan om verder te werken, indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

De beslissing om toch te blijven werken komt in eer en geweten toe aan het hoog-risicocontact zelf en kan dus niet opgelegd worden door de werkgever. Omgekeerd kan de werkgever wel eisen om de wet strictu sensu na te leven en hoog-risicocontacten niet te laten werken. Een COVID+ resultaat laat NOOIT toe om verder te werken.

Vanzelfsprekend zijn de risico's op besmetting van patiënten of medewerkers van het apotheekteam groter door de beslissing om toch te blijven werken na hoog-risicocontact. **Er moet maximaal ingezet worden om, bij een eventueel positief testresultaat, geen patiënten of andere leden van het apotheekteam als hoog-risicocontact te creëren**, met alle gevolgen en menselijk leed vandien. De beslissing om toch door te werken dient daarom zeer zorgvuldig overwogen te worden en blijft enkel een noodoplossing indien volgende vragen positief kunnen beantwoord worden (gedurende 14 dagen):

- De continuïteit van de farmaceutische zorg wordt ONMOGELIJK zonder mijn aanwezigheid (indien er andere leden van het apotheekteam de officina kunnen openhouden of nabije apotheken de taak kunnen overnemen, is de continuïteit verzekerd)**
- Ik ken de omstandigheden van het hoog-risicocontact
- Dit hoogrisico contact betreft niet mijn knuffelcontact of een persoon uit mijn vaste bubbel
- Ik draag een chirurgisch mondk masker vanaf het verlaten van de woning tot thuiskomst (en vervang dit mondk masker elke 4 uur)

- Ik blijf thuis bij de minste symptomen, suggestief voor COVID, ook al vertoon ik slechts 1 symptoom (rhinitis, keelpijn, koorts, spierpijn, hoofdpijn, thoracale pijn, hoest, ademnood, verandering in smaak en geur)
- Ik meet elke ochtend mijn lichaamstemperatuur en blijf thuis vanaf 37,8°C
- Ik laat me testen binnen de 72 uur na contact (indien mogelijk) en minimum 7 dagen na contact
- Ik kan fysiek afstand houden met medepersoneel tijdens mijn aanwezigheid in de apotheek
- Ik draag extra zorg (handhygiëne, masker) bij magistrale bereidingen
- Ik maak geen gebruik van het openbaar vervoer.
- Ik vermijd sociale contacten buiten het werk

Bij een **laag risico contact** (>1.5 m zonder beschermmaatregelen), wordt gevraagd om gedurende 14 dagen:

- o adequate beschermingsmiddelen te dragen (chirurgisch of stoffen masker);
- o aandachtig te zijn op symptomen van COVID-19.

- Bij symptomen van COVID-19 van een **lid van het apotheketeam, ook indien volledig gevaccineerd:**

- o Afname van een staal voor de diagnose van COVID-19<sup>6</sup>, In afwachting van het resultaat: thuisisolatie;
- o Bij een **positief resultaat** (bevestigd geval):
  1. Thuisisolatie is geïndiceerd voor een minimum van **10** dagen na aanvang van de symptomen (of testafname indien asymptomatisch) **EN** tot ten minste 3 dagen zonder koorts **EN** met klinische verbetering.
  2. Draag bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker totdat de symptomen volledig zijn verdwenen **EN** tot minstens 14 dagen na

<sup>6</sup> <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/rt-pcr>

het optreden van de symptomen.

3. Voor het beheer van nauwe contacten in geval van positief resultaat: zie richtlijn [hier](#).
  - Bij een **negatief resultaat**, kan het werk hernomen worden zodra de klinische toestand dat toelaat maar met het dragen van een chirurgisch masker tot volledig verdwijnen van symptomen.
- Bij een positieve test COVID-19 van de **titularis**:
  1. Indien er een **adjunct-apotheker** in het apotheekteam is, kan de titularis zijn verantwoordelijkheden aan hem of haar overdragen. Een apotheker vervanger vormt ook een optie.
  2. Als de titularis het titulariaat niet kan delegeren aan een adjunct-apotheker of en apotheker-vervanger:
    - moet hij de apotheek [sluiten](#) voor een periode van minstens **10** dagen, of tot een apotheker provisor beschikbaar is.
    - moet hij duidelijk aan de [deur of de vitrine](#), op zijn website van de apotheek en eventueel op zijn Facebookpagina **afficheren** dat de apotheek tijdelijk gesloten is en de patiënten doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde apotheek of apotheken. En deze laatste verwittigen van de tijdelijke sluiting. Indien bestaande, dient een aangepaste boodschap op het antwoordapparaat van de apotheek eveneens een verwijzing te bevatten naar de dichtstbijzijnde apotheek of die apotheek met wie hij/zij die doorverwijzing overeengekomen is.
  3. Indien, tijdens de periode van sluiting een **wachtbeurt** gepland is voor de gesloten apotheek,
    - moet de titularis **een vervanger** voor die wachtbeurt aanduiden en dat meedelen aan zijn wachtsecretariaat. Daarom is het wenselijk om op voorhand over contactgegevens (privé GSM-nummer) van de titularis van de omliggende apotheken te beschikken.
    - als de titularis geen vervanger vindt, kan het **wachtsecretariaat** in overleg een collega in de buurt aanduiden om zijn wachtdienst over te nemen.
    - de wachtsecretariaten en beroepsverenigingen houden de vinger aan de pols wat betreft de overbelasting van de apotheek van wacht. Zo nodig duidt zij per kring een **bijkomende apotheek van wacht** aan.

**Documentatiedienst APB** ● Redactedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april , 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 **en 31 augustus 2021**

Download : [MyAPB](#) > [All news content](#) > [Professioneel nieuws](#) > [FAQ Coronavirus](#)

### Bijlage 1: stockbeheer

- Gebruik voor de bestelling van zuurstof de nationale webapplicatie: [www.covid-oxygen.be](http://www.covid-oxygen.be). [Meer info](#)
- Hou bij het bestellen van mondmaskers rekening met de kwaliteit. [Meer info](#)
- Hou voor de werking van de apotheek minimum 5 liter ontsmettingsalcohol en 5 liter javel achter de hand
- Meld stockbreuken:
  - Voor dringende tekorten van Corona-geneesmiddelen, kan je mailen naar [coronashortages@fagg-afmps.be](mailto:coronashortages@fagg-afmps.be) met in het onderwerp "Medical urgency".
  - Voor andere geneesmiddelentekorten, die zijn er helaas ook nog, mail je best naar [supply-problems@fagg-afmps.be](mailto:supply-problems@fagg-afmps.be)

### Bijlage : protocol onderhoud van de lokalen

#### A. Doelstelling

De netheid en hygiëne verzekeren van de apotheeklokalen.

#### B. Belanghebbenden

Het onderhoudspersoneel en het voltallige apotheekteam of volgens functiebeschrijvingen

#### C. Werkwijze

Een overzicht van het onderhoud, hun aard, frequentie en de verantwoordelijken zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Het gebruikte reinigingsmateriaal wordt zorgvuldig gereinigd en gespoeld, en indien nodig gedesinfecteerd en/of vervangen zodat het zelf geen bron van besmetting wordt. Het kuismateriaal wordt enkel voor dit doeleinde gebruikt.

Onderhoud wordt bijgehouden in de bijlage "Registratie van het onderhoud van de lokalen"

### D. Tabel

Onderhoud	Frequentie	Verantwoordelijke	Opmerkingen
Vloeren	1 x /dag	Onderhoudspersoneel. Indien nodig apotheekmedewerker	Stofzuigen niet aangewezen. Dweilen met 2 tot 4% javeloplossing
Balie	MIN 's middags en 's avonds	Apotheekmedewerker	Desinfecterende alcohol
Sanitair	1 x /dag	Onderhoudspersoneel	Toiletbril, rand , kranen en deurklinken. 2 tot 4% javeloplossing
Bereidingszone	Na elke bereiding	Bereider	Reinigen met water en zeep/ desinfecterende alcohol
Ontvangstzone	1 x /dag	Onderhoudspersoneel of apotheekmedewerker	Beperk flyers, standjes,... in ontvangstzone. Zorg voor zitplaatsen met 1m afstand. Vochtige doek of desinfecterende alcohol
Schappen en rekken	1 x /week	Onderhoudspersoneel	Afstoffen (vochtige doek)
Stockeerruimte	1 x /maand	Onderhoudspersoneel	Afstoffen (vochtige doek)
Vitrine of etalage	1 x /maand	Onderhoudspersoneel	Afstoffen (vochtige doek)
Schuiven, kasten,...	1 x/ jaar	Onderhoudspersoneel	Afstoffen (vochtige doek)
Vuilbakken publieksruimte	1 x /dag	Onderhoudspersoneel of apotheekmedewerker	Zakken met gebruikte papieren zakdoekjes erin goed sluiten en bij huisvuil zetten

**Documentatiedienst APB** ● Redactedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april , 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 en 31 augustus 2021

Download : [MyAPB](#) > [All news content](#) > [Professioneel nieuws](#) > [FAQ Coronavirus](#)



# SOP coronavirus

## Aanbevelingen voor de apotheek / apothekers

### E. Registratieformulier onderhoudsacties

Onderhoudsactie	Datum	Verantwoordelijke

**Documentatiedienst APB** ● Redactiedatum : 11 maart 2020 ● Update 12 maart, 18 maart, 02 april, 24 april , 11 mei, 26 mei, 12 juni, 10 juli, 15 en 29 juli, 26 augustus, 28 oktober 2020, 27 januari 2021 en **31 augustus 2021**