

# COVID-19

## BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE

### (21 MAI 2021)

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1. Points clés</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Indicateurs clés - tendances</b> .....	<b>3</b>
2.1. Tendances.....	4
2.2. Situation récente .....	5
2.3. Stratégie de gestion de l'épidémie et projections .....	6
<b>3. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020</b> .....	<b>9</b>
3.1. Distribution et évolution des cas de COVID-19 .....	9
3.2. Tests COVID-19 .....	10
3.3. Suivi des contacts .....	17
3.4. Surveillance moléculaire du SARS-CoV-2.....	22
3.5. Vaccination.....	25
3.6. Hospitalisations pour COVID-19.....	30
3.7. Taux d'occupation des lits en USI .....	34
3.8. Évolution de la mortalité COVID-19.....	35
3.9. Surveillance de la mortalité (toutes causes confondues) .....	38
3.10. Surveillance en maison de repos et de soins .....	41
3.11. Situation COVID-19 pour les enfants et en milieu scolaire .....	44
3.12. Investigation des clusters: rapport du 10/05/21 - 16/05/21 .....	48
3.13. Surveillance par des médecins généralistes .....	54
3.14. Absences au travail pour cause de maladie .....	57
3.15. Mobilité en Belgique et par province .....	59
3.16. Données issues des Passenger Locator Forms (PLF) .....	62
3.17. Ligne de temps: cas confirmés de COVID-19 et réponse à l'épidémie en Belgique.....	65
<b>4. Modélisation</b> .....	<b>67</b>
4.1. Taux de reproduction ( $R_t$ ).....	67
4.2. Modèle de prédiction à court terme pour les nouvelles hospitalisations .....	69
4.3. Modèle de prédiction du taux d'occupation des lits en soins intensifs .....	70
<b>5. Situation épidémiologique internationale et Européenne</b> .....	<b>71</b>
5.1. Situation internationale .....	71
5.2. Situation Européenne (EU/EEA et UK) source ECDC situation .....	72
<b>6. Annexes</b> .....	<b>74</b>
6.1. Résumé des indicateurs clés.....	74
6.2. Nombre de personnes diagnostiquées (PCR et antigène) entre le 13 avril 2021 et le 20 mai 2021 présenté par jour et moyenne par semaine .....	75
6.3. Nombre de tests réalisés entre le 13 avril 2021 et le 20 mai 2021 présenté par jour et moyenne par semaine.....	76
6.4. Nombre de personnes hospitalisées entre le 16 avril 2021 et le 20 mai 2021 présenté par jour et moyenne par semaine.....	77
6.5. Nombre de personnes décédées entre le 13 avril 2021 et le 20 mai 2021 présenté par jour et moyenne par semaine.....	78
<b>7. Prévention et information</b> .....	<b>79</b>

# 1. Points clés

- **Situation générale:** Phase de confinement. L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas pour la Belgique est de 303/100 000 habitants, l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 8,4/100 000 habitants.
- **Nombre de nouveaux cas:** Au niveau national, le nombre de nouveaux cas continue à diminuer sur la période du 11 au 17 mai par rapport à la période précédente de 7 jours. Le Rt, basé sur le nombre de cas diagnostiqués pour cette même période est de 0,867.
- **Tests et taux de positivité :** Le nombre de tests effectués diminue au cours de la période du 11 mai au 17 mai par rapport à la période précédente de 7 jours, dans le contexte du week-end prolongé. Le taux de positivité pour la Belgique continue à diminuer à 5,7 %.
- **Hospitalisations :** Le nombre de nouvelles hospitalisations diminue encore au cours de la période du 14 au 20 mai par rapport à la période précédente de 7 jours. Le nombre de lits occupés en soins intensifs diminue également cette semaine (-13 %).
- **Mortalité :** La mortalité liée au COVID-19 diminue cette dernière semaine. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l'hôpital. Le nombre de décès COVID-19 de résidents de MR/MRS reste faible.
- **Vaccination :** D'après les données enregistrées dans Vaccinnet+, en date du 19 mai 2021, la couverture vaccinale complète est de 16,2 % pour la population belge âgée de 18 ans et plus et de 39,0 % pour la population âgée de 65 ans et plus.
- **Situation COVID-19 pour les enfants et en milieu scolaire:** Cette nouvelle section donne un aperçu de la situation épidémiologique chez les enfants. Les données sur les indications de tests et la proportion des écoles concernées par une investigation de cluster apportent des éléments contextuels aux chiffres d'incidences et de tests effectués par groupe d'âge – voir [section 3.11](#)
- **Mobilité :** La mobilité a diminué pendant le weekend prolongé, après une nette augmentation la semaine précédente. Cette diminution concerne principalement la fréquentation du lieu de travail et les transports publics alors que la fréquentation des commerces & loisirs a continué à augmenter – voir [section 3.15](#)
- **Voyageurs :** On observe une légère augmentation du nombre de voyageurs ces dernières semaines. Le taux de positivité du 1er test et du 2ème test pour les voyageurs revenant de zone rouge reste stable et est respectivement de 1,4 % et 0,9 %. Les voyageurs reviennent principalement d'Espagne, de France et du Portugal – voir [section 3.16](#)

## 2. Indicateurs clés - tendances

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 6](#) de ce bulletin

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 041 706	2 857	2 118*	-26%
Admis à l'hôpital	73 144***	154,0	123,9**	-20%
Décédés****	24 794	34,9	19,9*	-43%
<i>En hôpital</i>	<i>15 108</i>	<i>33,6</i>	<i>19,4</i>	<i>-42%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 511</i>	<i>1,3</i>	<i>0,4</i>	<i>-67%</i>

\*Du 11 mai 2021 au 17 mai 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

\*\*Du 14 mai 2021 au 20 mai 2021.

\*\*\*Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).


\*\*\*\*Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Jeudi 13 mai 2021	Jeudi 20 mai 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 912	1 642	-14%
Nombre de lits USI occupés	644	562	-13%


Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

## 2.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


## 2.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 04/05/21 et le 17/05/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 04/05/21 et le 17/05/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 326 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	04/05/21-10/05/21	11/05/21-17/05/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
<b>Belgique</b>	<b>20 002</b>	<b>14 825</b>	<b>-5 177</b>	<b>-26%</b>	<b>16</b>	<b>303</b>
Antwerpen	3 132	2 438	-694	-22%	19	298
Brabant wallon	680	623	-57	-8%	55	321
Hainaut	2 851	2 192	-659	-23%	18	374
Liège	1 893	1 468	-425	-22%	19	303
Limburg	1 729	1 075	-654	-38%	10	320
Luxembourg	577	426	-151	-26%	16	350
Namur	1 130	719	-411	-36%	11	373
Oost-Vlaanderen	2 269	1 700	-569	-25%	17	260
Vlaams-Brabant	1 390	1 037	-353	-25%	17	210
West-Vlaanderen	1 942	1 322	-620	-32%	13	272
Région bruxelloise	1 998	1 601	-397	-20%	22	295
Deutschsprachige Gemeinschaft	188	85	-103	-55%	6	350

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

### 2.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE ET PROJECTIONS

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

**ET**

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:

- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

**OU**


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.


Des projections du niveau d'incidence dans les 14 jours à venir (pour le nombre de cas) ou dans les 7 jours à venir (pour le nombre d'hospitalisations) sont calculées et indiquées par les points noirs dans les figures ci-dessous. Les intervalles de confiance pour ces projections (intervalle de prédiction) sont indiqués sur les figures de droite.

Les projections sont calculées sur base d'un modèle bayésien. Le modèle utilisé pour les projections du nombre de cas et des hospitalisations au niveau des provinces diffère du modèle utilisé pour les projections au niveau de la Belgique, ce dernier étant plus précis car basé sur un nombre d'indicateurs plus large.


Incidence sur 14 jours (barres vertes) et projections (points noirs) sur 14 jours pour le nombre de cas (17/05/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) et projections (points noirs) sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations (20/05/21)



Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations depuis le 31 août 2020. Les valeurs seuils délimitant les phases de contrôle et de lockdown sont indiquées en lignes pointillées dans la couleur correspondante. Notez également la distinction entre les axes choisis pour indiquer les incidences pour le nombre de cas (vert foncé) et pour le nombre d'hospitalisations (vert clair).




### 3. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#).

#### 3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 11 mai 2021 au 17 mai 2021, 14 825 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 14 825 nouveaux cas, 7 572 (51%) étaient rapportés en Flandre, 5 428 (37%) en Wallonie, dont 85 cas pour la communauté germanophone, et 1 601 (11%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 224 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par semaine (date de diagnostic\*) à partir du 31/08/20



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 20 mai 2021, à 6 heures.


\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

## 3.2. TESTS COVID-19

### 3.2.1. Tests COVID-19 effectués par les laboratoires cliniques et par les laboratoires de la plateforme fédérale de tests et taux de positivité par province et par tranche d'âge

Au cours de la période du 11 mai 2021 au 17 mai 2021, 287 608 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 41 087 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 5,7%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale\*, et taux de positivité, par semaine à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. \*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 11 mai 2021 au 17 mai 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	23 452	1 848	1 387	5,9%
10-19	30 688	2 360	2 559	8,3%
20-39	85 367	2 944	5 130	6,0%
40-64	94 873	2 484	5 442	5,7%
65+	51 984	2 358	1 807	3,5%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 1244 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 11 mai 2021 au 17 mai 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>Belgique</b>	287 608	2 503	16 503	5,7%
<b>Antwerpen</b>	46 856	2 506	2 712	5,8%
<b>Brabant wallon</b>	11 454	2 821	675	5,9%
<b>Hainaut</b>	28 498	2 116	2 315	8,1%
<b>Liège</b>	23 970	2 160	1 603	6,7%
<b>Limburg</b>	20 644	2 353	1 202	5,8%
<b>Luxembourg</b>	7 807	2 723	483	6,2%
<b>Namur</b>	10 948	2 208	727	6,6%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	35 196	2 308	1 869	5,3%
<b>Vlaams-Brabant</b>	26 701	2 310	1 201	4,5%
<b>West-Vlaanderen</b>	32 928	2 742	1 628	4,9%
<b>Région bruxelloise</b>	36 615	3 006	1 820	5,0%
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	1 665	2 136	108	6,5%

\*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 11/05/21 et le 17/05/21



Taux de positivité par province entre le 11/05/21 et le 17/05/21



### 3.2.2. Indications des prescriptions de tests COVID-19

Les indications des prescriptions de test COVID-19 proviennent, d'une part, des formulaires électroniques utilisés par les médecins généralistes, les médecins en collectivité et à l'hôpital pour une demande de test (consultation avec prescription), et d'autre part, des codes de prescription de test (code CTPC) qui permettent à certaines catégories de personnes asymptomatiques (contacts à haut risque avec un cas COVID-19 confirmé, voyageurs de retour de zone rouge) de réaliser un test sans consultation préalable.


Les données des prescriptions des médecins généralistes et des médecins à l'hôpital sont disponibles depuis le 1er septembre 2020. Les données des prescriptions des médecins en collectivité et des prescriptions sans consultation sont disponibles depuis le 10 décembre 2020.

Ces données sur les prescriptions ne sont cependant pas disponibles pour toutes les demandes de test COVID-19 (par exemple, en milieu hospitalier, des formulaires supplémentaires ne sont pas systématiquement remplis pour toutes les analyses).

Sur la dernière semaine, du 10 mai 2021 au 16 mai 2021, 274 835 tests ont été réalisés, dont 58,7% ont pu être reliés à une prescription correspondante (combinaison des formulaires électroniques et des codes CTPC).

La figure ci-dessous montre la distribution des indications de tests depuis le 1er septembre 2020.

Distribution des indications de test pour les prescriptions disponibles, pour la période du 01/09/20 au 17/05/21




\*Les données associées aux codes CTPC ne sont pas disponible pour la période 6/11/20 au 9/12/20. Ces données pourront être ajoutées rétroactivement à une date ultérieure.

Attention, la stratégie de test peut varier (tests nécessaires ou non pour certaines catégories, nécessité d'un formulaire électronique ou non). Ces changements de stratégie se reflètent dans les graphes montrés.


Les figures ci-dessous montrent le taux de positivité pour chaque indication de test, et le taux de positivité pour les patients symptomatiques ou asymptomatiques.

Le taux de positivité n'est présenté ci-dessous que si le nombre de tests effectués pour chaque catégorie représente plus de 0,5 % du nombre total de tests.

Évolution du taux de positivité par indication de test pour les prescriptions disponibles, pour la période du 01/09/20 au 17/05/21



Taux de positivité en fonction de la présence ou non de symptômes pour les prescriptions disponibles, en pourcentage, pour la période du 01/09/20 au 17/05/21



### 3.2.3. Délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'appel du contact center

La figure ci-dessous donne un aperçu de la performance du processus de testing en Belgique. Elle montre l'évolution du délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'appel téléphonique du contact center (CC) au patient. Ce délai est subdivisé en cinq composantes: de l'apparition des symptômes à la consultation (vert foncé), de la consultation au prélèvement (vert), du prélèvement au résultat du test (vert clair), du résultat du test au ticket<sup>1</sup> envoyé au CC (jaune) et de l'appel du CC au patient (orange). La date de référence sur l'axe des abscisses est la date du résultat du test, et si non disponible, la date de l'envoi du ticket au CC.

Le délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin représente la part la plus importante du délai total. Viennent ensuite le temps écoulé entre le prélèvement et le résultat du test et le temps écoulé entre le moment où le ticket est envoyé au CC et le moment où le CC téléphone au patient. Les délais entre la consultation et le prélèvement et entre la disponibilité du résultat et la création d'un ticket au CC sont par contre beaucoup plus courts.


Des variations quotidiennes sont observées, elles sont essentiellement dues aux week-ends et aux jours fériés. Il convient également de souligner que certains de ces délais moyens sont calculés sur base d'un faible nombre d'observations. C'est notamment le cas pour les délais calculés au début du mois de septembre pour le délai entre le résultat du test et l'envoi du ticket au CC et le délai entre l'envoi du ticket au CC et l'appel du patient.

Des tendances plus globales sont également observées. Par exemple, les délais entre la consultation et le prélèvement et entre le prélèvement et le résultat du test ont commencé à augmenter un peu avant le changement de stratégie de test mis en place le 21 octobre 2020. Ces délais accrus reflètent le dépassement de la capacité de testing à cette période. Entre le 21 octobre et le 22 novembre 2020, les contacts à haut risque asymptomatiques et les voyageurs revenant de zones rouges n'ont temporairement pas été testés. Les délais entre consultation et prélèvement et entre prélèvement et résultats ont en conséquence diminué à la fin du mois d'octobre 2020. En outre, le délai entre la création du ticket au CC et l'appel au patient a clairement diminué depuis début novembre 2020 pour se stabiliser à partir de décembre.

---

<sup>1</sup> la dénomination "ticket" fait référence au message d'activation envoyé au CC pour chaque résultat positif reçu.

Evolution du délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'appel du CC au patient à partir du 01/09/20, subdivisé en 5 composantes




### 3.3. SUIVI DES CONTACTS

#### 3.3.1. « Whereabouts » des cas confirmés COVID-19

L'objectif du suivi des contacts est d'identifier rapidement les contacts à risque et d'empêcher ainsi la propagation du virus. Pour plus d'informations sur le processus de suivi des contacts, cliquez [ici](#). Lors du contact téléphonique, il est demandé aux cas index de renseigner leurs contacts pendant la période de contagiosité. Une distinction est faite entre les personnes ayant eu un contact étroit (contact à haut risque) et celles ayant eu un contact superficiel (contact à faible risque).


Le graphe ci-dessous montre le nombre de cas confirmés par jour (en vert foncé) et le nombre de ces cas à contacter par le contact center (en vert). Depuis le 31 août, 740 915 cas COVID-19 confirmés ont été contactés, parmi ceux-ci 79,8 % ont renseigné des contacts. Pour la période du 10 au 16 mai, 91,9 % des cas COVID-19 confirmés ont été contactés avec succès dont 86,6 % ont renseigné des contacts à risque.



La collecte d'informations supplémentaires nous renseigne davantage sur les modes de transmission possibles. Ces questions complémentaires sont posées uniquement aux cas confirmés COVID-19 contactés par le contact center. Ces informations ne concernent pas les contacts à haut risque.


La figure ci-dessous montre les lieux signalés par les cas confirmés COVID-19 au contact center comme lieux possibles de transmission. Environ 33,7 % des cas confirmés COVID-19 contactés ont indiqué ne pas savoir où ils avaient contracté l'infection. Malgré l'observation de légères variations de semaine en semaine, les lieux possibles de transmission les plus fréquemment signalés pour la période du 10 au 16 mai, sont au domicile (36,6 %), en famille et chez des amis (9,9%), lors d'activités pour adolescents (7,5%) et au travail (7,0 %).

Il est important de noter que certains endroits sont complètement (rouge) ou partiellement (orange) fermés suite aux mesures actuellement en vigueur. La catégorie "activités pour enfants" comprend les activités scolaires et extrascolaires destinées aux enfants de moins de 12 ans. La catégorie "activités pour adolescents" comprend, les activités scolaires et extrascolaires destinées aux enfants de plus de 12 ans.



La figure ci-dessous montre la proportion de cas confirmés COVID-19 pouvant identifier un autre cas confirmé COVID- 19 comme source d'infection. Pour 42,9 % des cas, aucune source exacte n'a été rapportée. En cas d'identification de la source d'infection pour la période du 10 au 16 mai, cela est principalement expliqué par un contact au sein du ménage (33,3 %), avec un autre membre infecté de la famille (6,9 %), un camarade de classe (4,5 %), un collègue de travail (4,4 %) ou un ami (3,3%).


Possibles sources d'infection pour les cas contactés du 10 au 16 mai 2021.



### 3.3.2. Caractéristiques des contacts à haut risque contactés.

Les informations récoltées par le contact center nous permettent également de décrire le suivi des contacts à haut risque rapportés par un cas COVID-19 confirmé.

Le graphe ci-dessous indique, par jour, le nombre de contacts à haut risque identifiés (en vert foncé) et le nombre de contacts à haut risque contactés avec succès par le contact center (en vert). La ligne vert clair indique les contacts à haut risque ayant été testés. Le nombre de contacts à haut risque ayant été testé dépend de la stratégie de testing. Entre le 21/10 et le 23/11, les contacts à haut risque asymptomatiques en quarantaine n'étaient pas testés. Depuis le 25/01, les contacts à haut risque doivent être testés deux fois, une première fois dans les 72 heures suivant le dernier contact à haut risque et la deuxième fois au plus tôt le 7e jour suivant le dernier contact à haut risque.



\*Pour un contact à haut risque contacté, la période de rapportage de tests liés au contact court de 1 jour avant et jusqu'à 20 jours après contact avec le contact center.

Parmi les contacts à haut risque rapportés (18 140 personnes) pour la période du 03 au 09 mai, 15 719 contacts ont été contactés par le contact center (86,7 %).

Parmi ces contacts à haut risque contactés, 13 908 ont effectués un premier test (88,5 %) dont 2 888 étaient positifs. Ceci représente un taux de positivité global pour le premier test de 20,8 %.

Parmi les contacts ayant présenté un premier test négatif (11 013 personnes), 7 621 ont effectué un deuxième test (69,2%). Parmi ces contacts ayant effectué un deuxième test 1 259 étaient positifs.

Ceci représente un taux de positivité global pour le deuxième test de 16,5 %.

Par ailleurs, parmi ces contacts à haut risque contactés, 3 392 n'ont effectué qu'un seul test de dépistage (21,6%) et 1 811 n'ont pas effectué de test (11,5 %).

Sur base du nombre de contacts testés, le taux de positivité global des contacts à haut risque pour cette période est de 29,8%. Ce taux de positivité global comprend tous les contacts positifs parmi tous les contacts testés.

Sur base de l'ensemble des tests effectués pour la période du 03 au 09 mai, le tableau ci-dessous montre les taux de positivité pour le premier test et pour le deuxième test. Avec l'information rapportée par le cas index, une différence est faite pour les contacts à haut risque cohabitant ou non avec le cas confirmé de COVID-19.

	Taux de positivité 1 <sup>er</sup> test	Taux de positivité 2 <sup>ième</sup> test
<b>Contacts à haut risque</b>	20,8 %	16,5 %
<b>Contacts à haut risque cohabitant du cas COVID-19 confirmé</b>	23,9 %	20,9 %
<b>Contacts à haut risque NON cohabitant du cas COVID-19 confirmé</b>	11,4 %	7,1 %

### 3.4. SURVEILLANCE MOLÉCULAIRE DU SARS-COV-2

Source: [Rapport du laboratoire national de référence](#) (UZ Leuven & KU Leuven) - mise à jour du 18/05/21

Une surveillance moléculaire est nécessaire pour établir la diversité génétique des virus SARS-CoV-2 circulant en Belgique et pour analyser l'évolution de cette diversité dans le temps. Cette surveillance peut se faire par analyse PCR ciblées sur des régions spécifiques du génome qui présentent un intérêt particulier, ou par séquençage du génome complet du virus (Whole Genome Sequencing – WGS) pour avoir une certitude du type de variant.

En décembre 2020, les laboratoires qui séquent les échantillons SARS-CoV-2 depuis plusieurs mois se sont regroupés au sein d'une *plateforme de séquençage*, celle-ci comprend maintenant une quinzaine de laboratoires.

La *plateforme de séquençage* effectue une surveillance dite « de base », c'est-à-dire une analyse génétique approfondie d'un certain nombre d'échantillons positifs en PCR représentatifs de l'ensemble de la population. Actuellement environ 10% des échantillons positifs sont séquencés dans le cadre de la surveillance de base. La *plateforme de séquençage* effectue également une surveillance « active », c'est-à-dire que des analyses génétiques poussées sont effectuées dans certains contextes (certains voyageurs de retours de zones rouges, une sélection de foyers épidémiques, certains cas de réinfection/infection après vaccination...)


Cette surveillance moléculaire a ainsi permis d'identifier et de suivre des variants émergents du virus SARS-CoV-2 sur notre territoire, dont ceux dits « de préoccupation » (variant of concern - VOC), notamment le variant B.1.1.7 (20/501Y.V1), identifié pour la première fois en Angleterre, le variant B.1.351 (20H/501Y.V2), identifié en Afrique du Sud et le variant P.1 (20J/501Y.V3) identifié au Brésil et plus récemment le variant B.1.617 identifié en Inde.

Ces différents variants ont la particularité de présenter des mutations-clés au sein du gène S (gène encodant la protéine virale « Spike » qui interagit avec le récepteur de la cellule hôte). Des analyses PCR ciblées sur ces régions sont développées par les laboratoires de la plateforme fédérale de tests pour permettre une identification présomptive plus rapide de ces variants. Ces analyses constituent un proxy permettant une identification plus rapide et plus facile de la proportion et de l'évolution des variants d'intérêt. Cependant, la certitude de diagnostic de variant ne peut être obtenue que par séquençage du génome complet (WGS). Les résultats de la surveillance moléculaire; surveillance de base et surveillance active sont présentés ici.

### 3.4.1. Surveillance par séquençage complet du génome (plateforme de séquençage)

La figure ci-dessous montre l'évolution des trois VOC principaux circulant en Belgique identifiés par un séquençage génomique complet (WGS) à partir des échantillons analysés dans le cadre de la surveillance de base. La catégorie « Non-VOC » désigne toute souche qui n'est pas l'un des variants de préoccupation principaux (B.1.1.7 (20/501Y.V1), B.1.351 (20H/501Y.V2) ou P.1 (20J/501Y.V3)).

Evolution des variants identifiés dans la surveillance de base en Belgique depuis la semaine 1 2021



\*Les données des deux dernières semaines doivent encore être consolidées.

Le tableau ci-dessous indique le nombre des trois variants VOC identifiés par un séquençage génomique complet (WGS) à partir des échantillons analysés dans le cadre de la surveillance de base et des échantillons analysés dans le cadre de la surveillance active pour les 14 dernières semaines (08/02/21-16/05/21). Il faut rappeler que la surveillance active concerne des groupes présentant un intérêt particulier tel que des clusters ou des voyageurs, mais également les échantillons présentant des résultats de PCR anormaux.

Pour la période 3 mai 2021 au 16 mai 2021, les données préliminaires montrent que le variant B.1.1.7 (20/501Y.V1), le variant B.1.351 (20H/501Y.V2), et le variant P.1 (20J/501Y.V3) représentaient respectivement 88,5 %, 0,5 % et 7,1 % des échantillons séquencés dans la surveillance dite de base. Le nombre d'infections dues au variant B.1.617 est en augmentation mais reste limité.

Source: plateforme de séquençage

Note: Les données des deux dernières semaines doivent encore être consolidées. De plus des données additionnelles peuvent également être ajoutées de façon rétrospective aux semaines précédentes.

Semaine d'échantillonnage	Surveillance de base						Surveillance active (voyageurs, foyers épidémiques, résultats PCR anormaux y compris S gene dropout)							
	Nombre d'échantillons séquencés	B.1.1.7 (20/501Y.V1)		B.1.351 (20H/501Y.V2)		P.1 (20J/501Y.V3)		Nombre d'échantillons séquencés	B.1.1.7 (20/501Y.V1)		B.1.351 (20H/501Y.V2)		P.1 (20J/501Y.V3)	
		n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)		n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)
15/02-21/02 (w 7)	1,068	539	50.5%	64	6%	26	2.4%	425	126	29.6%	65	15.3%	20	4.7%
22/02-28/02 (w 8)	1,250	706	56.5%	95	7.6%	27	2.2%	203	96	47.3%	53	26.1%	15	7.4%
01/03-07/03 (w 9)	1,044	667	63.9%	94	9%	31	3%	239	126	52.7%	76	31.8%	6	2.5%
08/03-14/03 (w 10)	1,361	1,028	75.5%	78	5.7%	34	2.5%	189	97	51.3%	48	25.4%	15	7.9%
15/03-21/03 (w 11)	1,398	1,129	80.8%	67	4.8%	65	4.6%	221	121	54.8%	44	19.9%	30	13.6%
22/03-28/03 (w 12)	1,737	1,463	84.2%	70	4%	54	3.1%	140	79	56.4%	15	10.7%	28	20%
29/03-04/04 (w 13)	1,524	1,286	84.4%	50	3.3%	76	5%	117	53	45.3%	7	6%	28	23.9%
05/04-11/04 (w 14)	1,512	1,252	82.8%	36	2.4%	134	8.9%	180	54	30%	18	10%	93	51.7%
12/04-18/04 (w 15)	1,570	1,288	82%	25	1.6%	129	8.2%	121	70	57.9%	7	5.8%	29	24%
19/04-25/04 (w 16)	1,368	1,155	84.4%	30	2.2%	91	6.7%	187	84	44.9%	8	4.3%	35	18.7%
26/04-02/05 (w 17)	1,258	1,119	89%	11	0.9%	53	4.2%	153	73	47.7%	5	3.3%	23	15%
03/05-09/05 (w 18)	708	625	88.3%	4	0.6%	50	7.1%	96	48	50%	6	6.2%	7	7.3%
10/05-16/05 (w 19)	68	62	91.2%	0	0%	5	7.4%	10	8	80%	0	0%	0	0%

Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

### 3.5. VACCINATION

#### *Utilisation et couverture vaccinale*

Le 28 décembre 2020, la phase pilote de la campagne de vaccination COVID-19 a débuté en Belgique (dans un des centres de soins résidentiels de chacune des régions). Le 5 janvier 2021, la [campagne de vaccination](#) officielle a commencé.

Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés en Belgique: le vaccin *Comirnaty*® (Pfizer/BioNtech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*®, le vaccin *Vaxzevria*® (AstraZeneca) et le vaccin *COVID-19 Janssen*® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour le trois premiers vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*®)<sup>2</sup>, 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*®), ou 12 semaines<sup>3</sup> (*Vaxzevria*®)<sup>4</sup>. Une personne ayant reçu deux doses d'un de ces vaccins est considérée comme entièrement vaccinée. Pour le *COVID-19 Vaccine Janssen*® une seule dose doit être administrée pour que la personne soit considérée comme entièrement vaccinée.

Toutes les doses de vaccins COVID-19 administrées en Belgique sont, tel que défini par la loi, enregistrées dans la base de données Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Seules les vaccinations enregistrées dans cette base de données sont incluses dans les chiffres et les analyses ci-dessous. Toutefois, un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Sur l'ensemble des vaccinations enregistrées jusqu'au 19 mai 2021, 88,9 % ont été enregistrées dans les 3 jours suivant la date d'administration du vaccin.

Au 19 mai 2021, un total de 5 600 132 doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+ en Belgique. Cela correspond à une augmentation de 722 671 doses par rapport au nombre enregistré au 12 mai 2021.

La répartition géographique indiquée dans ce rapport est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du site de vaccination. Cette répartition ne reflète pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

---


<sup>2</sup> Le 10 mars 2021, suivant une décision de la Conférence Interministérielle Santé publique, l'intervalle entre les 2 doses du vaccin *Comirnaty*® passe de 21 jours à 35 jours dans la campagne de vaccination belge.

<sup>3</sup> L'intervalle entre les 2 doses du vaccin *Vaxzevria*® est passé de 12 semaines à 8 semaines le 3 mai 2021 en région bruxelloise et le 12 mai 2021 dans la la campagne de vaccination belge.

<sup>4</sup> Les indications d'âge pour le vaccin *Vaxzevria*® ont changé au cours de la campagne de vaccination belge comme suit : (i) 12 février au 2 mars 2021: 18 à 55 ans; (ii) 3 mars au 6 avril : ≥ 18 ans ; (iii) 7 avril au 23 avril: ≥ 56 ans; (iv) À partir du 24 avril: ≥ 41 ans.

Le graphique ci-dessous présente les dates clés de la campagne de vaccination belge et l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données : Vaccinnet+. Les personnes entièrement vaccinées sont incluses dans chacune des deux courbes.

Période indiquant le début des différentes phases de la campagne de vaccination belge et les catégories de population ciblées. La date de début pouvant varier d'une entité fédérée à l'autre, la période mentionnée indique la première et la dernière date de début des entités fédérées.

Date du début de l'utilisation des différents types de vaccins contre la COVID-19 en Belgique.

Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes vaccinées et la couverture vaccinale pour les différents groupes d'âge, au 19 mai 2021, par statut vaccinal, pour la Belgique.

Groupe d'âge <sup>(1)</sup>	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose <sup>(2)</sup>	Couverture vaccinale au moins 1 dose <sup>(3)</sup>	Nombre de personnes entièrement vaccinées <sup>(2)</sup>	Couverture vaccinale entièrement vaccinée <sup>(3)</sup>
0-17 ans	3357	0,15%	2386	0,10%
18-34 ans	3 10 049	12,87%	161 149	6,69%
35-44 ans	278 319	18,63%	121 130	8,11%
45-54 ans	556 780	36,18%	147 967	9,62%
55-64 ans	973 381	63,28%	194 417	12,64%
65-74 ans	1 069 936	89,60%	238 747	19,99%
75-84 ans	651 153	92,61%	446 388	63,49%
≥ 85 ans	300 360	90,49%	183 133	55,17%

(1) Les personnes d'âge inconnu ne sont pas incluses dans ce tableau

(2) Source de données : Vaccinnet+

(3) Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres provisoires de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL

Le tableau ci-dessous indique le nombre et la couverture vaccinale pour les personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, le 19 mai 2021, pour la Belgique, par région et pour la Communauté germanophone, par groupe d'âge.

Groupes d'âge		Belgique	Bruxelles <sup>(1)</sup>	Flandre <sup>(1)</sup>	Wallonie <sup>(1,2)</sup>	Communauté germanophone <sup>(1)</sup>
Population totale	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose <sup>(3)</sup>	4 143 335	336 282	2 408 876	1 350 516	33 240
	Couverture vaccinale au moins 1 dose <sup>(4)</sup> (%)	35,96%	27,56%	36,21%	37,83%	42,54%
18 ans et plus	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose <sup>(3)</sup>	4 139 978	336 188	2 406 376	1 349 892	33 233
	Couverture vaccinale au moins 1 dose <sup>(4)</sup> (%)	44,96%	35,60%	44,87%	47,56%	52,72%
65 ans et plus	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose <sup>(3)</sup>	2 021 449	120 374	1 315 246	569 903	13 280
	Couverture vaccinale au moins 1 dose <sup>(4)</sup> (%)	90,68%	75,69%	95,55%	84,06%	85,34%
85 ans et plus	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose <sup>(3)</sup>	300 360	20 229	200 235	77 709	1754
	Couverture vaccinale au moins 1 dose <sup>(4)</sup> (%)	90,49%	79,16%	95,38%	82,36%	84,33%

(1) La répartition géographique est basée sur le code postal de résidence de la personne vaccinée. Les personnes pour lesquelles le code postal était inconnu n'ont pas été incluses dans la répartition géographique.

(2) A l'exclusion de la Communauté germanophone

(3) Source de données : Vaccinnet+

(4) Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres provisoires de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL

Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Le tableau ci-dessous indique le nombre et la couverture vaccinale pour les personnes entièrement vaccinées, le 19 mai 2021, pour la Belgique, par région et pour la Communauté germanophone, par groupe d'âge.

Groupes d'âge		Belgique	Bruxelles <sup>(1)</sup>	Flandre <sup>(1)</sup>	Wallonie <sup>(1,2)</sup>	Communauté germanophone <sup>(1)</sup>
Population totale	Nombre de personnes entièrement vaccinées <sup>(3)</sup>	1 495 317	128 261	902 213	447 317	9726
	Couverture vaccinale entièrement vaccinée <sup>(4)</sup> (%)	12,98%	10,51%	13,56%	12,53%	12,45%
18 ans et plus	Nombre de personnes entièrement vaccinées <sup>(3)</sup>	1 492 931	128 217	900 425	446 885	9723
	Couverture vaccinale entièrement vaccinée <sup>(4)</sup> (%)	16,21%	13,58%	16,79%	15,74%	15,42%
65 ans et plus	Nombre de personnes entièrement vaccinées <sup>(3)</sup>	868 268	66 003	547 082	247 792	6324
	Couverture vaccinale entièrement vaccinée <sup>(4)</sup> (%)	38,95%	41,50%	39,74%	36,55%	40,64%
85 ans et plus	Nombre de personnes entièrement vaccinées <sup>(3)</sup>	183 133	11 648	119 461	50 384	1408
	Couverture vaccinale entièrement vaccinée <sup>(4)</sup> (%)	55,17%	45,58%	56,90%	53,40%	67,69%

(1) La répartition géographique est basée sur le code postal de résidence de la personne vaccinée. Les personnes pour lesquelles le code postal était inconnu n'ont pas été incluses dans la répartition géographique.

(2) A l'exclusion de la Communauté germanophone


(3) Source de données : Vaccinnet+

(4) Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres provisoires de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL


Tous les données suivantes sont axées sur les personnes âgées de 18 ans et plus, car elles constitueront à terme le groupe cible de la campagne de vaccination belge.

Le 19 mai 2021, la couverture vaccinale pour les femmes âgées de 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose de vaccin était de 49,15 % (nombre de personnes: 2 311 532) et de 19,76 % (nombre de personnes: 929 488) pour celles entièrement vaccinées. La couverture vaccinale pour les hommes âgés de 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose de vaccin était de 40,84 % (nombre de personnes: 1 828 391) et de 12,58 % (nombre de personnes: 563 427) pour ceux entièrement vaccinés.

La figure ci-dessous indique la couverture vaccinale pour les personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin pour la population belge de 18 ans et plus, par région/communauté et pour la Belgique, par date d'administration.





La figure ci-dessous indique la couverture vaccinale pour les personnes entièrement vaccinées pour la population belge de 18 ans et plus, par région/communauté et pour la Belgique, par date d'administration.



### 3.6. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

#### 3.6.1. Situation dans les hôpitaux


Au cours de la période du 14 mai 2021 au 20 mai 2021, 867 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 033 personnes ont quitté l'hôpital.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 20 mai 2021, 1 642 lits d'hôpital dont 562 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 361 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 59 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 270, dont 82 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés, par semaine



\*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (20 mai 2021)

Sévérité des cas hospitalisés, par semaine



\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


### 3.6.2. Provenance des patients hospitalisés pour COVID-19

Le nombre de nouvelles hospitalisations que nous rapportons comprend uniquement les patients présentant une infection COVID-19 confirmée et admis en raison de celle-ci. Les patients admis en raison d'une pathologie différente mais ayant un test positif au COVID-19 sont exclus. Les admissions hospitalières de patients avec une infection COVID-19 confirmée sont classées dans le graphe ci-dessous en fonction de la provenance des patients. Cela nous permet d'avoir une vue sur le nombre de nouveaux patients COVID-19 venant d'une maison de repos ou d'une autre institution de soins de longue durée.

Sur les 867 admissions rapportées pour la période du 14 mai 2021 au 20 mai 2021, 833 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 17 (sur les 833) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

La figure ci-dessous indique l'évolution du nombre de nouvelles hospitalisations COVID-19 pour l'ensemble des patients et pour les résidents de MR/MRS, ainsi que le pourcentage de résidents de MR/MRS parmi les patients hospitalisés. L'évolution de ce pourcentage, ainsi que la tendance à la baisse du nombre absolu d'admissions de résidents de MR/MRS, pourraient constituer un indicateur de l'impact positif de la vaccination. Néanmoins, d'autres facteurs (par exemple, une augmentation des hospitalisations dans la population générale) peuvent également expliquer une diminution de la proportion des résidents de MR/MRS parmi les personnes hospitalisées, comme cela a été observé précédemment.

Évolution des hospitalisations et de la proportion de résidents de MR/MRS admis, Belgique



### 3.6.3. Caractéristiques des patients hospitalisés


La surveillance clinique des patients COVID-19 hospitalisés permet de suivre l'évolution des caractéristiques des patients admis dans les hôpitaux. Ces données sont représentatives des patients au niveau national. Cependant la surveillance clinique n'est pas exhaustive, et concerne environ 60 % à 70 % des patients hospitalisés. Les résultats sont donc présentés en pourcentages et non en nombres (ceux-ci donneraient une sous-estimation du nombre total de patients).

Il est également important de noter qu'entre juin 2020 (semaine 24) et septembre 2020 (semaine 39), le nombre total d'admissions hospitalières par semaine en Belgique était très faible, à savoir 70 à 140 admissions par semaine. Par conséquent, les chiffres utilisés pour le calcul des pourcentages ci-dessous sont très petits, ce qui explique les importantes fluctuations observées.

**Sexe:** Depuis le début de l'épidémie, 47,1% des patients hospitalisés sont des femmes, 52,9% des hommes.

**Age:** Les figures ci-dessous montrent l'évolution de la répartition par âge des patients COVID-19 admis à l'hôpital par semaine.


Évolution par semaine de la répartition par âge des patients admis à l'hôpital, jusqu'à la semaine 17 (26/04/21-02/05/21)



Note: les données des quatre dernières semaines sont susceptibles d'évoluer à cause de changements apportés de façon rétrospective.


**Problèmes de santé préexistants:** La figure ci-dessous montre la proportion de patients COVID-19 admis à l'hôpital par semaine qui ne présentent aucun, un ou plusieurs problèmes de santé préexistants.

Evolution par semaine de la proportion de patients présentant ou non des problèmes de santé préexistants, jusqu'à la semaine 17 (26/04/21-02/05/21)



Parmi tous les patients hospitalisés pour COVID-19 depuis le début de l'épidémie, 32,7% avaient une maladie cardiovasculaire, 23,0% le diabète, 15,0% une maladie pulmonaire chronique, 12,0% de l'obésité, 13,5% une maladie rénale chronique et 9,8% un cancer solide. Il est important de garder à l'esprit qu'une même personne peut avoir plusieurs problèmes de santé préexistants.

Évolution par mois des problèmes de santé préexistants des patients hospitalisés COVID-19



### 3.7. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 20 mai 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.

	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
<b>Belgique</b>	<b>1992</b>	<b>562</b>	<b>28%</b>
Antwerpen	301	78	26%
Brabant wallon	23	6	26%
Hainaut	259	118	46%
Liège	230	48	21%
Limburg	145	35	24%
Luxembourg	43	4	9%
Namur	97	39	40%
Oost-Vlaanderen	265	68	26%
Vlaams-Brabant	139	28	20%
West-Vlaanderen	221	36	16%
Région bruxelloise	269	102	38%


\*Nombre total de lits USI accrédités en novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

### 3.8. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


#### 3.8.1. Mortalité par région

Pour la période du 11 mai 2021 au 17 mai 2021, 139 décès ont été rapportés; 58 en Flandre, 60 en Wallonie et 21 à Bruxelles. Les décès sont présentés par semaine, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et par semaine




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (11/05/21-17/05/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et par semaine




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et par semaine



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par semaine et par région des personnes de plus de 65 ans résidant ou non en maison de repos



Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Total des décès rapportés **du 11 mai 2021 au 17 mai 2021**

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	57	98%	21	100%	58	97%	136	98%
<i>Cas confirmés</i>	57	100%	21	100%	58	100%	136	100%
<i>Cas possibles</i>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Maison de repos	1	2%	0	0%	2	3%	3	2%
<i>Cas confirmés</i>	1	100%	0	N/A	2	100%	3	100%
<i>Cas possibles</i>	0	0%	0	N/A	0	0%	0	0%
Autres collectivités résidentielles	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Domicile et autre	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>

\*Les décès à l'hôpital incluent les résidents de maison de repos et maison de repos et de soin qui décèdent à l'hôpital. Des analyses complémentaires concernant les décès des résidents de maison de repos sont présentés dans le chapitre 2.7 sur les maisons de repos.

Total cumulé des décès rapportés **du 31 août 2020 au 17 mai 2021**

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 601	60%	1 410	85%	4 079	73%	10 090	68%
<i>Cas confirmés</i>	4 450	97%	1 385	98%	4 028	99%	9 863	98%
<i>Cas possibles</i>	151	3%	25	2%	51	1%	227	2%
Maison de repos	2 986	39%	244	15%	1 452	26%	4 682	32%
<i>Cas confirmés</i>	2 858	96%	226	93%	1 392	96%	4 476	96%
<i>Cas possibles</i>	128	4%	18	7%	60	4%	206	4%
Autres collectivités résidentielles	26	0%	2	0%	31	1%	59	0%
Domicile et autre	1	0%	6	0%	1	0%	8	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7 614</b>	<b>100%</b>	<b>1 662</b>	<b>100%</b>	<b>5 563</b>	<b>100%</b>	<b>14 839</b>	<b>100%</b>

\*Les décès à l'hôpital incluent les résidents de maison de repos et maison de repos et de soin qui décèdent à l'hôpital. Des analyses complémentaires concernant les décès des résidents de maison de repos sont présentés dans le chapitre 2.7 sur les maisons de repos.

Pour plus d'informations sur le lieu de décès, veuillez consulter le point 6 du document [questions fréquemment posées](#).

### 3.8.2. Mortalité par province

Le tableau ci-dessous indique la répartition des décès survenus du 10 mai 2021 au 16 mai 2021 ainsi que le taux de décès par 100 000 habitants, par province et pour la Région bruxelloise.

Provinces*	Nombre de décès	Taux de décès par 100 000 habitants
Antwerpen	18	0.96
Brabant wallon	4	0.99
Hainaut	32	2.38
Liège	23	2.07
Limburg	11	1.25
Luxembourg	2	0.70
Namur	10	2.02
Oost-Vlaanderen	11	0.72
Vlaams-Brabant	4	0.35
West-Vlaanderen	15	1.25
Région bruxelloise	14	1.15

\*Quand la province de résidence n'est pas connue, la province où le décès a eu lieu a été utilisé


### 3.9. SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ (TOUTES CAUSES CONFONDUES)

#### 3.9.1. Be-MOMO (Belgium Mortality Monitoring)

En Belgique, la surveillance de la mortalité (toutes causes confondues), Be-MOMO, est basée sur les données du Registre National. Il y a 2 semaines d'attente nécessaires pour obtenir une exhaustivité de plus de 95 %, les chiffres des dernières semaines sont donc préliminaires. Pour plus d'informations sur Be-MOMO : <https://epistat.wiv-isp.be/momo/>.

Il n'y a pas de surmortalité statistiquement significative observée en Belgique en semaine 17. La surmortalité durant la 2ème vague de l'épidémie s'est concentrée entre le 19 octobre et le 27 décembre 2020 (semaine 43 à 52). Le bilan provisoire de la surmortalité durant la 2ème vague de l'épidémie est de 8 088 décès supplémentaires en Belgique (37% d'excès de mortalité), dont 3 584 décès supplémentaires (40% d'excès de mortalité) dans le groupe d'âge des 65-84 ans et 4 017 décès supplémentaires (42% d'excès de mortalité) chez les plus de 85 ans. Sur cette même période 8 928 décès COVID-19 ont été enregistrés en Belgique. Plus d'information sur la surmortalité en 2020 dans le [communiqué de presse de Sciensano du 15 janvier 2021](#).

Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 09/05/21 (sur base des données collectées jusqu'au 15/05/21), Belgique




Comment lire ce graphique ? Quand le nombre de décès par jour dépasse les limites supérieures ou inférieures des décès prévus par la modélisation (lignes pointillées grises), il y a une surmortalité ou une sous-mortalité significative. La zone orange représente le nombre de décès lié au COVID-19 (cas confirmés et possibles, tous lieux de décès) qui a été soustrait au nombre de décès toutes causes confondues.


Nombre de décès toutes causes confondues par semaine (Belgique)

Semaine	Date du lundi	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus (Be-MOMO)	Nombre de décès supplémentaires	Nombre de jours avec surmortalité significative	Excès de mortalité (%)	Taux brut de mortalité (100 000 habitants)
2021-W14	5/4/2021	2 186	2 255	-	0	-	19,0
2021-W15	12/4/2021	2 147	2 214	-	0	-	18,7
2021-W16	19/04/2021	2 196	2 175	21	0	1,0	19,1
2021-W17	26/04/2021	2 176	2 134	42	0	1,9	18,9


Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 09/05/21 (sur base des données collectées jusqu'au 15/05/21), Wallonie



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 09/05/21 (sur base des données collectées jusqu'au 15/05/21), Bruxelles



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 09/05/21 (sur base des données collectées jusqu'au 15/05/21), Flandre




## La surmortalité durant l'épidémie de COVID-19

Vous trouverez un résumé de la surmortalité durant le printemps 2020 dans le [bulletin épidémiologique hebdomadaire du 19/06/2020](#).

### 3.9.2. EuroMOMO: surveillance de la mortalité (toutes causes confondues) en Europe

EuroMOMO publie un bulletin hebdomadaire sur la mortalité toutes causes confondues dans un maximum de 26 pays ou régions de pays européens. Le nombre de décès au cours des dernières semaines doit être interprété avec prudence car il y a un délai d'environ trois semaines pour obtenir des données significatives de surmortalité. Pour plus d'informations: <http://www.euromomo.eu/index.html>.

Mortalité toutes causes confondues pour 26 pays ou régions d'Europe, semaine 17 (du 26/04/21 au 02/05/21)



Week of study: 20, 2021. Must be interpreted with caution as adjustments for delayed registrations may be imprecise.


Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

### 3.10. SURVEILLANCE EN MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Afin de suivre la situation dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR/MRS), on utilise trois indicateurs: le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas confirmés de COVID-19, l'incidence (nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19) par semaine et le nombre de résidents en MR/MRS, décédés d'une infection possible ou confirmée par COVID-19. Ces indicateurs sont basés sur les données rapportées le mardi par les MR/MRS dans le cadre de la surveillance COVID-19 pour les collectivités résidentielles. De plus amples informations sur cette surveillance et l'explication des graphiques ci-dessous se trouvent dans le [rapport hebdomadaire sur la surveillance en MR/MRS](#).


Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés, à partir du 31 août 2020. Le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 1 ou au moins 10 cas COVID-19 confirmés, est disponible dans le rapport détaillé.

Pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés (le mardi), depuis 31/08/20



Le graphique ci-dessous montre l'incidence (nombre de nouveaux cas) par semaine (rapportés du mercredi au mardi) des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS pour 1 000 résidents, par région/communauté. La somme des nouveaux cas, rapportés une fois par semaine, est représentée sur le graphique.


Incidence par semaine des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS belges pour 1 000 résidents, par région/communauté, depuis 31/08/20.



Les décès COVID-19 sont généralement présentés par lieu de décès, de sorte que les résidents des maisons de repos qui meurent à l'hôpital sont généralement comptés dans les décès à l'hôpital. Nous présentons ici la répartition des décès COVID-19 parmi les résidents de MR/MRS qu'ils décèdent en maisons de repos ou à l'hôpital.

Entre 11 mai 2021 et 17 mai 2021, 10 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 3 en MR/MRS (1 en Flandre, 0 à Bruxelles, 2 en Wallonie), 7 à l'hôpital (2 en Flandre, 0 à Bruxelles, 5 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 (confirmés et probables) parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et par semaine



Nombre de décès COVID-19 (confirmés et probables) parmi les résidents des maisons de repos par lieux de décès et par région pour la période du 31/08/20 au 16/05/21

Lieu de décès	Flandres		Bruxelles		Wallonia		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	1027	26	224	48	628	30	1 879	29
Maisons de repos	2986	74	244	52	1,452	70	4 682	71
Domicile et autre	0	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>4013</b>	<b>100</b>	<b>468</b>	<b>100</b>	<b>2,081</b>	<b>100</b>	<b>6 562</b>	<b>100</b>

De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

### 3.11. SITUATION COVID-19 POUR LES ENFANTS ET EN MILIEU SCOLAIRE

La situation épidémiologique des enfants entre 3 et 17 ans est suivie de près depuis le début de l'épidémie. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, une partie importante de cette tranche d'âge a fréquenté l'école et a eu des contacts sociaux réguliers. Dans ce contexte, certaines mesures et recommandations ont spécifiquement été mises en place pour les enfants. Parmi celles-ci :

- Les milieux d'accueils et classes maternelles sont restés ouverts. Jusqu'en février, la stratégie de testing et la définition de contacts à haut risque pour les moins de 6 ans sont restées plus ciblées que pour les autres groupes d'âge en testant ces enfants uniquement dans certaines circonstances. Ensuite, eu égard au risque lié à l'apparition de nouveaux variants, il a été recommandé de tester les enfants de <6 ans asymptomatiques ayant eu un contact à haut risque hors du cercle familial.
- Pour les élèves de l'école primaire, l'enseignement est resté à 100% en présentiel. Une révision de la classification des contacts à haut risque a eu lieu en janvier amenant à considérer les camarades de classe assis côte à côte du cas, comme contacts à haut risque, ce qui n'était pas le cas auparavant.
- Pour les élèves de secondaire du 1<sup>er</sup> degré, l'enseignement est à 100% en présentiel et n'a été qu'à 50% en présentiel pour les élèves des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> degrés de la mi-novembre au 10 mai. La classification de contacts et la stratégie de test des élèves de secondaire sont identiques aux recommandations pour les adultes.

La mise en application de la stratégie de testing décrite dans les procédures est activement suivie par les services de santé scolaire (CLB en communauté flamande, PSE et PMS-WBE en communauté française). Ceux-ci participent également pleinement au système de suivi des contacts au sein de l'école. Lorsque cela est nécessaire, les services régionaux de prévention des maladies infectieuses peuvent décider en collaboration avec l'école, de la fermeture d'une école et/ou de la mise en place d'un dépistage élargi.


C'est dans ce contexte de suivi rigoureux des cas et de leurs contacts dans les écoles que les résultats doivent donc être interprétés. Cela s'observe notamment à travers le nombre de tests effectués dans les écoles et la proportion de cas asymptomatiques plus élevés chez les enfants que dans le reste de la population.

Les graphiques utilisés dans cette section sont produits à partir de deux sources de données complémentaires. D'une part, la surveillance des laboratoires cliniques qui envoient tous les tests analysés par âge. D'autre part, la surveillance des écoles qui regroupe des informations collectées par les services CLB, PSE et PMS-WBE. Ces informations transmises aux autorités régionales complètent celles des laboratoires avec des détails sur l'indication de test des cas positifs et sur les liens possibles entre les cas.

L'évolution du nombre de cas confirmés est calculée à partir des résultats de tests rapportés par les laboratoires. Le nombre de tests effectués (positifs et négatifs) permet d'interpréter l'évolution de l'incidence par tranche d'âge dans le contexte des changements de stratégie de testing. Les groupes d'âge utilisés pour l'analyse de l'incidence et du nombre de tests sont définis en fonction des niveaux scolaires (bien que les tranches d'âge ne correspondent pas parfaitement aux niveaux scolaires).

Incidence cumulée sur 14 jours, par tranche d'âge, par 100 000 habitants de la tranche d'âge, 31/08/2020 (semaine 36) au 16/05/2021 (semaine 19), Belgique.


(Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires)



Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires.

Nombre de tests effectués (moyenne glissante sur 7 jours) par tranche d'âge et pour 100 000 habitants de la tranche d'âge, 31/08/2020 (semaine 36) au 16/05/2021 (semaine 19), Belgique.

(Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires)




Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires

Depuis septembre 2020, les indications de tests sont rapportées par les services de santé scolaire (CLB, PSE et PMS-WBE) pour tous les cas confirmés qui leur ont été rapportés. La figure ci-dessous montre l'évolution de la proportion des cas testés pour chaque raison de test. La catégorie « Autre » reprend principalement les tests de dépistage en prévision d'une admission à l'hôpital et les tests suite au retour de voyages. Pendant les vacances de Pâques, la raison de test « Autre » a également été utilisée en Flandre pour les cas où la transmission n'a pas eu lieu à l'école, ni à la maison.

Indications de test (pourcentage) rapportées parmi les cas de COVID-19 chez les élèves, par semaine, du 31/08/2020 (semaine 36) au 16/05/2021 (semaine 19), Belgique.

(Source : surveillance scolaire en communauté flamande et en communauté française, VGOV/CLB/VAZG et ONE/PSE/PMS-WBE).




Les zones grisées couvrent les périodes de fermeture généralisée des écoles et vacances scolaires.

Enfin, à partir des données de la surveillance scolaire, il est possible de détecter les écoles dans lesquelles une transmission probable a lieu et donc dans lesquelles au moins un cluster est identifié (au moins 2 cas confirmés ayant un lien épidémiologique à l'école au cours de la même semaine ou à une semaine d'intervalle). Un cas secondaire est identifié à partir de son indication de test (« Contact à haut risque à l'école ») ou s'il est identifié comme tel par les services de santé à l'école. Il s'agit donc d'une détection spécifique aux milieux scolaires.

Proportion des écoles<sup>5</sup> dans lesquelles au moins un cluster d'au moins 2 cas et d'au moins 5 cas a été rapporté du 07/12/2020 (semaine 49) au 16/05/2021 (semaine 19), Belgique.

(Source : surveillance scolaire en communauté flamande et en communauté française, VGOV/CLB/VAZG et ONE/PSE/PMS-WBE).



<sup>5</sup> Les écoles, dans ce contexte, sont définies comme l'ensemble des écoles ayant un "school nummer" unique en communauté flamande (3671 écoles) et un « code FASE Etablissement » unique en communauté française (2440 écoles), et ayant rapporté au moins un cas depuis le début de la surveillance scolaire en décembre 2020.

Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

## 3.12. INVESTIGATION DES CLUSTERS: RAPPORT DU 10/05/21 - 16/05/21

### 3.12.1. Clusters communautaires et en collectivité structurelle rapportés par les régions

Cet aperçu des clusters rapportés par les régions pour la période du 10 mai 2021 au 16 mai 2021, comprend les clusters enregistrés sur le lieu de travail (entreprises privées et publiques), dans les collectivités (écoles, maisons de repos, collectivités pour personnes handicapées, collectivités médicales, centres d'accueil et d'hébergement) au sein des familles et dans la communauté.

Un cluster est défini dès la confirmation de **minimum 2 cas COVID-19** ayant un lien épidémiologique, dans une période définie (généralement 7 ou 14 jours, selon les situations). Ce lien peut être, entre autres, un contact physique ou à faible distance (< 1,5m) et prolongé (>15 min) entre eux.

Un **nouveau cluster** est un cluster nouvellement confirmé au cours de la semaine de rapportage. Un cluster reste actif pendant 14 jours après la notification du dernier cas du cluster (sauf fermeture exceptionnelle par les services régionaux de santé). Les **clusters actifs** rapportés dans la période de rapportage sont ceux qui ont été actifs pendant au moins un jour de la période de rapport, et incluent donc aussi bien les nouveaux clusters, les clusters encore ouverts et les clusters qui ont été fermés durant la période de rapportage. Ce rapportage se fait sur base de différentes sources des données et dépend de différents facteurs qui peuvent varier selon les régions.


Pour interpréter ces résultats, il est important de tenir compte de la méthode et de l'objectif avec lequel les données sont collectées. La surveillance des clusters a pour principal objectif de réduire la propagation du virus par l'identification et le contrôle de foyers, et se concentre donc sur les clusters pour lesquels une intervention est possible, c'est-à-dire, ayant un contexte clair où des mesures de contrôle et de prévention peuvent être mises en place. Cette surveillance est menée à plusieurs niveaux (communal, provincial ou régional) au sein des différentes régions et communautés. Il est donc possible que certains clusters soient gérés très localement et les données ne soient pas nécessairement transmises au niveau central. De plus, il existe des différences dans les méthodes de confirmation des clusters par région qui peuvent affecter les chiffres absolus.

Les données permettant l'investigation de clusters dans les trois régions et la communauté germanophone proviennent principalement de quatre sources: la déclaration systématique obligatoire par les institutions (centres de soins résidentiels, maisons de repos, autres institutions résidentielles et institutions de soins); la base de données de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) pour la détection et le suivi d'éventuels clusters dans les entreprises; les données du suivi de contacts (call center) et dans certains cas, les données des écoles.

Les clusters dans les écoles mentionnés ici ne concernent que ceux enregistrés par les services de prévention des maladies infectieuses. Ce relevé de clusters pourrait donc ne pas être complet car certains clusters dans les écoles, suivis par les services médicosociaux, ne sont pas repris dans ce rapport. Un système d'enregistrement spécifique des clusters dans les écoles de la communauté flamande a été mis en place récemment. Il permet le recoupement des données du Zorgatlas (VAZG) et des données du LARS « Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem » (qui est utilisé par le CLB pour enregistrer l'investigation et le suivi des contacts dans une école). Cette plateforme permet d'accéder à une cartographie plus complète des clusters ce qui se traduit par une augmentation soudaine du nombre de clusters enregistrés depuis la semaine 17.


Certaines autres sources ponctuelles peuvent également être utilisées par les régions pour ouvrir une investigation. Il s'agit essentiellement des clusters confirmés liés à des événements dans la population (clusters communautaires). Le faible nombre d'enregistrement de cette catégorie est notamment expliqué par la difficulté à identifier les liens épidémiologiques entre les individus dans une communauté. La probabilité qu'un cluster communautaire soit rapporté comme cluster confirmé est donc beaucoup plus faible que pour les collectivités structurelles.

Nombre de nouveaux clusters rapportés par les régions au cours des semaines 46 2020 à 19 2021



\* A partir de la semaine 51, l'AViQ (région wallonne) a mis en place un nouveau système de détection, d'investigation et de suivi des clusters. Cela peut en partie expliquer l'augmentation soudaine du nombre de clusters à partir de la semaine 51.

## Nombre de clusters actifs rapportés par les régions au cours des semaines 46 2020 à 19 2021




\* A partir de la semaine 51, l'AViQ (région wallonne) a mis en place un nouveau système de détection, d'investigation et de suivi des clusters. Cela peut en partie expliquer l'augmentation soudaine du nombre de clusters à partir de la semaine 51.

Au cours de la période du 10 au 16 mai 2021, 518 nouveaux clusters (pour lesquels 1665 cas ont été identifiés) et 2554 clusters actifs (pour lesquels 19 317 cas sont identifiés) sont rapportés – les clusters sont clôturés 14 jours après la notification du dernier cas, si aucun autre nouveau cas lié n'apparaît au cours de cette période.


La plupart des clusters actifs confirmés pour la semaine 19 sont signalés sur les lieux de travail (49%) et dans les écoles (34%). Parmi les autres collectivités structurelles, on observe une stabilisation du nombre de clusters actifs dans les maisons de repos (5%) depuis plusieurs semaines. Les résidences pour personnes handicapées regroupent 2%, les centres d'accueil et d'hébergement de type social (inclus également le milieu carcéral) représentent 2% et les collectivités médicales contribuent également pour 2% du nombre total de clusters actifs rapportés. Ces derniers regroupent les centres résidentiels ou non dans lesquels des soins (hôpitaux généraux, centre de revalidation, psychiatriques, palliatifs, etc.) sont prodigués. Les clusters communautaires (événement privé, Horeca, etc.) représentent 2% du nombre total de clusters rapportés par les régions.

Nouveaux clusters (n=518) rapportés par les régions, par type et par province, Belgique, semaine 19  
(10/05 au 16/05)



\* à l'exception des employés dans les collectivités

Clusters actifs rapportés (n= 2 554) par les régions, par type, en Belgique, pour la semaine 19  
(10/05/21 au 16/05/21)




\* à l'exception des employés dans les collectivités

### 3.12.2. Clusters familiaux pour la semaine du 10/05/21 au 16/05/21

Le tableau reprend les clusters familiaux détectés par la banque de données, rapportés soit par les régions, soit par Sciensano, sur base de critères semblables. Il s'agit d'une détection théorique de clusters. Sauf exception ou informations supplémentaires, tous les cas COVID-19 positifs sont contactés par le call center pour permettre le suivi des contacts mais sauf exception ou informations supplémentaires un cluster familial ne sera pas investigué par le service de surveillance des maladies infectieuses des différentes régions.

Nombre de clusters familiaux détectés sur base des données du contact tracing, par région, semaine 1 à 19




### 3.12.3. Evolution du nombre de clusters possibles détectés en maison de repos et de soins (10/05/21-16/05/21)

En plus du programme de surveillance des cas COVID-19 au sein des MR/MRS, Sciensano a mis en place un système de surveillance et de détection précoce de clusters possibles au sein des MR/MRS sur base des notifications enregistrées pour les trois régions. Environ 96% des MR/MRS participent actuellement au moins une fois par semaine à cette surveillance.

Un cluster possible est défini par au moins deux cas confirmés rapportés endéans une période de 7 jours. La figure ci-dessous présente les nouveaux clusters possibles détectés par semaine (du lundi au dimanche) et par région. Les clusters possibles actifs qui ont commencé la semaine précédente ne sont pas inclus dans cette figure.


Il convient de noter que ces clusters sont détectées sur base théorique, une enquête épidémiologique est nécessaire pour les confirmer. La détection des clusters peut se faire avec retard, car les MR/MRS doivent d'abord tester les résidents et recevoir le résultat avant de pouvoir signaler un cas confirmé.

Nombre de nouveaux clusters possibles par semaine, par région/communauté, 31/08/2020-16/05/21



Tant que de nouveaux cas COVID-19 confirmés sont rapportés parmi les résidents au cours des deux dernières semaines, le cluster possible est considéré comme un cluster possible actif. La figure ci-dessous présente les clusters possibles actifs par semaine (du lundi au dimanche) et par région.

Nombre de clusters possibles actifs par semaine (du lundi au dimanche), par région/communauté, 31/08/2020-16/05/21



### 3.13. SURVEILLANCE PAR DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

#### 3.13.1. Surveillance des syndromes grippaux par le réseau des médecins vigies


Le réseau sentinelle des médecins généralistes enregistre en continu les consultations en médecine générale pour les syndromes grippaux et les infections aiguës des voies respiratoires. Etant donné que ces symptômes peuvent être causés par des pathogènes différents du virus de la grippe, des échantillons sont prélevés de façon aléatoire et sont analysés par le Centre national de référence de la grippe. Ces échantillons sont prélevés via un écouvillon nasal et sont testés pour le virus de la grippe mais également pour un certain nombre d'autres virus respiratoires (y compris, depuis mars 2020, pour le SARS-CoV-2). Le réseau compte environ 100 cabinets de médecins généralistes répartis dans toute la Belgique qui enregistrent les données sur base volontaire.

La figure ci-dessous montre le nombre de consultations par semaine pour syndromes grippaux et infections respiratoires aiguës pour 100 000 habitants, pour les 5 dernières saisons de grippe.

Au cours de la saison de grippe de 2019-2020, une dichotomie claire est observée, le premier pic étant expliqué par la grippe et le deuxième pic et ses ramifications par l'émergence du SARS-CoV-2. La ligne vert foncé décrit la période actuelle et montre que le nombre de consultations pour symptômes grippaux et infections respiratoires aiguës.

Au cours de la semaine du 10 mai 2021 au 16 mai 2021, l'incidence des consultations chez le médecin généraliste pour syndrome grippal a légèrement augmenté à 76 consultations pour 100.000 habitants par semaine (consultations téléphoniques incluses).


Symptômes de la grippe: Incidence des consultations chez le généraliste



Depuis le 18 mai 2020, la stratégie et l'organisation nationales de dépistage du COVID-19 ont temporairement empêché les médecins généralistes du réseau de surveillance d'utiliser un écouvillon pour la grippe. C'est pourquoi, depuis le 29 juin, une surveillance des résultats des tests a été mise en place chez les médecins du réseau vigie, afin de pouvoir continuer à suivre le pourcentage de COVID-19 chez les patients présentant des symptômes grippaux.

Au cours de la dernière semaine (10 mai 2021 - 16 mai 2021), 50 % des patients qui ont consulté leur médecin généraliste pour des symptômes grippaux avaient un test PCR positif pour SARS-CoV-2.

Symptômes de la grippe: Incidence des consultations chez le généraliste




L'intégralité du bulletin hebdomadaire infections respiratoires est accessible via [ce lien](#).

### 3.13.2. Enregistrement des patients avec suspicion de COVID-19 dans le baromètre des médecins généralistes

Le baromètre des médecins généralistes est actif depuis octobre 2020. Il a pour but de cartographier les diagnostics de symptômes similaires à ceux du COVID-19, à savoir un cas de COVID-19 possible ou confirmé, un syndrome viral, un syndrome grippal ou une autre infection respiratoire aiguë. Le total (par diagnostic) est calculé en fin de journée sur base des diagnostics codés dans les dossiers médicaux électroniques des médecins généralistes participants.

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution du nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19, présenté pour 100 000 habitants. L'évolution est d'abord montrée pour la Belgique dans son ensemble puis divisée par région, pour la Flandre, la Wallonie et la Région bruxelloise.



L'intégralité du bulletin hebdomadaire infections respiratoires est accessible via [ce lien](#).

### 3.14. ABSENCES AU TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE

MEDEX surveille les absences journalières pour maladie chez les fonctionnaires du gouvernement belge (base de données MEDEX, n = 83 002). Ces absences peuvent être considérées comme un indicateur de l'impact du COVID-19 sur la population active. Il convient de souligner cependant que toutes les absences ne sont pas forcément liées à une infection causée par le SARS-CoV-2. De plus, les certificats de quarantaine ne sont pas inclus dans cette surveillance et ne sont donc pas repris dans les données ci-dessous.

La figure ci-dessous montre les absences journalières pour maladie chez ces fonctionnaires stratifiées par catégorie d'âge. Les fonctionnaires du gouvernement sont répartis dans les différentes catégories d'âge comme suit: 20-29 ans 8,9 %; 30-39 ans 21,3 %; 40-49 ans 26,2 %; 50-59 ans 32,0 %; 60-69 ans 11,6 %.

Il est important de noter que la population étudiée a été figée en février 2020, l'interprétation des résultats observés doit donc se faire avec prudence, surtout pour certaines catégories d'âge, comme les 60-69 ans pour lesquels les départs à la pension par exemple ne sont pas pris en compte. Pour cette tranche d'âge l'évolution des absences est difficile à interpréter. Depuis début avril le nombre de fonctionnaires malades est resté stable. Cela concerne toutes les tranches d'âge.


Nombre de fonctionnaires malades (MEDEX, n = 83 002), évolution quotidienne stratifiée par catégorie d'âge - depuis le 31/08/20



Le diagnostic apposé par le médecin est disponible sur le certificat MEDEX d'incapacité de travail. Ces données sont regroupées sur base des codes ICD 9 (Nomenclature OMS) et de texte libre.

La figure ci-dessous indique le nombre de fonctionnaires atteint de maladie respiratoire, par diagnostic mentionné sur le certificat. Depuis début avril le nombre de diagnostics de "COVID-19", de "syndromes grippaux (ILI)" ou d' "autres maladies respiratoires" est en diminution.

Nombre de fonctionnaires malades (MEDEX, n = 83 002), par diagnostic (maladies respiratoires uniquement) mentionné sur le certificat, évolution journalière depuis le 31/08/20



Source : [MEDEX](https://www.meDEX.be)

## 3.15. MOBILITÉ EN BELGIQUE ET PAR PROVINCE

Données collectées jusqu'au 15-mai-21


### 3.15.1. Données récoltées par Proximus

Disclaimer: Proximus partage ses données agrégées de mobilité avec Sciensano dans le but de contribuer à la lutte contre l'épidémie COVID-19.

La figure ci-dessous montre l'évolution de la mobilité en Belgique (courbe noire), dans chaque province et à Bruxelles (courbes colorées). La mobilité est ici évaluée sur base de données anonymisées et agrégées collectées par l'opérateur de téléphonie Proximus. Les lignes pointillées verticales indiquent les dates des principales mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise du COVID-19.

Au cours de la dernière semaine écoulée, les niveaux de mobilités en Belgique ont dans un premier temps poursuivi leur hausse avant de diminuer rapidement à partir du jeudi de l'Ascension.

Evolution de la mobilité en Belgique (courbe noire), dans chaque province, et en région bruxelloise sur base des trajets enregistrés par Proximus. Les résultats sont présentés comme la variation (en %) par rapport à une période de référence définie du 10-23 février 2020.



Note: Chaque province a son propre niveau de référence. Par conséquent, si le niveau de la courbe d'une province est plus bas que celui d'une autre, cela signifie que la mobilité a davantage diminué dans cette province par rapport à la période de référence, mais pas nécessairement que la mobilité est plus basse dans cette province de manière absolue.

Le tableau ci-dessous donne une vision chiffrée de l'évolution de la mobilité au cours des dernières semaines. Il reprend les différences par semaine en comparaison aux variations observées lors du confinement de Mars-Avril 2020. Sur la période du 18 mars au 4 mai 2020, la variation de mobilité en Belgique par rapport à la période de référence pré-pandémie (10-23 février 2020) était de -43.1%. Les nombres donnés dans le tableau ci-dessous sont les différences entre ce pourcentage caractérisant le premier confinement et le pourcentage observé lors de chacune des 8 dernières semaines. Plus cette différence est grande, plus la mobilité est proche de son niveau de février 2020.

Différence de la variation de mobilité (%) en comparaison à la période du premier confinement (18 mars au 4 mai 2020) en Belgique, dans chaque province et en Région bruxelloise. Les résultats sont donnés par semaine pour les 8 dernières semaines. Les résultats sont colorés en gradient de rouge: plus la cellule est foncée, plus la mobilité a augmenté par rapport à la période du premier confinement.

	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19
Belgique	27.1	24.9	14.3	21.5	29.0	28.8	30.5	26.8
Antwerpen	25.7	24.4	12.4	21.5	28.1	27.7	28.7	26.0
Brabant Wallon	32.2	27.3	17.2	23.6	32.9	33.1	35.2	31.2
Hainaut	30.1	26.8	17.8	23.7	31.9	32.4	34.0	29.6
Liège	28.8	26.6	14.6	21.5	29.3	29.1	30.9	27.6
Limburg	28.4	27.3	14.3	23.4	30.3	30.5	31.8	29.0
Luxembourg	30.9	28.6	18.3	24.7	33.0	32.7	34.3	30.4
Namur	25.7	24.5	14.0	21.0	29.1	29.4	31.3	28.3
Oost-Vlaanderen	21.6	20.2	10.2	18.5	24.5	24.1	25.7	21.8
Vlaams-Brabant	24.3	21.9	11.1	17.9	26.0	25.5	27.6	24.3
West-Vlaanderen	23.7	21.8	11.9	20.3	25.6	25.1	26.0	20.4
Région bruxelloise	30.9	29.9	21.0	26.1	31.9	32.2	33.4	32.8

### 3.15.2. Données récoltées par Google

*Disclaimer: Google partage ses données agrégées de mobilité via [ce lien](#) dans le but de contribuer à la lutte contre l'épidémie COVID-19.*


Les données Google sur la mobilité de la communauté donnent un aperçu de la mobilité dans une région ou un pays. Il s'agit de bases de données agrégées et anonymisées provenant des nombreux utilisateurs qui partagent leur localisation avec Google. Celles-ci n'incluent donc pas les données pour l'ensemble de la population.

Le graphe ci-dessous présente quatre indicateurs de mobilité fournis par Google pour analyser les tendances de déplacements dans le temps: résidentiel, lieux de travail, commerce & loisirs<sup>6</sup> et stations de transport public. Il est important de noter que pour la catégorie "Résidentiel" l'indicateur est mesuré par un changement dans la durée, c'est-à-dire le temps passé au domicile, tandis que pour les autres catégories, les indicateurs mesurent un changement du nombre de fréquentations des différents lieux.

<sup>6</sup> des lieux comme les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, les parcs à thème, les musées, les bibliothèques et les cinémas

Les pourcentages de mobilité sont comparés à une médiane de référence (valeur zéro). La valeur zéro pour chaque indicateur a été calculée sur base de la mobilité de cet indicateur pour la période du 3 janvier au 6 février 2020. Il s'agit de la période la plus récente où l'épidémie de COVID-19 n'avait pas encore commencé à se manifester dans la plupart des pays. La ligne horizontale de référence représente la valeur zéro pour chaque indicateur. Toutes les tendances de déplacements dans le temps et l'espace ont donc leur propre référence.

Evolution de la mobilité en Belgique en fonction de la fréquentation de lieux définis et le temps passé au domicile par rapport à la période de référence définie (3 janvier au 6 février 2020)



### 3.16. DONNÉES ISSUES DES PASSENGER LOCATOR FORMS (PLF)

Source: Dashboard Paloma (situation le 20/05/2021)

Le PLF est un formulaire en ligne qui doit être rempli par toute personne (belge ou non) lorsqu'elle entre ou voyage en Belgique depuis un autre pays, et ceci quel que soit le moyen de transport. Les pays/régions de provenance des voyageurs sont classés en trois zones différentes (zone rouge, zone orange et zone verte) en fonction du niveau de circulation du virus et donc du risque de transmission/contagion.


Différentes recommandations en terme de quarantaine et testing sont appliquées aux voyageurs arrivant en Belgique en fonction de la zone de provenance. Les zones (rouge, orange et verte) sont déterminées par le CELEVAL, le SPF Santé publique et le SPF Affaires étrangères, sur base d'indicateurs tels que par exemple l'incidence des pays sur les 14 derniers jours.

Etant donné que le classement d'un pays/région est déterminé par sa situation épidémiologique, celui-ci peut varier dans le temps. La stratégie de testing est en constante évolution. Entre le 21 octobre et le 23 novembre, les voyageurs de retour de zone rouge n'étaient plus été testés. A partir du 23 novembre, le testing avait repris sur base d'un questionnaire d'auto-évaluation des risques pris lors du voyage. Depuis le 1er janvier, les voyageurs revenant de zone rouge doivent être testés deux fois, une première fois dès le retour en Belgique et une deuxième fois au plus tôt le 7e jour après la date de retour en Belgique.

#### 3.16.1. Nombre de passenger locator forms à partir du 1er janvier 2021

Du 1er janvier 2021 au 16 mai 2021, un total de 759 536 PLF ont été collectés, dont 250 007 en janvier, 105 485 en février, 116 946 en mars, 165 374 en avril et 121 724 jusqu'au 16 mai. Sur l'ensemble des PLF, 80,3 % provenaient de voyageurs venant de zones rouges et 7,3 % de passagers venant de zones oranges.

Nombre de Passenger Locator forms (PLF) en fonction du risque COVID défini pour chaque zone (01/01/21 – 16/05/21)



Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

### 3.16.2. Arrivées de zone rouge et taux de positivité (10/05/21-16/05/21)

Le nombre d'individus provenant d'une zone à risque rouge et le taux de positivité pour la semaine du 10 mai 2021 au 16 mai 2021 est indiqué ci-dessous pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise.

Ces données ne concernent que les voyageurs ayant rempli un PLF.

Belgique/ Provinces/ Region	Nombre total d'arrivées	Arrivées d'une zone rouge		Nombre total de personnes à tester ayant un NISS*	Tests		Taux de positivité	
		Nombre	% (nombre total d'arrivées)		Nombre de tests effectués		Test 1	Test 2
					Test 1	Test 2		
<b>BELGIQUE</b>	60 487	39 473		19 524	12 425	1 869	1,4%	0,9%
<b>Antwerpen</b>	7 264	4 672	7,7%	2 424	1 654	322	1,5%	1,6%
<b>Brabant wallon</b>	2 613	1 835	3%	1 136	719	97	0,7%	1%
<b>Hainaut</b>	3 254	2 209	3,7%	1 122	668	95	0,6%	0%
<b>Liège</b>	3 344	2 499	4,1%	1 394	819	100	1,5%	0%
<b>Limburg</b>	1 887	1 349	2,2%	630	439	76	1,4%	0%
<b>Luxembourg</b>	755	622	1%	283	186	14	0,5%	0%
<b>Namur</b>	1 509	1 084	1,8%	626	431	40	0,7%	0%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	4 998	2 964	4,9%	1 622	1 045	188	1,5%	0,5%
<b>Vlaams-Brabant</b>	5 591	3 699	6,1%	2 214	1 399	241	1,1%	1,2%
<b>West-Vlaanderen</b>	5 113	3 260	5,4%	1 186	821	137	0,5%	0,7%
<b>Région bruxelloise</b>	18 222	14 783	24,4%	6 814	4 204	555	2%	1,1%
<i>Données sur la province manquantes</i>	5 937	497	0,8%	73	40	4	0%	0%

\*Ceci représente le nombre de personnes ayant reçu un code CTPC pour se faire tester.


### 3.16.3. Provenance des voyageurs et taux de positivité (10/05/21-16/05/21)

Le tableau ci-dessous présente les quinze pays desquels les voyageurs ayant rempli un PLF arrivent majoritairement en Belgique entre le 10 mai 2021 et le 16 mai 2021. Le taux de positivité associé est également montré.

Pays de provenance	Nombre d'arrivées	% (total du nombre d'arrivées)	Taux de positivité* test 1
<b>Espagne</b>	14742	24,4%	1,1%
<b>France</b>	12171	20,1%	1,2%
<b>Portugal</b>	3177	5,3%	0,0%
<b>Italie</b>	2687	4,4%	0,7%
<b>Allemagne</b>	2608	4,3%	0,6%
<b>Grèce</b>	1626	2,7%	1,9%
<b>Roumanie</b>	1515	2,5%	1,2%
<b>Pologne</b>	1287	2,1%	0,3%
<b>Pays-Bas</b>	1192	2,0%	1,4%
<b>Royaume-Uni</b>	831	1,4%	0,0%
<b>Turquie</b>	763	1,3%	3,3%
<b>Etats-Unis</b>	582	1,0%	0,0%
<b>Suisse</b>	531	0,9%	1,4%
<b>Emirats Arabes Unis</b>	514	0,8%	1,8%
<b>Bulgarie</b>	490	0,8%	1,6%

\*Taux de positivité au niveau national d'importantes variations peuvent cependant être observées au niveau régional.

### 3.17. LIGNE DE TEMPS: CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 ET REPONSE À L'ÉPIDÉMIE EN BELGIQUE



\*Self Assessment Tool (formulaire d'autoévaluation)

Note 1: La stratégie de test en place au 22 juin 2020 était la suivante: toute personne répondant à la définition d'un cas possible de COVID-19 ainsi que les contacts à haut risque d'un cas de COVID-19 devaient être testés. Comme la capacité de test était suffisante toute personne hospitalisée ainsi que tout nouveau résident d'une collectivité résidentielle étaient également testés.

Note 2: Jusqu'au 30 septembre 2020 les mesures fédérales ont été élaborées par le gouvernement fédéral S. Wilmès. Depuis le 1er octobre 2020 elles sont élaborées par le gouvernement fédéral A. De Croo.

Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Cette ligne de temps présente en parallèle le nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés en Belgique et les principales mesures mises en œuvre au niveau national après la première vague c'est-à-dire à partir du 22 juin 2020. Depuis cette date la circulation du virus a connu des phases ascendantes et descendantes nous décrivons par conséquent tant l'assouplissement que le resserrement des mesures ainsi que l'évolution de la stratégie de testing.

La figure montre les **mesures** prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire par le Conseil national de sécurité (jusqu'au 30 septembre 2020) et puis par le Comité de concertation composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays et présidé par le premier ministre. Les mesures ont pour objectif de limiter la circulation du virus dans la population afin de réduire au maximum la mortalité liée à la maladie ainsi que d'éviter une surcharge hospitalière et un ralentissement des services de soins usuels. Notez que l'effet potentiel des mesures et notamment du confinement n'est pas immédiat.

Il est important de souligner que des différences géographiques ont été observées dans l'évolution de l'épidémie pendant la deuxième vague. Par conséquent des mesures spécifiques ont été prises à différents moments au niveau régional provincial ou communautaire mais celles-ci ne sont pas présentées dans cette figure.

La figure montre également les **stratégies de test** mises en œuvre pendant la période décrite. Ces stratégies sont adaptées au cours du temps en fonction de l'évolution de l'épidémie de l'organisation des soins de santé en Belgique et des ressources disponibles à un moment donné. Les stratégies de test sont élaborées sur base d'avis d'experts et en étroite collaboration avec les autorités compétentes en matière de prévention de soins de santé de contrôle des maladies infectieuses et de gestion du risque (RAG/RMG).

Il est important de souligner que le nombre de cas diagnostiqués dépend de la stratégie de test.

Cette ligne de temps a uniquement une visée descriptive et n'a pas pour objet d'estimer l'impact des différentes interventions.


## 4. Modélisation

### 4.1. TAUX DE REPRODUCTION ( $R_t$ )

Le  $R_t$  est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si  $R_t$  a une valeur  $> 1$  et diminuer si  $R_t$  est  $< 1$ . Les valeurs de  $R_t$  présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

#### 4.1.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le  $R_t$  estimé à partir des nouvelles hospitalisations est présenté ci-dessous sous forme de graphique et en tableau. Quand les chiffres à partir desquels le  $R_t$  est estimé diminuent l'intervalle de confiance s'élargit et il devient plus difficile de présenter une estimation stable. Le  $R_t$  doit donc toujours être interprété en complément d'autres indicateurs de propagation et de transmission de la maladie.



Estimated from: — Observed hospital intakes

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
$R_t$ (14/05/21 au 20/05/21)	0 880	0 823-0 940

#### 4.1.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique par province pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.


	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
<b>Belgique</b>	<b>0.867</b>	<b>0.853</b>	<b>0.881</b>
Antwerpen	0.880	0.846	0.915
Brabant wallon	0.943	0.871	1.019
Hainaut	0.877	0.841	0.914
Liège	0.897	0.852	0.943
Limburg	0.799	0.752	0.847
Luxembourg	0.869	0.789	0.954
Namur	0.794	0.737	0.853
Oost-Vlaanderen	0.871	0.830	0.913
Vlaams-Brabant	0.867	0.815	0.920
West-Vlaanderen	0.821	0.777	0.865
Région bruxelloise	0.934	0.889	0.980
Deutschsprachige Gemeinschaft	0.647	0.517	0.791

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du  $R_t$  basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas ce qui est le cas pour le  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part un avantage du  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

## 4.2. MODÈLE DE PRÉDICTION À COURT TERME POUR LES NOUVELLES HOSPITALISATIONS

Les prédictions ci-dessous sont basées sur deux modèles différents réalisés par l'Université d'Hasselt (GAM) et Sciensano (INLA). Ces modèles utilisent différents indicateurs tels que par exemple le nombre de cas confirmés l'absentéisme ou la mobilité pour prédire le nombre de nouvelles hospitalisations de cas confirmés de COVID-19 pour les 14 prochains jours. Ces modèles utilisent des indicateurs multiples et différents les prévisions qui en résultent peuvent donc varier. Plus de détails sur les modèles ainsi que des analyses supplémentaires sont disponibles sur le [site epistat](#).

Dans la figure ci-dessous la ligne noire montre le nombre de nouvelles hospitalisations observé et les lignes pointillées colorées indiquent les prévisions de chaque modèle. L'intervalle de confiance de chaque modèle est indiqué dans la couleur correspondante.




Une note explicative sur les modèles de prédiction utilisés ci-dessus est disponible via [ce lien](#).

### 4.3. MODÈLE DE PRÉDICTION DU TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN SOINS INTENSIFS

La figure ci-dessous montre l'occupation des lits en soins intensifs. L'occupation des lits observée est indiquée par la ligne pointillée. Les prévisions (ligne pleine) et leur intervalle de confiance (zone vert clair) sont présentés jusqu'aux 14 jours à venir.

Le modèle utilise toutes les données disponibles jusqu'au moment présent et fournit la meilleure approximation possible sur base de toutes les valeurs observées. En conséquence les valeurs de prédiction pour une période passée peuvent toujours évoluer.

Le nombre de lits de soins intensifs disponibles en phases 1 et 2 (voir section 3.4) sont indiqués par les lignes horizontales correspondantes (Phase 1 ligne grise; phase 2 ligne rouge).



Les prévisions et leur intervalle de confiance à 95% pour le nombre de lits en soins intensifs occupés sont présentés ci-dessous pour les 14 jours à venir. Un éventuel dépassement de la capacité de l'USI est présenté en rouge.

Date	Valeur observée	Valeur prédite	2 5% IC	97 5% IC
2021-05-19	590	523	353	698
2021-05-20	562	505	322	764
2021-05-21		507	341	716
2021-05-22		505	319	694
2021-05-23		491	313	691
2021-05-27		437	271	633

## 5. Situation épidémiologique internationale et Européenne

### 5.1. SITUATION INTERNATIONALE

31/12/19 - 20/05/21	Cases	Deaths	Proportion deaths/cases	5 most affected countries (cases)
<b>Worldwide</b>	<b>163 737 969</b>	<b>3 384 744</b>	<b>2,1%</b>	
America	65 431 924	1 595 323	2,4%	United States Of America Brazil Argentina Colombia Mexico
Europe	52 677 025	1 110 086	2,1%	France Turkey Russia United Kingdom Italy
Asia	40 859 830	551 576	1,3%	India Iran Indonesia Philippines Iraq
Africa	4 695 132	126 394	2,7%	South Africa Morocco Tunisia Ethiopia Egypt
Oceania	74 058	1 365	1,8%	Australia French Polynesia Papua New Guinea Guam New Zealand


Source: ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>)

## 5.2. SITUATION EUROPÉENNE (EU/EEA ET UK) SOURCE ECDC SITUATION


**ECDC disclaimer:** National updates are published at different times and in different time zones. This and the time ECDC needs to process these data may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Note: ECDC switched to a weekly reporting schedule for the COVID-19 situation worldwide and in the EU/EEA and the UK on 17 December 2020. Hence all daily updates have been discontinued from 14 December 2020. ECDC will publish updates on the number of cases and deaths reported worldwide and aggregated by week every Thursday.

Distribution of cumulative confirmed cases per 100 000 inhabitants (03/05/21 - 16/05/21)



Le graphique ci-dessous présente l'évolution de l'incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants pour les pays desquels les voyageurs ayant rempli un PLF arrivent majoritairement en Belgique. Ce graphique a uniquement une visée descriptive de la situation épidémiologique basée sur cet indicateur et n'a pas pour objet de faire une comparaison entre pays. Il doit être interprété avec prudence car l'incidence cumulée sur 14 jours peut être influencée par différents facteurs tels que la stratégie de testing et les mesures en place dans les différents pays.



Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 2 weeks (03/05/21-16/05/21)	Incidence/100 000 for the last 2 weeks (03/05/21-16/05/21)
Sweden	1 045 017	14 348	59 629	577
Lithuania	266 063	4 112	15 726	563
Cyprus	71 064	346	4 634	522
Netherlands	1 598 924	17 435	84 094	483
Latvia	127 978	2 266	8 228	431
Croatia	350 506	7 738	14 984	369
Slovenia	249 424	4 652	7 541	360
France	5 877 787	107 645	225 540	335
Estonia	127 206	1 222	4 263	321
Belgium	1 033 349	24 727	35 584	309
Greece	377 090	11 415	30 668	286
Luxembourg	69 028	806	1 631	260
Denmark	267 339	2 503	13 666	235
Germany	3 598 846	86 160	172 864	208
Italy	4 159 122	124 156	114 360	192
Czechia	1 653 099	29 913	18 480	173
Austria	633 074	10 213	14 728	165
Slovakia	770 349	12 238	8 977	164
Spain	3 615 860	79 432	75 430	159
Hungary	798 573	29 213	14 462	148
Poland	2 855 190	71 675	49 434	130
Bulgaria	414 192	17 259	8 998	129
Liechtenstein	2 992	58	44	114
Norway	119 257	774	5 789	108
Ireland	254 870	4 941	5 032	101
Romania	1 072 291	29 571	13 954	72
Finland	90 249	929	2 904	53
Portugal	842 381	17 009	4 924	48
United Kingdom	4 450 777	127 679	30 576	45
Malta	30 484	417	130	25
Iceland	6 548	29	65	18

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

## 6. Annexes

### 6.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	19/4-25/4	26/4-2/5	3/5-9/5	10/5-16/5
<b>Indicateurs d'intensité</b>				
Moyenne journalière de nouveaux cas <sup>(a)</sup>	3 491	2 967	2 996	2 088
Temps de doublement <sup>(b)</sup>	2007	30	501	13
Taux de reproduction <sup>(c)</sup>	0,973	0,925	0,999	0,814
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	2 697	2 877	3 205	2 543
Taux de positivité <sup>(a)</sup>	8,8%	7,2%	6,4%	5,8%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	425	393	363	310
<b>Indicateurs de sévérité</b>				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 <sup>(a)</sup>	229	193	163	138
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	13,92	11,75	9,91	8,41
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 <sup>(e)</sup>	2 883	2 648	2 172	1 802
Nombre de patients COVID-19 en USI <sup>(e)</sup>	886	825	702	619
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 <sup>(f)</sup>	44%	41%	35%	31%
Moyenne journalière de décès COVID-19	40	37	37	21
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos <sup>(a)</sup>	3	2	3	2
<b>Indicateur de vaccination</b>				
Moyenne journalière de vaccins administrés <sup>(a)</sup>	60 247	63 892	103 927	85 450
Couverture vaccinale pour la Belgique <sup>(g)</sup>	8,1%	8,4%	9,3%	11,8%

<sup>(a)</sup> Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(b)</sup> Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert) au contraire indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

<sup>(c)</sup> Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(d)</sup> Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(e)</sup> Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(f)</sup> Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

<sup>(g)</sup> Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

## 6.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 13 AVRIL 2021 ET LE 20 MAI 2021 PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
13/04/21	4 282	
14/04/21	3 909	
15/04/21	3 803	25 103 cas au cours de cette période de 7 jours
16/04/21	4 027	Soit 3 586,1 cas en moyenne par jour
17/04/21	2 330	Soit une incidence sur une semaine de 218,4/100 000 habitants
18/04/21	1 303	
19/04/21	5 449	
20/04/21	4 456	
21/04/21	4 076	
22/04/21	3 797	23 243 cas au cours de cette période de 7 jours
23/04/21	3 630	Soit 3 320,4 cas en moyenne par jour
24/04/21	1 889	Soit une incidence sur une semaine de 202,2/100 000 habitants
25/04/21	1 137	
26/04/21	4 258	
27/04/21	3 763	
28/04/21	3 451	
29/04/21	3 357	20 838 cas au cours de cette période de 7 jours
30/04/21	3 472	Soit 2 976,9 cas en moyenne par jour
01/05/21	1 336	Soit une incidence sur une semaine de 181,3/100 000 habitants
02/05/21	1 134	
03/05/21	4 325	
04/05/21	3 652	
05/05/21	3 633	
06/05/21	3 490	20 002 cas au cours de cette période de 7 jours
07/05/21	3 304	Soit 2 857,4 cas en moyenne par jour
08/05/21	1 703	Soit une incidence sur une semaine de 174,0/100 000 habitants
09/05/21	866	
10/05/21	3 354	Soit -25,9% de diminution entre les deux périodes
11/05/21	2 988	Soit une incidence sur une période 14 jours de 303,0 nouveaux cas/100 000 habitants
12/05/21	2 785	
13/05/21	927	14 825 cas au cours de cette période de 7 jours
14/05/21	2 554	Soit 2 117,9 cas en moyenne par jour
15/05/21	1 263	Soit une incidence sur une semaine de 129,0/100 000 habitants
16/05/21	743	
17/05/21	3 565	
18/05/21	3 157	
19/05/21	1 536	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
20/05/21	1	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

### 6.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 13 AVRIL 2021 ET LE 20 MAI 2021 PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
13/04/21	53 463	
14/04/21	43 985	
15/04/21	41 776	
16/04/21	44 095	283 909 tests au cours de la semaine soit 40 558/jour
17/04/21	36 317	
18/04/21	19 986	
19/04/21	44 287	
20/04/21	57 673	
21/04/21	49 569	
22/04/21	47 528	
23/04/21	51 315	313 840 tests au cours de la semaine soit 44 834/jour
24/04/21	38 751	
25/04/21	20 846	
26/04/21	48 158	
27/04/21	58 672	
28/04/21	54 323	
29/04/21	54 434	
30/04/21	56 849	332 533 tests au cours de la semaine soit 47 505/jour
01/05/21	37 194	
02/05/21	20 971	
03/05/21	50 090	
04/05/21	65 595	
05/05/21	60 078	
06/05/21	63 399	
07/05/21	63 445	363 869 tests au cours de la semaine soit 51 981/jour
08/05/21	43 237	
09/05/21	22 496	
10/05/21	45 619	
11/05/21	64 871	
12/05/21	56 359	
13/05/21	29 656	
14/05/21	40 296	287 608 tests au cours de la semaine soit 41 087/jour
15/05/21	35 770	
16/05/21	19 706	
17/05/21	40 950	
18/05/21	72 215	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
19/05/21	62 461	
20/05/21	1 654	

## 6.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 16 AVRIL 2021 ET LE 20 MAI 2021 PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
16/04/21	249		260	3 015	923	19
17/04/21	245		327	2 910	923	15
18/04/21	201	1683 nouvelles hospitalisations Soit 240,4/jour en moyenne	96	3 000	931	13
19/04/21	210		62	3 140	946	22
20/04/21	303		333	3 103	926	29
21/04/21	244		293	3 078	935	20
22/04/21	231		280	2 989	910	23
23/04/21	222		275	2 943	901	19
24/04/21	228		325	2 846	886	31
25/04/21	162	1415 nouvelles hospitalisations Soit 202,1/jour en moyenne	122	2 883	886	22
26/04/21	156		65	2 951	892	33
27/04/21	231		342	2 858	892	31
28/04/21	210		249	2 809	886	24
29/04/21	206		247	2 776	863	24
30/04/21	191		235	2 707	855	20
01/05/21	195		278	2 593	824	33
02/05/21	161	1200 nouvelles hospitalisations Soit 171,4/jour en moyenne	98	2 648	825	18
03/05/21	153		58	2 760	830	29
04/05/21	191		291	2 605	794	37
05/05/21	164		253	2 481	757	19
06/05/21	145		220	2 402	744	21
07/05/21	163		217	2 307	727	28
08/05/21	164		274	2 167	707	22
09/05/21	159	1078 nouvelles hospitalisations Soit 154,0/jour en moyenne	89	2 172	702	24
10/05/21	134		48	2 253	710	23
11/05/21	166		275	2 108	686	30
12/05/21	148		217	2 025	657	23
13/05/21	144		235	1 912	644	23
14/05/21	102		91	1 917	643	25
15/05/21	168		242	1 804	621	25
16/05/21	105	867 nouvelles hospitalisations Soit 123,9/jour en moyenne	92	1 802	619	27
17/05/21	99		45	1 857	613	24
18/05/21	131		222	1 753	595	18
19/05/21	141		174	1 702	589	20
20/05/21	121		167	1 642	562	21

## 6.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 13 AVRIL 2021 ET LE 20 MAI 2021 PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
13/04/21	37	
14/04/21	39	
15/04/21	42	
16/04/21	45	277 décès au cours de la semaine soit 39,6/jour
17/04/21	30	
18/04/21	34	
19/04/21	50	
20/04/21	36	
21/04/21	36	
22/04/21	43	
23/04/21	42	275 décès au cours de la semaine soit 39,3/jour
24/04/21	35	
25/04/21	39	
26/04/21	44	
27/04/21	26	
28/04/21	49	
29/04/21	46	
30/04/21	33	259 décès au cours de la semaine soit 37,0/jour
01/05/21	28	
02/05/21	34	
03/05/21	43	
04/05/21	40	
05/05/21	38	
06/05/21	38	
07/05/21	26	244 décès au cours de la semaine soit 34,9/jour
08/05/21	42	
09/05/21	32	
10/05/21	28	
11/05/21	17	
12/05/21	19	
13/05/21	21	
14/05/21	20	139 décès au cours de la semaine soit 19,9/jour
15/05/21	22	
16/05/21	17	
17/05/21	23	
18/05/21	17	
19/05/21	23	
20/05/21	4	

## 7. Prévention et information

### 1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire.  
Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous  
régulièrement  
les mains



Portez  
un masque



Gardez  
1,5 m de distance



Limitez-vous  
à 1 contact  
rapproché



Pensez  
aux personnes  
vulnérables



Travaillez à  
domicile



Aérez  
les espaces  
intérieurs



Pratiquez vos activités  
de préférence  
à l'extérieur



Vous pouvez consulter  
tous les détails sur  
[www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be)

Une initiative des autorités belges.