

COVID-19

BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE

(1 OCTOBRE 2021)

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour du mardi au samedi (et pour les données de vaccination, du lundi au vendredi).

TABLE DES MATIÈRES

1. Points clés	2
2. Indicateurs clés - tendances	3
2.1. Tendances.....	4
2.2. Situation récente.....	5
2.3. Stratégie de gestion de l'épidémie et projections	6
3. Description de l'épidémie à partir du 15/02/21	7
3.1. Distribution et évolution des cas de COVID-19	7
3.2. Tests COVID-19	8
3.3. Suivi des contacts.....	15
3.4. Surveillance moléculaire du SARS-CoV-2.....	20
3.5. Vaccination	23
3.6. Hospitalisations pour COVID-19.....	31
3.7. Taux d'occupation des lits en USI	35
3.8. Évolution de la mortalité COVID-19.....	36
3.9. Surveillance de la mortalité (toutes causes confondues).....	39
3.10. Surveillance en maison de repos et de soins	42
3.11. Situation COVID-19 pour les enfants.....	46
3.12. Investigation des clusters: rapport du 20/09/21 - 26/09/21	47
3.13. Surveillance par des médecins généralistes	53
3.14. Mobilité en Belgique et par province.....	56
3.15. Données issues des Passenger Locator Forms (PLF)	58
3.16. Ligne de temps: cas confirmés de COVID-19 et réponse à l'épidémie en Belgique.....	61
4. Modélisation	63
4.1. Taux de reproduction (R_t).....	63
4.2. Modèle de prédiction à court terme pour les nouvelles hospitalisations	65
4.3. Modèle de prédiction du taux d'occupation des lits en soins intensifs.....	66
5. Situation épidémiologique internationale et Européenne	67
5.1. Situation internationale	67
5.2. Situation Européenne (EU/EEA et UK), source ECDC situation.....	68
6. Annexes	70
6.1. Résumé des indicateurs clés.....	70
6.2. Nombre de personnes diagnostiquées (PCR et antigène) entre le 24 août 2021 et le 30 septembre 2021, présenté par jour et moyenne par semaine	71
6.3. Nombre de tests réalisés entre le 24 août 2021 et le 30 septembre 2021, présenté par jour et moyenne par semaine.....	72
6.4. Nombre de personnes hospitalisées entre le 27 août 2021 et le 30 septembre 2021, présenté par jour et moyenne par semaine	73
6.5. Nombre de personnes décédées entre le 24 août 2021 et le 30 septembre 2021, présenté par jour et moyenne par semaine	74
7. Prévention et information	75

1. Points clés

- **Situation générale:** L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas pour la Belgique est de 240/100 000 habitants, l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 3/100 000 habitants.
- **Nombre de nouveaux cas:** Au niveau national, le nombre de nouveaux cas est resté relativement stable sur la période du 21 au 28 septembre par rapport à la période précédente de 7 jours. Le Rt, basé sur le nombre de cas diagnostiqués pour cette même période, a légèrement diminué et est inférieur à 1 (0,956).
- **Tests et taux de positivité :** Le nombre de tests effectués est resté stable au cours de la période du 21 au 28 septembre. Le taux de positivité pour la Belgique pour cette même période reste également stable à 4,5 %.
- **Hospitalisations :** Le nombre de nouvelles hospitalisations et de lits occupés en soins intensifs en Belgique, au cours de la période du 24 au 30 septembre est resté stable par rapport à la période précédente de 7 jours (respectivement -2 % et -2 %).
- **Mortalité :** La mortalité liée au COVID-19 a augmenté cette dernière semaine (+40 %). Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l'hôpital. La proportion de décès de résidents de maison de repos reste faible cette semaine.
- **Vaccination :** D'après les données enregistrées dans Vaccinnet+ en date du 29 septembre, la couverture vaccinale pour au moins une dose pour la population belge est de 74,5 % et la couverture vaccinale complète est de 72,9 %. Au 29 septembre 2021, 71,3 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin. Le risque d'infection au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021 a été réduit de 73,1 % chez les personnes totalement immunisées par rapport aux personnes non vaccinées.
- **Surveillance moléculaire :** Dans le cadre de la surveillance de base, 412 échantillons ont été séquencés au cours de la période du 13 au 26 septembre. Le variant B.1.617.2 (Delta) représente 100 % des échantillons séquencés.
- **Indications de prescriptions de tests :** Les tests effectués pour lesquels un formulaire électronique est disponible sont principalement prescrits pour les cas possibles COVID-19 et les contacts à haut risque. Le taux de positivité par indication de tests semble augmenter pour les cas possibles de COVID-19 et les contacts à haut risque mais semble se stabiliser pour les personnes au retour de voyage et les voyageurs au départ. - Voir [section 3.2.2](#).
- **Surveillance par des médecins généralistes :** Le nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a légèrement augmenté au cours de la semaine 38 et est à 87 contacts pour 100 000 habitants par jour. - Voir [section 3.13](#).
- **Clusters :** Malgré que le nombre de nouveaux clusters a légèrement diminué durant la semaine 38, le nombre de clusters actifs continue d'augmenter par rapport à la semaine précédente (2 531 comparé à 2 112). Les clusters signalés proviennent principalement du secteur de l'éducation (54,6 %) ainsi que des lieux de travail (21,9 %). - Voir [section 3.12](#).

2. Indicateurs clés - tendances

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 6](#) de ce bulletin.

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 244 954	2 062	1 890*	-8%
Admis à l'hôpital	79 653***	55,4	54,3**	-2%
Décédés****	25 602	6,1	8,6*	+40%
<i>En hôpital</i>	<i>15 849</i>	<i>5,9</i>	<i>8,3</i>	<i>+41%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 572</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0%</i>

*Du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Jedi 23 septembre 2021	Jedi 30 septembre 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	691	713	+3%
Nombre de lits USI occupés	216	212	-2%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

2.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


2.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 14/09/21 et le 27/09/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 14/09/21 et le 27/09/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 267 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	14/09/21- 20/09/21	21/09/21- 27/09/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
Belgique	14 435	13 228	-1 207	-8%	56	240
Antwerpen	1 601	1 435	-166	-10%	44	162
Brabant wallon	558	605	47	+8%	60	285
Hainaut	1 219	1 253	34	+3%	176	184
Liège	2 844	2 490	-354	-12%	37	481
Limburg	644	463	-181	-28%	15	126
Luxembourg	401	337	-64	-16%	28	256
Namur	529	578	49	+9%	55	223
Oost-Vlaanderen	1 155	936	-219	-19%	23	137
Vlaams-Brabant	1 341	1 358	17	+1%	385	232
West-Vlaanderen	655	593	-62	-9%	49	104
Région bruxelloise	3 186	2 884	-302	-9%	49	498
Deutschsprachige Gemeinschaft	142	202	60	+42%	14	440

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

2.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE ET PROJECTIONS

Il a été demandé au Risk Assessment Group (RAG) de proposer des niveaux d'alarme qui visent à soutenir une prise de décision politique, au niveau local ou national, quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les seuils sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique en souligne le besoin. La décision concernant les mesures à prendre reste toujours une décision politique, qui prend en compte l'analyse et l'avis du RAG, mais également d'autres éléments considérés utiles. Les niveaux d'alarme ne sont donc pas à considérer comme un outil mécanistique ou déterministe, mais comme un outil d'aide à la prise de décision politique.

Cinq niveaux d'alarme ont été déterminés pour permettre aux différents intervenants de coordonner leurs actions. En fonction du niveau d'alarme, les mesures sont prises soit au niveau local soit au niveau national. Les indicateurs et les seuils utilisés pour la gestion du risque ont été déterminés par le RAG et sont publiés dans [l'avis du RAG du 8 juillet 2021](#).

Chaque semaine, le mercredi, le RAG détermine le niveau d'alarme, au niveau national et provincial, sur base d'une évaluation de la situation épidémiologique qui tient compte, entre autre, des indicateurs suivants: l'incidence des infections sur 14 jours, la valeur Rt basée sur le nombre de cas, le taux de positivité, le nombre de nouvelles hospitalisations, la proportion de lits en soins intensifs (USI) occupés par des patients confirmés COVID-19, le temps de doublement ou de réduction de moitié du nombre d'infections et d'hospitalisations. D'autres indicateurs plus spécifiques comme la charge de travail des médecins généralistes ou encore la couverture vaccinale peuvent également être analysés si nécessaire.

Selon [la dernière évaluation épidémiologique du RAG](#), la Belgique est au **niveau d'alarme 2** avec une tendance stable des nouvelles infections et des hospitalisations.


3. Description de l'épidémie à partir du 15/02/21

Nous présentons les données à partir de la semaine du 15 février 2021, semaine qui marque le début de la troisième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#).

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021, 13 228 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 13 228 nouveaux cas, 4 785 (36%) étaient rapportés en Flandre, 5 263 (40%) en Wallonie, dont 202 cas pour la communauté germanophone, et 2 884 (22%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 296 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par semaine (date de diagnostic*) à partir du 15/02/21



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 30 septembre 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Les dénominateurs utilisés pour calculer l'incidence sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

3.2. TESTS COVID-19

3.2.1. Tests COVID-19 effectués et taux de positivité par province et par tranche d'âge

Au cours de la période du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021, 327 190 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 46 741 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 4,5%.

Tests diagnostiques et taux de positivité, par semaine à partir du 15/02/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène (effectués par les laboratoires et les pharmacies) et PCR (effectués par les laboratoires cliniques et les laboratoires de la plateforme fédérale) sont représentés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	22 211	1 774	2 043	9,2%
10-19	56 110	4 270	2 921	5,2%
20-39	103 208	3 559	4 374	4,2%
40-64	92 555	2 419	3 994	4,3%
65+	44 434	1 993	1 405	3,2%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 8672 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 15 février 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 15/02/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	327 190	2 840	14 845	4,5%
Antwerpen	47 771	2 547	1 549	3,2%
Brabant wallon	13 068	3 208	650	5,0%
Hainaut	31 072	2 309	1 366	4,4%
Liège	36 138	3 258	2 812	7,8%
Limburg	20 657	2 346	574	2,8%
Luxembourg	7 921	2 743	375	4,7%
Namur	12 875	2 590	630	4,9%
Oost-Vlaanderen	33 925	2 215	1 053	3,1%
Vlaams-Brabant	33 279	2 864	1 475	4,4%
West-Vlaanderen	28 156	2 340	698	2,5%
Région bruxelloise	51 602	4 230	3 332	6,5%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 527	1 954	213	13,9%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 21/09/21 et le 27/09/21



Taux de positivité par province entre le 21/09/21 et le 27/09/21




3.2.2. Tests rapides antigéniques COVID-19 effectués et rapportés par les pharmaciens

Depuis mi-juillet 2021, les pharmaciens ont la possibilité d'effectuer des tests antigéniques rapides pour les citoyens de plus de 6 ans ne présentant pas de symptômes de COVID-19 et ayant besoin d'un certificat COVID-19 pour un voyage ou un événement. Les pharmaciens participent de façon volontaire et rapportent les résultats des tests effectués à Sciensano. Ceci permet la création d'un certificat de test si le test s'avère négatif et le déclenchement du suivi des contacts et autres mesures si le test s'avère positif. Les données rapportées par les pharmaciens sont présentées ci-dessous.

Au cours de la période du 20/09/21 au 26/09/21 (semaine 38), 27 536 tests ont été effectués par les pharmaciens. Le taux de positivité pour la même période est de 0,7%.

Tests effectués et rapportés par les pharmacies et taux de positivité, par région et par semaine à partir du 01/07/21



3.2.3. Indications des prescriptions de tests COVID-19

Les indications des prescriptions de test COVID-19 proviennent, d'une part, des formulaires électroniques utilisés par les médecins généralistes, les médecins en collectivité et à l'hôpital pour une demande de test (consultation avec prescription), et d'autre part, des codes de prescription de test (code CTPC) qui permettent à certaines catégories de personnes asymptomatiques (contacts à haut risque avec un cas COVID-19 confirmé, voyageurs de retour de zone rouge) de réaliser un test sans consultation préalable.


Les données des prescriptions des médecins généralistes et des médecins à l'hôpital sont disponibles depuis le 1er septembre 2020. Les données des prescriptions des médecins en collectivité et des prescriptions sans consultation sont disponibles depuis le 10 décembre 2020.

Ces données sur les prescriptions ne sont cependant pas disponibles pour toutes les demandes de test COVID-19 (par exemple, en milieu hospitalier, des formulaires supplémentaires ne sont pas systématiquement remplis pour toutes les analyses).

Sur la dernière semaine, du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021, 610 256 tests ont été réalisés, dont 66,9% ont pu être reliés à une prescription correspondante (combinaison des formulaires électroniques et des codes CTPC).

La figure ci-dessous montre la distribution des indications de tests depuis le 15 février 2021 (moyenne mobile sur 7 jours).

Distribution des indications de test pour les prescriptions disponibles, pour la période du 15/02/21 au 27/09/21




Attention, la stratégie de test peut varier (tests nécessaires ou non pour certaines catégories, nécessité d'un formulaire électronique ou non). Ces changements de stratégie se reflètent dans les graphes montrés.


Les figures ci-dessous montrent le taux de positivité pour chaque indication de test, et le taux de positivité pour les patients symptomatiques ou asymptomatiques.

Le taux de positivité n'est présenté ci-dessous que si le nombre de tests effectués pour chaque catégorie représente plus de 0,5 % du nombre total de tests.

Évolution du taux de positivité par indication de test pour les prescriptions disponibles, pour la période du 15/02/21 au 27/09/21



Taux de positivité en fonction de la présence ou non de symptômes pour les prescriptions disponibles, en pourcentage, pour la période du 15/02/21 au 27/09/21




3.2.4. Délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'appel du contact center

La figure ci-dessous donne un aperçu de la performance du processus de testing en Belgique. Elle montre l'évolution du délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'appel téléphonique du contact center (CC) au patient. Ce délai est subdivisé en cinq composantes: de l'apparition des symptômes à la consultation (vert foncé), de la consultation au prélèvement (vert), du prélèvement au résultat du test (vert clair), du résultat du test au ticket¹ envoyé au CC (jaune) et de l'appel du CC au patient (orange). La date de référence sur l'axe des abscisses est la date du résultat du test, et si non disponible, la date de l'envoi du ticket au CC.

Le délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin représente la part la plus importante du délai total. Viennent ensuite le temps écoulé entre le prélèvement et le résultat du test et le temps écoulé entre le moment où le ticket est envoyé au CC et le moment où le CC téléphone au patient. Les délais entre la consultation et le prélèvement et entre la disponibilité du résultat et la création d'un ticket au CC sont par contre beaucoup plus courts.

Des variations quotidiennes sont observées, elles sont essentiellement dues aux week-ends et aux jours fériés. Il convient également de souligner que certains de ces délais moyens sont calculés sur base d'un faible nombre d'observations.

Evolution du délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'appel du CC au patient à partir du 15/02/21, subdivisé en 5 composantes



¹ la dénomination "ticket" fait référence au message d'activation envoyé au CC pour chaque résultat positif reçu.


3.3. SUIVI DES CONTACTS

3.3.1. « Whereabouts » des cas confirmés COVID-19

L'objectif du suivi des contacts est d'identifier rapidement les contacts à risque et d'empêcher ainsi la propagation du virus. Pour plus d'informations sur le processus de suivi des contacts, cliquez [ici](#). Lors du contact téléphonique, il est demandé aux cas index de renseigner leurs contacts pendant la période de contagiosité. Une distinction est faite entre les personnes ayant eu un contact étroit (contact à haut risque) et celles ayant eu un contact superficiel (contact à faible risque).

Le graphe ci-dessous montre le nombre de cas confirmés par jour (en vert foncé) et le nombre de ces cas à contacter par le contact center (en vert). Depuis le 15 février 2021, 416 982 cas COVID-19 confirmés ont été contactés, parmi ceux-ci 82,8 % ont renseigné des contacts. Pour la période du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021, 28,6 %* des cas COVID-19 confirmés ont été contactés avec succès dont 86,8 % ont renseigné des contacts à risque.

Suivi des cas index COVID-19, à partir du 15/02/21




***Suite à un problème dans le flux des données, il y a des données manquantes pour le nombre de cas de COVID-19 contactés par le contact center. Ces données seront ajustées prochainement.**

La collecte d'informations supplémentaires nous renseigne davantage sur les modes de transmission possibles. Ces questions complémentaires sont posées uniquement aux cas confirmés COVID-19 contactés par le contact center. Ces informations ne concernent pas les contacts à haut risque.

La figure ci-dessous montre les lieux signalés par les cas confirmés COVID-19 au contact center comme lieux possibles de transmission. Environ 43,3 % des cas confirmés COVID-19 contactés ont indiqué ne pas savoir où ils avaient contracté l'infection. Malgré l'observation de légères variations de semaine en semaine, les lieux possibles de transmission les plus fréquemment signalés pour la période du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021, sont au domicile (23,52 %), lors d'une activité pour adolescents (12,36 %), en voyage (5,13 %) et en famille et chez des amis (4,99 %).


Il est important de noter que certains endroits sont complètement (rouge) ou partiellement (orange) fermés suite aux mesures actuellement en vigueur. La catégorie "activités pour enfants" comprend les activités scolaires et extrascolaires destinées aux enfants de moins de 12 ans. La catégorie "activités pour adolescents" comprend, les activités scolaires et extrascolaires destinées aux enfants de plus de 12 ans.

Possibles lieux de transmission pour les cas contactés du 20/09/21 au 26/09/21



La figure ci-dessous montre la proportion de cas confirmés COVID-19 pouvant identifier un autre cas confirmé COVID- 19 comme source d'infection. Pour 58,8 % des cas, aucune source exacte n'a été rapportée. En cas d'identification de la source d'infection pour la période du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021, cela est principalement expliqué par un cohabitant (22,39 %), un camarade de classe (7,28 %), un membre de la famille non cohabitant (3,43 %), ou un ami (1,92 %).


Possibles sources d'infection pour les cas contactés du 20/09/21 au 26/09/21



3.3.2. Caractéristiques des contacts à haut risque contactés

Les informations récoltées par le contact center nous permettent également de décrire le suivi des contacts à haut risque rapportés par un cas COVID-19 confirmé.

Le graphe ci-dessous indique, par jour, le nombre de contacts à haut risque identifiés (en vert foncé) et le nombre de contacts à haut risque contactés avec succès par le contact center (en vert). La ligne vert clair indique les contacts à haut risque ayant été testés. Le nombre de contacts à haut risque ayant été testé dépend de la stratégie de testing. Les contacts à haut risque doivent être testés deux fois, une première fois dans les 72 heures suivant le dernier contact à haut risque et la deuxième fois au plus tôt le 7^e jour suivant le dernier contact à haut risque.



*Pour un contact à haut risque contacté, la période de rapportage de tests liés au contact court de 1 jour avant et jusqu'à 20 jours après contact avec le contact center.

Parmi les contacts à haut risque rapportés (9 975 personnes) pour la période du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021, 8 608 contacts ont été contactés par le contact center (86,3 %).

Parmi ces contacts à haut risque contactés, 7 507 ont effectué un premier test (87,2 %) dont 992 étaient positifs. Ceci représente un taux de positivité pour le premier test de 13,2 %.

Parmi les contacts ayant présenté un premier test négatif (6 509 personnes), 4 505 ont effectué un deuxième test (69,2 %). Parmi ces contacts ayant effectué un deuxième test 386 étaient positifs. Ceci représente un taux de positivité pour le deuxième test de 8,6 %.

Par ailleurs, parmi ces contacts à haut risque contactés, 2 004 n'ont effectué qu'un seul test de dépistage (23,3 %) et 1 101 n'ont pas effectué de test (12,8 %).

Sur base du nombre de contacts testés, le taux de positivité global des contacts à haut risque pour cette période est de 18,4 %. Ce taux de positivité global comprend tous les contacts positifs parmi tous les contacts testés.

Sur base de l'ensemble des tests effectués pour la période du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021, le tableau ci-dessous montre les taux de positivité pour le premier test et pour le deuxième test. Avec l'information rapportée par le cas index, une différence est faite pour les contacts à haut risque cohabitant ou non avec le cas confirmé de COVID-19.

	Taux de positivité 1 ^{er} test	Taux de positivité 2 ^{ième} test
Contacts à haut risque	13,2%	8,6%
Contacts à haut risque cohabitant du cas COVID-19 confirmé	18,6%	12,3%
Contacts à haut risque NON cohabitant du cas COVID-19 confirmé	7,0%	4,7%

3.4. SURVEILLANCE MOLÉCULAIRE DU SARS-COV-2

Source: Healthdata.be

Une surveillance moléculaire est nécessaire pour établir la diversité génétique des virus SARS-CoV-2 circulant en Belgique et pour analyser l'évolution de cette diversité dans le temps. Cette surveillance peut se faire par analyse PCR ciblées sur des régions spécifiques du génome qui présentent un intérêt particulier, ou par séquençage du génome complet du virus (Whole Genome Sequencing – WGS) pour avoir une certitude du type de variant.

En décembre 2020, les laboratoires qui séquent les échantillons SARS-CoV-2 depuis plusieurs mois se sont regroupés au sein d'une *plateforme de séquençage*, celle-ci comprend maintenant une quinzaine de laboratoires.

La *plateforme de séquençage* effectue une surveillance dite « de base », c'est-à-dire une analyse génétique approfondie d'un certain nombre d'échantillons positifs en PCR représentatifs de l'ensemble de la population. Actuellement environ 10% des échantillons positifs sont séquencés dans le cadre de la surveillance de base. La *plateforme de séquençage* effectue également une surveillance « active », c'est-à-dire que des analyses génétiques poussées sont effectuées dans certains contextes (certains voyageurs de retours de zones rouges, une sélection de foyers épidémiques, certains cas de réinfection/infection après vaccination...)

Cette surveillance moléculaire a ainsi permis d'identifier et de suivre des variants émergents du virus SARS-CoV-2 sur notre territoire, dont ceux dits « de préoccupation » (variant of concern - VOC), notamment le variant B.1.1.7 (20/501Y.V1), identifié pour la première fois en Angleterre, le variant B.1.351 (20H/501Y.V2), identifié en Afrique du Sud, le variant P.1 (20J/501Y.V3) identifié au Brésil et le variant B.1.617.2 identifié en Inde.

Le 31 mai 2021, l'OMS a renommé les variants dit « de préoccupation » (VOCs), les noms suivants sont maintenant utilisés: Alpha pour le variant B.1.1.7, Beta pour B.1.351, Gamma pour P.1 et Delta pour B.1.617.2.


Ces différents variants ont la particularité de présenter des mutations-clés au sein du gène S (gène encodant la protéine virale « Spike » qui interagit avec le récepteur de la cellule hôte). Des analyses PCR ciblées sur ces régions sont développées par les laboratoires de la plateforme fédérale de tests pour permettre une identification présumptive plus rapide de ces variants. Ces analyses constituent un proxy permettant une identification plus rapide et plus facile de la proportion et de l'évolution des variants d'intérêt. Cependant, la certitude de diagnostic de variant ne peut être obtenue que par séquençage du génome complet (WGS).

Les résultats de la surveillance moléculaire de base sont présentés ici.

3.4.1. Surveillance par séquençage complet du génome (plateforme de séquençage)

La figure ci-dessous montre l'évolution des VOC principaux circulant en Belgique identifiés par un séquençage génomique complet (WGS) à partir des échantillons analysés dans le cadre de la surveillance de base. La catégorie « Non-VOC » désigne toute souche qui n'est pas l'un des variants de préoccupation principaux (B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) ou B.1.617.2 (Delta)).

Evolution des variants identifiés dans la surveillance de base en Belgique depuis la semaine 1 2021



*Les données des deux dernières semaines doivent encore être consolidées.

Le tableau ci-dessous indique le nombre des variants VOC identifiés par un séquençage génomique complet (WGS) à partir des échantillons analysés dans le cadre de la surveillance de base pour les 10 dernières semaines (19/07/21-26/09/21).

Pour la période 13 septembre 2021 au 26 septembre 2021, les données préliminaires montrent que le variant B.1.617.2 (Delta) représentait 100 % des échantillons séquencés dans la surveillance dite de base.

Source: plateforme de séquençage, Healthdata.be

Note: Les données des deux dernières semaines doivent encore être consolidées. De plus des données additionnelles peuvent également être ajoutées de façon rétrospective aux semaines précédentes.

Semaine d'échantillonnage	SURVEILLANCE DE BASE								
	Nombre d'échantillons séquencés	B.1.1.7 (Alpha)		B.1.351 (Beta)		P.1 (Gamma)		B.1.617.2 (Delta)	
		n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)	n	% (nb total séquencés)
19/7-25/7 (w29)	1,035	27	2,6%	4	0,4%	2	0,2%	994	96,0%
26/7-1/8 (w30)	809	18	2,2%	1	0,1%	9	1,1%	781	96,5%
2/8-8/8 (w31)	907	4	0,4%	0	0,0%	2	0,2%	898	99,0%
9/8-15/8 (w32)	806	2	0,2%	0	0,0%	1	0,1%	802	99,5%
16/8-22/8 (w33)	622	2	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	619	99,5%
23/8-29/8 (w34)	441	1	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	433	98,2%
30/8-5/9 (w35)	470	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	469	99,8%
6/9-12/9 (w36)	489	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	487	99,6%
13/9-19/9 (w37)	261	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	261	100,0%
20/9-25/9 (w38)	151	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	151	100,0%


3.5. VACCINATION

3.5.1. Utilisation et couverture vaccinale

Le 28 décembre 2020, la phase pilote de la campagne de vaccination COVID-19, limitée à un nombre restreint de centres de soins résidentiels, a débuté en Belgique. Le 5 janvier 2021, [la campagne de vaccination](#) officielle a démarré. La campagne de vaccination a été déployée en [phases séquentielles](#) ciblant des groupes prioritaires, avant un élargissement à l'ensemble de la population de 18 ans et plus.

Toutes les doses de vaccins COVID-19 administrées en Belgique sont, tel que défini par la loi, enregistrées dans [Vaccinnet+](#), le registre national des vaccins COVID-19. Seules les vaccinations enregistrées dans cette base de données sont incluses dans les chiffres et les analyses ci-dessous. Toutefois, un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible². La répartition géographique indiquée dans ce rapport est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du site de vaccination.

Au 29 septembre 2021, un total de 16 601 880 doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+ en Belgique. Cela correspond à une augmentation de 85 722 doses par rapport au nombre enregistré au 22 septembre 2021. Quatre vaccins différents sont actuellement utilisés : Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), Spikevax® (Moderna), Vaxzevria® (AstraZeneca) et COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). La figure ci-dessous représente l'évolution du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose par marque de vaccin.



² Sur l'ensemble des vaccinations enregistrées jusqu'au 29 septembre 2021, 95,03 % ont été enregistrées dans les 3 jours suivant la date d'administration du vaccin.

Le tableau ci-dessous présente le nombre et la couverture vaccinale pour les personnes ayant reçu **au moins une dose de vaccin**, le 29 septembre 2021, pour la Belgique, par entité fédérée et par groupe d'âge.

Groupes d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie	Communauté germanophone
Population totale	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose	8 581 248	667 169	5 339 481	2 467 137	50 471
	Couverture vaccinale au moins 1 dose ⁽¹⁾ (%)	74,48%	54,69%	80,26%	69,11%	64,59%
12 à 15 ans	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose	364 583	17 567	247 632	96 740	1 566
	Couverture vaccinale au moins 1 dose ⁽¹⁾ (%)	68,35%	30,41%	82,73%	55,92%	46,39%
16 à 17 ans	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose	196 694	11 091	123 042	60 641	1 098
	Couverture vaccinale au moins 1 dose ⁽¹⁾ (%)	77,56%	41,53%	87,51%	71,67%	64,74%
18 ans et plus	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose	7 963 732	636 149	4 927 782	2 297 278	47 575
	Couverture vaccinale au moins 1 dose ⁽¹⁾ (%)	86,48%	67,36%	91,88%	80,93%	75,47%
65 ans et plus	Nombre de personnes vaccinées avec au moins 1 dose	2 072 798	130 481	1 320 170	603 981	13 665
	Couverture vaccinale au moins 1 dose ⁽¹⁾ (%)	92,99%	82,05%	95,90%	89,09%	87,82%


(1)Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

Le tableau ci-dessous indique le nombre et la couverture vaccinale pour les personnes **entièrement vaccinées**, le 29 septembre 2021, pour la Belgique, par entité fédérée et par groupe d'âge.

Groupes d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie	Communauté germanophone
Population totale	Nombre de personnes entièrement vaccinées	8 403 843	634 026	5 261 021	2 409 556	49 245
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽¹⁾ (%)	72,94%	51,97%	79,08%	67,49%	63,02%
12 à 15 ans	Nombre de personnes entièrement vaccinées	338 021	12 997	234 159	88 754	1 385
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽¹⁾ (%)	63,37%	22,50%	78,23%	51,31%	41,02%
16 à 17 ans	Nombre de personnes entièrement vaccinées	185 854	8 888	118 023	57 285	1 031
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽¹⁾ (%)	73,28%	33,28%	83,94%	67,70%	60,79%
18 ans et plus	Nombre de personnes entièrement vaccinées	7 832 289	610 650	4 873 458	2 252 992	46 645
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽¹⁾ (%)	85,05%	64,66%	90,87%	79,37%	74,00%
65 ans et plus	Nombre de personnes entièrement vaccinées	2 051 291	128 452	1 309 489	596 108	13 445
	Couverture vaccinale entièrement vacciné ⁽¹⁾ (%)	92,02%	80,77%	95,13%	87,92%	86,40%


(1)Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

La figure ci-dessous représente les couvertures vaccinales par statut vaccinal, genre et groupe d'âge dans l'ensemble de la population.




Le 29 septembre 2021, la couverture vaccinale pour les femmes âgées de 18 ans et plus ayant, reçu au moins une dose de vaccin était de 86,83 % et de 85,4 % pour celles entièrement vaccinées. La couverture vaccinale pour les hommes âgés de 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose de vaccin était de 86,1% et de 84,68 % pour ceux entièrement vaccinés.


La figure ci-dessous présente l'évolution de la couverture vaccinale pour les personnes ayant reçu **au moins une dose** de vaccin pour la population belge de 18 ans et plus, pour la Belgique, par entité fédérée et par date d'administration.



La figure ci-dessous indique la couverture vaccinale pour les personnes **entièrement vaccinées** pour la population belge de 18 ans et plus, pour la Belgique, par entité fédérée et par date d'administration.



Les figures ci-dessous indiquent la couverture vaccinale pour les personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin et pour celles entièrement vaccinées, pour la population belge de 18 ans et plus, par province.



La répartition par âge de la population peut différer d'une province à l'autre. La stratégie de vaccination par phases ciblant progressivement différents groupes spécifiques de la population (âge, profession, présence de comorbidités,...) peut donc impacter différemment les couvertures vaccinales des provinces.

Pour plus d'informations sur la méthode de surveillance du nombre de vaccins administrés et de calcul des couvertures vaccinales, veuillez consulter [le document questions fréquemment posées](#).


3.5.2. Infections de percée

Les personnes complètement vaccinées depuis au moins 14 jours sont considérées comme entièrement immunisées. Sciensano suit de près l'apparition des infections chez ces personnes, appelées « infections de percée », grâce au croisement entre les bases de données Vaccinnet+ et des tests de laboratoire COVID-19.

Le 26 septembre 2021, sur un total de 8 263 845 personnes totalement immunisées, 0,48 % (39 518) ont été testées positives au COVID-19. A noter que les personnes ayant été testées positives dans les 90 jours précédant l'infection de « percée » (infections antérieures) ne sont pas comptabilisées. Les informations sur les symptômes rapportés au moment de l'appel pour le contact tracing montrent que 36,86% (11 884/32 237) ne présentaient pas de symptômes compatibles avec la COVID-19.

Le premier graphique ci-dessous montre l'évolution de l'incidence sur 7 jours pour le nombre de cas COVID-19 parmi la population non-vaccinée (vert clair) et parmi la population totalement immunisée (vert foncé), à partir du 15 février 2021. Au 26 septembre 2021, cette incidence s'élevait à 210,40 cas pour 100 000 personnes non-vaccinées contre 56,65 cas pour 100 000 personnes totalement immunisées. Le risque d'infection (symptomatique et asymptomatique) au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021 a été réduit de 73,07 % chez les personnes totalement immunisées par rapport aux personnes non vaccinées.

Le nombre absolu de personnes dans chacun de ces groupes évolue au cours du temps : le nombre de personnes entièrement immunisées augmente alors que la population non-vaccinée diminue. Ceci a un impact dans le calcul de l'incidence et explique le pic d'incidence observé au début de la campagne de vaccination dans la population entièrement immunisée. Pour cette raison, l'évolution du nombre absolu de cas confirmés COVID-19 (moyenne mobile sur 7 jours) est également présentée dans le deuxième graphique ci-dessous. A noter que les personnes partiellement vaccinées ou n'ayant pas encore atteint les 14 jours après leur schéma de vaccination complet ne sont pas incluses dans ces graphiques.




Source : croisement des données Vaccinnet+ et des tests de laboratoire COVID-19

La surveillance clinique des patients COVID-19 hospitalisés recueille des données individuelles de ces patients permettant un croisement avec les données Vaccinnet+ et la détermination de leur statut vaccinal. Cependant, ces données sont obtenues avec un certain délai (1 à 3 semaines). De plus, la participation à la surveillance clinique étant volontaire, seule une proportion des hospitalisations COVID-19 déclarées de manière exhaustive dans la surveillance de la capacité hospitalière (obligatoire) y sont encodées. Le statut vaccinal ne peut donc être déterminé que pour une partie des patients COVID-19 hospitalisés en Belgique.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution du nombre total et du pourcentage de patients hospitalisés en raison de symptômes COVID-19, selon leur statut vaccinal. Les patients hospitalisés diagnostiqués positifs au COVID-19 au cours d'un dépistage systématique (en absence de symptômes COVID-19) ne sont pas inclus dans cette figure.

Durant la semaine du 30 août au 5 septembre, date de la dernière consolidation des données de la surveillance clinique hospitalière, sur un total de 440 patients hospitalisés pour la COVID-19, 19 (4,32%) étaient entièrement immunisés, 3 (0,68%) étaient partiellement immunisés et 58 (13,18%) étaient non immunisés. La proportion de patients hospitalisés dont le statut vaccinal n'était pas connu était de 81,82%.

Nombre et proportion des patients COVID-19 hospitalisés Selon leur statut vaccinal, par semaine



Source : croisement des données Vaccinnet+ et de la surveillance clinique hospitalière. La surveillance de la capacité hospitalière est utilisée pour déterminer le nombre et le pourcentage de patients COVID-19 hospitalisés non rapportés dans la surveillance clinique hospitalière (statut vaccinal inconnu). Pour plus d'informations sur la surveillance des patients COVID-19 hospitalisés, consultez le point 5.1 du [document questions fréquemment posées](#)).

*Non immunisé: patient non vacciné ou n'ayant pas encore atteint 14 jours après la 1^e dose d'un vaccin COVID-19 à 2 doses. Partiellement immunisé: patient ayant reçu une 1/2 doses de vaccin depuis au moins 14 jours ou n'ayant pas encore atteint 14 jours après une vaccination complète (1/1 ou 2/2 doses). Entièrement immunisé (cas de percée): patient entièrement vacciné depuis 14 jours ou plus.


La hausse de la proportion de patients hospitalisés au statut vaccinal inconnu est liée à un chute de la participation des hôpitaux belges à la surveillance clinique hospitalière. Cette participation insuffisante ne nous permet plus de réaliser des extrapolations nationales correctes. Dans l'attente d'une meilleure représentativité des données, la publication de l'incidence du nombre d'hospitalisations COVID-19 selon le statut vaccinal est interrompue.

3.6. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


3.6.1. Situation dans les hôpitaux

Au cours de la période du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2021, 380 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 409 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital, par semaine




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital, par semaine



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 30 septembre 2021, 713 lits d'hôpital dont 212 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 119 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 28 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 22 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a diminué de 4 unités.

Evolution du nombre d'hospitalisés, par semaine



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (30 septembre 2021)

Sévérité des cas hospitalisés, par semaine



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


3.6.2. Provenance des patients hospitalisés pour COVID-19

Le nombre de nouvelles hospitalisations que nous rapportons comprend uniquement les patients présentant une infection COVID-19 confirmée et admis en raison de celle-ci. Les patients admis en raison d'une pathologie différente mais ayant un test positif au COVID-19 sont exclus. Les admissions hospitalières de patients avec une infection COVID-19 confirmée sont classées dans le graphe ci-dessous en fonction de la provenance des patients. Cela nous permet d'avoir une vue sur le nombre de nouveaux patients COVID-19 venant d'une maison de repos ou d'une autre institution de soins de longue durée.

Sur les 380 admissions rapportées pour la période du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2021, 373 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 8 (sur les 373) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

La figure ci-dessous indique l'évolution du nombre de nouvelles hospitalisations COVID-19 pour l'ensemble des patients et pour les résidents de MR/MRS, ainsi que le pourcentage de résidents de MR/MRS parmi les patients hospitalisés. L'évolution de ce pourcentage, ainsi que la tendance à la baisse du nombre absolu d'admissions de résidents de MR/MRS, pourraient constituer un indicateur de l'impact positif de la vaccination. Néanmoins, d'autres facteurs (par exemple, une augmentation des hospitalisations dans la population générale) peuvent également expliquer une diminution de la proportion des résidents de MR/MRS parmi les personnes hospitalisées, comme cela a été observé précédemment.

Évolution des hospitalisations et de la proportion de résidents de MR/MRS admis, Belgique



3.6.3. Caractéristiques des patients hospitalisés


La surveillance clinique des patients COVID-19 hospitalisés permet de suivre l'évolution des caractéristiques des patients admis dans les hôpitaux. Ces données sont représentatives des patients au niveau national. Cependant la surveillance clinique n'est pas exhaustive, et concerne environ 60 % à 70 % des patients hospitalisés. Les résultats sont donc présentés en pourcentages et non en nombres (ceux-ci donneraient une sous-estimation du nombre total de patients).

Il est également important de noter qu'entre juin 2020 (semaine 24) et septembre 2020 (semaine 39), le nombre total d'admissions hospitalières par semaine en Belgique était très faible, à savoir 70 à 140 admissions par semaine. Par conséquent, les chiffres utilisés pour le calcul des pourcentages ci-dessous sont très petits, ce qui explique les importantes fluctuations observées.

Sexe: Depuis le début de l'épidémie, 47,1% des patients hospitalisés sont des femmes, 52,9% des hommes.

Age: Les figures ci-dessous montrent l'évolution de la répartition par âge des patients COVID-19 admis à l'hôpital par semaine.


Évolution par semaine de la répartition par âge des patients admis à l'hôpital, jusqu'à la semaine 36 (06/09/21-12/09/21)



Note: les données des quatre dernières semaines sont susceptibles d'évoluer à cause de données disponibles de façon rétrospective.


Problèmes de santé préexistants: La figure ci-dessous montre la proportion de patients COVID-19 admis à l'hôpital par semaine qui ne présentent aucun, un ou plusieurs problèmes de santé préexistants.

Evolution par semaine de la proportion de patients présentant ou non des problèmes de santé préexistants, jusqu'à la semaine 36 (06/09/21-12/09/21)



Parmi tous les patients hospitalisés pour COVID-19 depuis le début de l'épidémie, 31,7% avaient une maladie cardiovasculaire, 22,7% le diabète, 14,7% une maladie pulmonaire chronique, 12,6% de l'obésité, 13,2% une maladie rénale chronique et 9,5% un cancer solide. Il est important de garder à l'esprit qu'une même personne peut avoir plusieurs problèmes de santé préexistants.

Évolution par mois des problèmes de santé préexistants des patients hospitalisés COVID-19



3.7. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 30 septembre 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.

	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	212	11%
Antwerpen	301	34	11%
Brabant wallon	23	3	13%
Hainaut	259	18	7%
Liège	230	33	14%
Limburg	145	8	6%
Luxembourg	43	5	12%
Namur	97	8	8%
Oost-Vlaanderen	265	21	8%
Vlaams-Brabant	139	11	8%
West-Vlaanderen	221	11	5%
Région bruxelloise	269	60	22%


*Nombre total de lits USI accrédités en novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

3.8. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


3.8.1. Mortalité par région

Pour la période du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021, 60 décès ont été rapportés; 18 en Flandre, 31 en Wallonie et 11 à Bruxelles. Les décès sont présentés par semaine, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et par semaine




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (21/09/21-27/09/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et par semaine




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et par semaine



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par semaine et par région des personnes de plus de 65 ans résidant ou non en maison de repos



Total des décès rapportés **du 21 septembre 2021 au 27 septembre 2021**

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	18	100%	11	100%	29	94%	58	97%
<i>Cas confirmés</i>	14	78%	11	100%	26	90%	51	88%
<i>Cas possibles</i>	4	22%	0	0%	3	10%	7	12%
Maison de repos	0	0%	0	0%	2	6%	2	3%
<i>Cas confirmés</i>	0	N/A	0	N/A	2	100%	2	100%
<i>Cas possibles</i>	0	N/A	0	N/A	0	0%	0	0%
Autres collectivités résidentielles	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Domicile et autre	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	18	100%	11	100%	31	100%	60	100%

*Les décès à l'hôpital incluent les résidents de maison de repos et maison de repos et de soin qui décèdent à l'hôpital. Des analyses complémentaires concernant les décès des résidents de maison de repos sont présentés dans le chapitre ci-dessous sur les maisons de repos.

Total cumulé des décès rapportés **du 15 février 2021 au 27 septembre 2021**

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	1 494	90%	617	99%	1 372	95%	3 483	94%
<i>Cas confirmés</i>	1 461	98%	612	99%	1 343	98%	3 416	98%
<i>Cas possibles</i>	33	2%	5	1%	29	2%	67	2%
Maison de repos	154	9%	6	1%	71	5%	231	6%
<i>Cas confirmés</i>	136	88%	6	100%	70	99%	212	92%
<i>Cas possibles</i>	18	12%	0	0%	1	1%	19	8%
Autres collectivités résidentielles	5	0%	0	0%	0	0%	5	0%
Domicile et autre	0	0%	2	0%	1	0%	3	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	1 653	100%	625	100%	1 444	100%	3 722	100%

*Les décès à l'hôpital incluent les résidents de maison de repos et maison de repos et de soin qui décèdent à l'hôpital. Des analyses complémentaires concernant les décès des résidents de maison de repos sont présentés dans le chapitre ci-dessous sur les maisons de repos.

Pour plus d'informations sur le lieu de décès, veuillez consulter le point 6 du document [questions fréquemment posées](#).

3.8.2. Mortalité par province

Le tableau ci-dessous indique la répartition des décès survenus du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021 ainsi que le taux de décès par 100 000 habitants, par province et pour la Région bruxelloise.

Provinces*	Nombre de décès	Taux de décès par 100 000 habitants
Antwerpen	3	0,16
Brabant wallon	1	0,25
Hainaut	10	0,74
Liège	12	1,08
Limburg	1	0,11
Luxembourg	0	0,00
Namur	3	0,61
Oost-Vlaanderen	6	0,39
Vlaams-Brabant	2	0,17
West-Vlaanderen	5	0,42
Région bruxelloise	10	0,82

*Quand la province de résidence n'est pas connue, la province où le décès a eu lieu a été utilisé

3.9. SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ (TOUTES CAUSES CONFONDUES)

3.9.1. Be-MOMO (Belgium Mortality Monitoring)

En Belgique, la surveillance de la mortalité (toutes causes confondues), Be-MOMO, est basée sur les données du Registre National. Il y a 2 semaines d'attente nécessaires pour obtenir une exhaustivité de plus de 95 %, les chiffres des dernières semaines sont donc préliminaires. Pour plus d'informations sur Be-MOMO : <https://epistat.wiv-isp.be/momo/>.

Plus d'information sur la surmortalité en 2020 dans le [communiqué de presse de Sciensano du 15 janvier 2021](#).


Plus d'information sur la surmortalité durant l'activation de la phase d'avertissement du plan chaleur en juin 2021 dans le [bulletin épidémiologique hebdomadaire du 23 juillet 2021](#).

Plus d'information sur la surmortalité durant la troisième vague de la COVID-19 dans le [bulletin épidémiologique hebdomadaire du 13 août 2021](#).

Suite à la surmortalité importante en 2020, le modèle calculant la mortalité attendue de Be-MOMO a été adapté le 14 juin 2021. Quelques périodes de surmortalité à partir de 2021 sont désormais observés. Vous trouverez plus de précisions concernant l'adaptation du modèle dans ce [document](#).

Il n'y a pas de surmortalité statistiquement significative observée en Belgique en semaine 36.

Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 19/09/21 (sur base des données collectées jusqu'au 25/09/21), Belgique




Comment lire ce graphique ? Quand le nombre de décès par jour dépasse les limites supérieures ou inférieures des décès prévus par la modélisation (lignes pointillées grises), il y a une surmortalité ou une sous-mortalité significative. La zone orange représente le nombre de décès lié au COVID-19 (cas confirmés et possibles, tous lieux de décès) qui a été soustrait au nombre de décès toutes causes confondues.


Nombre de décès toutes causes confondues par semaine (Belgique)

Semaine	Date du lundi	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus (Be-MOMO)	Nombre de décès supplémentaires	Nombre de jours avec surmortalité significative	Excès de mortalité (%)	Taux brut de mortalité (100 000 habitants)
2021-W33	16/08/2021	1 800	1 786	14	0	0,8	15,6
2021-W34	23/08/2021	1 810	1 795	15	0	0,8	15,7
2021-W35	30/08/2021	1 910	1 808	102	1	5,6	16,6
2021-W36	06/09/2021	1 961	1 825	136	0	7,5	17,0


Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 19/09/21 (sur base des données collectées jusqu'au 25/09/21), Wallonie



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 19/09/21 (sur base des données collectées jusqu'au 25/09/21), Bruxelles



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID 19 soustraite, jusqu'au 19/09/21 (sur base des données collectées jusqu'au 25/09/21), Flandre




La surmortalité durant l'épidémie de COVID-19

Vous trouverez un résumé de la surmortalité durant le printemps 2020 dans le [bulletin épidémiologique hebdomadaire du 19/06/2020](#).

3.9.2. EuroMOMO: surveillance de la mortalité (toutes causes confondues) en Europe

EuroMOMO publie un bulletin hebdomadaire sur la mortalité toutes causes confondues dans un maximum de 26 pays ou régions de pays européens. Le nombre de décès au cours des dernières semaines doit être interprété avec prudence car il y a un délai d'environ trois semaines pour obtenir des données significatives de surmortalité. Pour plus d'informations: <http://www.euromomo.eu/index.html>.

Mortalité toutes causes confondues pour 26 pays ou régions d'Europe, semaine 36 (du 06/09/21 au 12/09/21)




Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

3.10. SURVEILLANCE EN MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Afin de suivre la situation dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR/MRS), plusieurs indicateurs sont utilisés: le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas confirmés de COVID-19, l'incidence (nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19) par semaine parmi les résidents, l'incidence par semaine parmi les membres du personnel et le nombre de résidents en MR/MRS décédés d'une infection possible ou confirmée de COVID-19. Ces indicateurs sont basés sur les données rapportées par les MR/MRS dans le cadre de la surveillance COVID-19 pour les collectivités résidentielles. De plus amples informations sur cette surveillance et l'explication des graphiques ci-dessous se trouvent dans le [rapport sur la surveillance en MR/MRS](#).


Etant donné que le nombre de résidents parmi les MR/MRS participant à la surveillance est utilisé comme dénominateur, il est important de tenir compte du taux de participation. Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de MR/MRS qui ont envoyé des données au moins une fois par semaine. Le taux de participation pour la semaine du 22/09/21 au 28/09/21 (inclus), est de 70 % en Flandre, 63 % en Wallonie, 58 % à Bruxelles et 67 % en Communauté germanophone.

Pourcentage de MR/MRS ayant envoyé leurs données au moins une fois au cours de la semaine concernée (du mercredi au mardi), depuis 15/02/21




Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés par rapport au nombre de MR/MRS ayant participé ce jour-là, à partir du 15 février 2021.

Pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés (le mardi), depuis 15/02/21




Le graphique ci-dessous montre l'incidence des cas COVID-19 confirmés (nombre de nouveaux cas) parmi les membres du personnel, par semaine (du mercredi au mardi inclus), et par région/communauté. Cela signifie que le graphique reprend la somme du nombre de nouveaux cas confirmés une fois par semaine. Le dénominateur représente le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des MR/MRS ayant enregistré des données au moins une fois au cours de la semaine en question.

Incidence par semaine des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS belges pour 1 000 résidents, par région/communauté, depuis 15/02/21.



Le graphique ci-dessous montre l'incidence (le nombre de nouveaux cas) parmi les employés par semaine (du mercredi au mardi inclus) des cas COVID-19 confirmés dans les MR/MRS pour 1 000 employés, par région/communauté. Cela signifie que le graphique reprend la somme du nombre de nouveaux cas confirmés une fois par semaine. Le dénominateur représente le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des MR/MRS ayant enregistré des données au moins une fois au cours de la semaine en question.


Incidence par semaine des cas COVID-19 confirmés parmi le personnel des MR/MRS belges pour 1 000 employés, par région/communauté, depuis 15/02/2021.



Les décès COVID-19 sont généralement présentés par lieu de décès, de sorte que les résidents des maisons de repos qui meurent à l'hôpital sont généralement comptés dans les décès à l'hôpital. Nous présentons ici la répartition des décès COVID-19 parmi les résidents de MR/MRS qu'ils décèdent en maisons de repos ou à l'hôpital.

Entre 21 septembre 2021 et 27 septembre 2021, 8 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 2 en MR/MRS (0 en Flandre, 0 à Bruxelles, 2 en Wallonie), 6 à l'hôpital (3 en Flandre, 0 à Bruxelles, 3 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 (confirmés et probables) parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et par semaine



Nombre de décès COVID-19 (confirmés et probables) parmi les résidents des maisons de repos par lieux de décès et par région pour la période du 15/02/21 au 26/09/21


Lieu de décès	Flandres		Bruxelles		Wallonia		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	107	41	36	86	91	56	234	50
Maisons de repos	154	59	6	14	71	44	231	50
Domicile et autre	0	0	0	0	1	1	1	0
TOTAL	261	100	42	100	163	100	466	100

3.11. SITUATION COVID-19 POUR LES ENFANTS

À partir du 01 juillet 2021, et durant toute la période des vacances scolaires d'été, les données rapportées par la surveillance des écoles (services CLB, PSE et PMS-WBE) ne seront plus disponibles. Nous continuons néanmoins à présenter l'évolution de l'incidence pour les groupes d'âge scolaires, comparé à la population adulte ainsi que le nombre de tests effectués pour ces mêmes groupes cibles.


L'évolution du nombre de cas confirmés est calculée à partir des résultats de tests rapportés par les laboratoires. Le nombre de tests effectués (positifs et négatifs) permet d'interpréter l'évolution de l'incidence par tranche d'âge dans le contexte des changements de stratégie de testing. Les groupes d'âge utilisés pour l'analyse de l'incidence et du nombre de tests sont définis en fonction des niveaux scolaires (bien que les tranches d'âge ne correspondent pas parfaitement aux niveaux scolaires).

Incidence cumulée sur 14 jours, par tranche d'âge, par 100 000 habitants de la tranche d'âge, 15/02/2021 (semaine 7) au 26/09/21 (semaine 38), Belgique.



Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires.
Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires.

Nombre de tests effectués (moyenne glissante sur 7 jours) par tranche d'âge et pour 100 000 habitants de la tranche d'âge, 15/02/2021 (semaine 7) au 26/09/21 (semaine 38), Belgique.



Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires.
Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires. Du 15 février 2021 au 26 septembre 2021, un total de 4 881 376 PLF ont été collectés. Parmi ces PLF, 56,6 % provenaient de voyageurs venant de zones rouges et 18,0 % de voyageurs venant de zones oranges.

3.12. INVESTIGATION DES CLUSTERS: RAPPORT DU 20/09/21 - 26/09/21

3.12.1. Clusters communautaires et en collectivité structurelle rapportés par les régions

Cet aperçu des clusters rapportés par les régions pour la période du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021, comprend les clusters enregistrés sur le lieu de travail (entreprises privées et publiques), dans les collectivités (écoles, maisons de repos, collectivités pour personnes handicapées, collectivités médicales, centres d'accueil et d'hébergement) au sein des familles et dans la communauté.

Un cluster est défini dès la confirmation de **minimum 2 cas COVID-19** ayant un lien épidémiologique, dans une période définie (généralement 7 ou 14 jours, selon les situations). Ce lien peut être, entre autres, un contact physique ou à faible distance (< 1,5m) et prolongé (>15 min) entre eux.

Un **nouveau cluster** est un cluster nouvellement confirmé au cours de la semaine de rapportage. Un cluster reste actif pendant 14 jours après la notification du dernier cas du cluster (sauf fermeture exceptionnelle par les services régionaux de santé). Les **clusters actifs** rapportés dans la période de rapportage sont ceux qui ont été actifs pendant au moins un jour de la période de rapport, et incluent donc aussi bien les nouveaux clusters, les clusters encore ouverts et les clusters qui ont été fermés durant la période de rapportage. Ce rapportage se fait sur base de différentes sources des données et dépend de différents facteurs qui peuvent varier selon les régions.


Pour interpréter ces résultats, il est important de tenir compte de la méthode et de l'objectif avec lequel les données sont collectées. La surveillance des clusters a pour principal objectif de réduire la propagation du virus par l'identification et le contrôle de foyers, et se concentre donc sur les clusters pour lesquels une intervention est possible, c'est-à-dire, ayant un contexte clair où des mesures de contrôle et de prévention peuvent être mises en place. Cette surveillance est menée à plusieurs niveaux (communal, provincial ou régional) au sein des différentes régions et communautés. Il est donc possible que certains clusters soient gérés très localement et les données ne soient pas nécessairement transmises au niveau central. De plus, il existe des différences dans les méthodes de confirmation des clusters par région qui peuvent affecter les chiffres absolus.

Les données permettant l'investigation de clusters dans les trois régions et la communauté germanophone proviennent principalement de quatre sources: la déclaration systématique obligatoire par les institutions (centres de soins résidentiels, maisons de repos, autres institutions résidentielles et institutions de soins); la base de données de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) pour la détection et le suivi d'éventuels clusters dans les entreprises; les données du suivi de contacts (call center) et dans certains cas, les données des écoles.


Les clusters dans les écoles mentionnés ici ne concernent que ceux enregistrés par les services de prévention des maladies infectieuses. Ce relevé de clusters pourrait donc ne pas être complet car certains clusters dans les écoles, suivis par les services médicosociaux, ne sont pas repris dans ce rapport. Un système d'enregistrement spécifique des clusters dans les écoles de la communauté flamande a été mis en place récemment. Il permet le recoupement des données du Zorgatlas (VAZG) et des données du LARS « Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem » (qui est utilisé par le CLB pour enregistrer l'investigation et le suivi des contacts dans une école). Cette plateforme permet d'accéder à une cartographie plus complète des clusters ce qui se traduit par une augmentation soudaine du nombre de clusters enregistrés depuis la semaine 17.

Certaines autres sources ponctuelles peuvent également être utilisées par les régions pour ouvrir une investigation. Il s'agit essentiellement des clusters confirmés liés à des événements dans la population (clusters communautaires). Le faible nombre d'enregistrement de cette catégorie est notamment expliqué par la difficulté à identifier les liens épidémiologiques entre les individus dans une communauté. La probabilité qu'un cluster communautaire soit rapporté comme cluster confirmé est donc beaucoup plus faible que pour les collectivités structurées.

Nombre de nouveaux clusters rapportés par les régions au cours des semaines 7 (2021) à 38 (2021)




Nombre de clusters actifs rapportés par les régions au cours des semaines 7 (2021) à 38 (2021)




Au cours de la période du 20/09/21 au 26/09/21 2021, 568 nouveaux clusters (pour lesquels 1673 cas ont été identifiés) et 2531 clusters actifs sont rapportés – les clusters sont clôturés 14 jours après la notification du dernier cas, si aucun autre nouveau cas lié n’apparaît au cours de cette période.

Les clusters actifs les plus fréquemment signalés pour la semaine 38 sont éducation (54.6 %), les lieux de travail (21.9 %), des clusters communautaires (événement privé, Horeca, etc.) (6.5 %) et les maisons de repos (4.7 %).

Nouveaux clusters (n=568) rapportés par les régions, par type et par province, Belgique, semaine 38 (20/09/21 au 26/09/21)³



Clusters actifs rapportés (n= 2531) par les régions, par type, en Belgique, pour la semaine 38 (20/09/21 au 26/09/21)³




³ Note : l'enregistrement des clusters dans les entreprises pour la région de Flandre a été modifié. Des clusters plus petits sont également rapportés depuis la semaine 36 à cause de l'augmentation de l'utilisation et de la mise en relation de différentes sources de données. Notamment, ils sont rapportés lorsqu'il n'y a pas de confirmation par le médecin du travail, mais que les données indiquent une forte probabilité d'un cluster confirmé. Depuis la semaine 36, pour la région de Flandre, le rapport des clusters lié à des rassemblements est basé sur une analyse approfondie des données. Cela donne un aperçu plus complet des différents types des rassemblements. Cela peut expliquer l'augmentation du nombre de "clusters dans la communauté" rapporté.

3.12.2. Clusters familiaux pour la semaine du 20/09/21 au 26/09/21

Le tableau reprend les clusters familiaux détectés par la banque de données, rapportés soit par les régions, soit par Sciensano, sur base de critères semblables. Il s'agit d'une détection théorique de clusters. Sauf exception ou informations supplémentaires, tous les cas COVID-19 positifs sont contactés par le call center pour permettre le suivi des contacts mais sauf exception ou informations supplémentaires un cluster familial ne sera pas investigué par le service de surveillance des maladies infectieuses des différentes régions.

Nombre de clusters familiaux détectés sur base des données du contact tracing, par région, semaine 7 (2021) à 38 (2021)




3.12.3. Evolution du nombre de clusters possibles détectés en maison de repos et de soins (20/09/21-26/09/21)

En plus du programme de surveillance des cas COVID-19 au sein des MR/MRS, Sciensano a mis en place un système de surveillance et de détection précoce de clusters possibles au sein des MR/MRS sur base des notifications enregistrées pour les trois régions. Environ 64,5 % des MR/MRS participent actuellement au moins une fois par semaine à cette surveillance.

Un cluster possible est défini par au moins deux cas confirmés rapportés endéans une période de 7 jours. La figure ci-dessous présente les nouveaux clusters possibles détectés par semaine (du lundi au dimanche) et par région. Les clusters possibles actifs qui ont commencé la semaine précédente ne sont pas inclus dans cette figure.


Il convient de noter que ces clusters sont détectées sur base théorique, une enquête épidémiologique est nécessaire pour les confirmer. La détection des clusters peut se faire avec retard, car les MR/MRS doivent d'abord tester les résidents et recevoir le résultat avant de pouvoir signaler un cas confirmé.

Nombre de nouveaux clusters possibles par semaine, par région/communauté, 15/02/21-26/09/21



Tant que de nouveaux cas COVID-19 confirmés sont rapportés parmi les résidents au cours des deux dernières semaines, le cluster possible est considéré comme un cluster possible actif. La figure ci-dessous présente les clusters possibles actifs par semaine (du lundi au dimanche) et par région.

Nombre de clusters possibles actifs par semaine (du lundi au dimanche), par région/communauté, 15/02/21-26/09/21



3.13. SURVEILLANCE PAR DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

3.13.1. Surveillance des syndromes grippaux par le réseau des médecins vigies


Le réseau sentinelle des médecins généralistes enregistre en continu les consultations en médecine générale pour les syndromes grippaux et les infections aiguës des voies respiratoires. Etant donné que ces symptômes peuvent être causés par des pathogènes différents du virus de la grippe, des échantillons sont prélevés de façon aléatoire et sont analysés par le Centre national de référence de la grippe. Ces échantillons sont prélevés via un écouvillon nasal et sont testés pour le virus de la grippe mais également pour un certain nombre d'autres virus respiratoires (y compris, depuis mars 2020, pour le SARS-CoV-2). Le réseau compte environ 100 cabinets de médecins généralistes répartis dans toute la Belgique qui enregistrent les données sur base volontaire.

La figure ci-dessous montre le nombre de consultations par semaine pour syndromes grippaux et infections respiratoires aiguës pour 100 000 habitants, pour les 5 dernières saisons de grippe.

Au cours de la saison de grippe de 2019-2020, une dichotomie claire est observée, le premier pic étant expliqué par la grippe et le deuxième pic et ses ramifications par l'émergence du SARS-CoV-2. La ligne vert foncé décrit la période actuelle et montre que le nombre de consultations pour symptômes grippaux et infections respiratoires aiguës.

Au cours de la semaine du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021, l'incidence des consultations chez le médecin généraliste pour syndrome grippal a resté stable à 70 consultations pour 100 000 habitants par semaine (consultations téléphoniques incluses).


Symptômes de la grippe: Incidence des consultations chez le généraliste



Depuis le 18 mai 2020, la stratégie et l'organisation nationales de dépistage du COVID-19 ont temporairement empêché les médecins généralistes du réseau de surveillance d'utiliser un écouvillon pour la grippe. C'est pourquoi, depuis le 29 juin, une surveillance des résultats des tests a été mise en place chez les médecins du réseau vigie, afin de pouvoir continuer à suivre le pourcentage de COVID-19 chez les patients présentant des symptômes grippaux.

Au cours de la dernière semaine (20 septembre 2021 - 26 septembre 2021), 15.8 % des patients qui ont consulté leur médecin généraliste pour des symptômes grippaux avaient un test PCR positif pour SARS-CoV-2.

Symptômes de la grippe: Incidence des consultations chez le généraliste




L'intégralité du bulletin hebdomadaire infections respiratoires est accessible via [ce lien](#).

3.13.2. Enregistrement des patients avec suspicion de COVID-19 dans le baromètre des médecins généralistes

Le baromètre des médecins généralistes est actif depuis octobre 2020. Il a pour but de cartographier les diagnostics de symptômes similaires à ceux du COVID-19, à savoir un cas de COVID-19 possible ou confirmé, un syndrome viral, un syndrome grippal ou une autre infection respiratoire aiguë. Le total (par diagnostic) est calculé en fin de journée sur base des diagnostics codés dans les dossiers médicaux électroniques des médecins généralistes participants.

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution du nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19, présenté pour 100 000 habitants. L'évolution est d'abord montrée pour la Belgique dans son ensemble puis divisée par région, pour la Flandre, la Wallonie et la Région bruxelloise.



L'intégralité du bulletin hebdomadaire infections respiratoires est accessible via [ce lien](#).

3.14. MOBILITÉ EN BELGIQUE ET PAR PROVINCE

Données collectées jusqu'au 29 septembre 2021

3.14.1. Données récoltées par Google

Disclaimer: Google partage ses données agrégées de mobilité via [ce lien](#) dans le but de contribuer à la lutte contre l'épidémie COVID-19.


Les données Google sur la mobilité de la communauté donnent un aperçu de la mobilité dans une région ou un pays. Il s'agit de bases de données agrégées et anonymisées provenant des nombreux utilisateurs qui partagent leur localisation avec Google. Celles-ci n'incluent donc pas les données pour l'ensemble de la population.

Le graphe ci-dessous présente quatre indicateurs de mobilité fournis par Google pour analyser les tendances de déplacements dans le temps: résidentiel, lieux de travail, commerce & loisirs⁴ et stations de transport public.

Il est important de noter que pour la catégorie "Résidentiel" l'indicateur est mesuré par un changement dans la durée, c'est-à-dire le temps passé au domicile, tandis que pour les autres catégories, les indicateurs mesurent un changement du nombre de fréquentations des différents lieux.

Les pourcentages de mobilité sont comparés à une médiane de référence (valeur zéro). La valeur zéro pour chaque indicateur a été calculée sur base de la mobilité de cet indicateur pour la période du 3 janvier au 6 février 2020. Il s'agit de la période la plus récente où l'épidémie de COVID-19 n'avait pas encore commencé à se manifester dans la plupart des pays. La ligne horizontale de référence représente la valeur zéro pour chaque indicateur. Toutes les tendances de déplacements dans le temps et l'espace ont donc leur propre référence.

Evolution de la mobilité en Belgique, depuis le 15 février 2021, en fonction de la fréquentation de lieux définis et le temps passé au domicile par rapport à la période de référence définie (3 janvier au 6 février 2020)



⁴ des lieux comme les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, les parcs à thème, les musées, les bibliothèques et les cinémas

Le tableau ci-dessous donne une vision chiffrée de l'évolution des quatre indicateurs de mobilité au cours des dernières semaines. Il reprend les différences par semaine en comparaison avec la période de référence pré-pandémie définie plus haut (03 janvier au 06 février 2020) Les nombres donnés dans le tableau ci-dessous sont les différences entre le niveau de la période pré-pandémie et le pourcentage de mobilité observé lors des 8 dernières semaines. Plus cette différence est proche de zéro, plus la mobilité est proche de son niveau de janvier-février 2020.

Il est important de noter que chaque indicateur de mobilité fourni par Google a sa propre ligne de référence. Un changement dans l'évolution d'un indicateur de mobilité n'entraîne donc pas automatiquement un changement, ou le même degré de changement, dans l'évolution des autres indicateurs de mobilité.

Différence de la variation de mobilité (%) en comparaison à la période de référence pré-pandémie (03 janvier au 06 février 2020) en Belgique,. Les résultats sont donnés par semaine pour les 8 dernière semaines

Indicateur	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
Residence	6,43	6,29	4,57	5,00	4,29	2,14	2,14	1,86
Shopping & Horeca	4,71	4,43	5,71	4,14	9,86	11,43	6,86	5,14
Transports	-21,29	-20,57	-15,43	-16,86	-12,29	1,29	0,86	1,57
Lieu de travail	-31,71	-28,43	-27,00	-21,86	-19,00	-14,71	-14,71	-15,43

3.15. DONNÉES ISSUES DES PASSENGER LOCATOR FORMS (PLF)

Source: Dashboard Paloma (situation le 30 septembre 2021)

Le PLF est un formulaire en ligne qui doit être rempli par toute personne (belge ou non) lorsqu'elle entre ou voyage en Belgique depuis un autre pays, et ceci quel que soit le moyen de transport. Les pays/régions de provenance des voyageurs sont classés en trois zones différentes (zone rouge, zone orange et zone verte) en fonction du niveau de circulation du virus et donc du risque de transmission/contagion.


Différentes recommandations en terme de quarantaine et testing sont appliquées aux voyageurs arrivant en Belgique en fonction de la zone de provenance. Les zones (rouge, orange et verte) sont déterminées par le CELEVAL, le SPF Santé publique et le SPF Affaires étrangères, sur base d'indicateurs tels que par exemple l'incidence des pays sur les 14 derniers jours.

Etant donné que le classement d'un pays/région est déterminé par sa situation épidémiologique, celui-ci peut varier dans le temps. La stratégie de testing est en constante évolution. Les voyageurs revenant de zone rouge doivent être testés deux fois, une première fois dès le retour en Belgique et une deuxième fois au plus tôt le 7e jour après la date de retour en Belgique.

3.15.1. Nombre de passager locator forms à partir du 15 février 2021

Du 15 février 2021 au 26 septembre 2021, un total de 4 881 376 PLF ont été collectés. Parmi ces PLF, 56,6 % provenaient de voyageurs venant de zones rouges et 18,0 % de voyageurs venant de zones oranges.

Nombre de Passenger Locator forms (PLF) en fonction du risque COVID défini pour chaque zone géographique (15/02/21 - 26/09/21)



3.15.2. Arrivées de zone rouge et taux de positivité (20/09/21-26/09/21)

Le nombre d'individus provenant d'une zone à risque rouge et le taux de positivité pour la semaine du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021 est indiqué ci-dessous pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise.

Ces données ne concernent que les voyageurs ayant rempli un PLF.

Belgique/ Provinces/ Region	Nombre total d'arrivées	Arrivées d'une zone rouge			Tests		Taux de positivité	
		Nombre	% (nombre total d'arrivées)	Nombre total de personnes à tester ayant un NISS	Nombre de tests effectués		Test 1	Test 2
					Test 1	Test 2		
BELGIQUE	260 551	177 260		24 960	20 029	4 385	1,5%	1,0%
Antwerpen	40 653	29 755	11,4%	3 789	2 989	637	0,9%	0,5%
Brabant wallon	8 840	6 543	2,5%	1 021	809	183	0,7%	0,5%
Hainaut	15 381	10 482	4,0%	1 871	1 414	300	0,9%	1,0%
Liège	13 719	9 949	3,8%	1 642	1 194	247	1,5%	2,0%
Limburg	12 306	9 044	3,5%	1 024	862	215	1,3%	0,5%
Luxembourg	3 546	2 683	1,0%	219	143	30	1,4%	0,0%
Namur	6 081	4 509	1,7%	585	457	66	2,0%	1,5%
Oost-Vlaanderen	31 934	23 216	8,9%	2 935	2 449	532	0,9%	0,6%
Vlaams-Brabant	31 751	22 665	8,7%	3 037	2 487	567	1,4%	0,7%
West-Vlaanderen	24 652	18 107	6,9%	1 352	1 060	242	0,8%	0,4%
Région bruxelloise	51 279	38 779	14,9%	7 385	6 109	1 351	2,3%	1,5%
<i>Données sur la province manquantes</i>	20 409	1 528	0,6%	100	56	15	1,8%	0,0%


3.15.3. Provenance des voyageurs et taux de positivité (20/09/21-26/09/21)

Le tableau ci-dessous présente les quinze pays desquels les voyageurs, ayant rempli un PLF, arrivent majoritairement en Belgique, entre le 20 septembre 2021 et le 26 septembre 2021. Le taux de positivité associé est également montré.

Pays de provenance	Nombre d'arrivées	% (total du nombre d'arrivées)	Taux de positivité* test 1
Espagne	39 931	15,3%	1,1%
France	33 835	13,0%	1,5%
Italie	20 367	7,8%	1,8%
Grèce	17 761	6,8%	0,4%
Allemagne	14 428	5,5%	0,0%
Portugal	11 069	4,2%	0,0%
Pays-Bas	10 208	3,9%	2,2%
Royaume-Uni	7 265	2,8%	0,7%
Turquie	6 653	2,6%	1,6%
Maroc	5 667	2,2%	2,0%
Roumanie	4 288	1,6%	4,8%
Croatie	3 843	1,5%	0,0%
Autriche	3 519	1,4%	0,0%
Suisse	3 271	1,3%	0,0%
Danemark	2 522	1,0%	7,1%

*Taux de positivité au niveau national, d'importantes variations peuvent cependant être observées au niveau régional.

3.16. LIGNE DE TEMPS: CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 ET REPONSE À L'ÉPIDÉMIE EN BELGIQUE



*EU-DCC= European Digital COVID certificate (certificat de test, rétablissement et vaccination)

**La date exacte de début des phases de vaccination peut varier selon les régions, les dates indiquées sont celles de la région qui a implémenté en premier la phase de vaccination.

Cette ligne de temps présente en parallèle le nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés en Belgique et les principales mesures mises en œuvre au niveau national après la deuxième vague, c'est-à-dire à partir du 15 février 2021. Depuis cette date, la circulation du virus a connu des phases ascendantes et descendantes, nous décrivons par conséquent tant l'assouplissement que le resserrement des mesures ainsi que l'évolution de la stratégie de testing et de la campagne de vaccination.

La figure montre les **mesures** prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire par le Comité de concertation, composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays et présidé par le premier ministre. Les mesures de confinement ont pour objectif de limiter la circulation du virus dans la population afin de réduire au maximum la mortalité liée à la maladie ainsi que d'éviter une surcharge hospitalière et un ralentissement des services de soins usuels. Notez que l'effet potentiel des mesures, et notamment du confinement, n'est pas immédiat. Les mesures de déconfinement sont prise lorsque la circulation du virus diminue et que situation épidémiologique le permet.

Il est important de souligner que des différences géographiques ont été observées dans l'évolution de l'épidémie pendant la deuxième vague. Par conséquent, des mesures spécifiques ont été prises à différents moments au niveau régional, provincial ou communautaire, mais celles-ci ne sont pas présentées dans cette figure.

La figure montre également les **stratégies de test** mises en œuvre pendant la période décrite. Ces stratégies sont adaptées au cours du temps en fonction de l'évolution de l'épidémie, de l'organisation des soins de santé en Belgique et des ressources disponibles à un moment donné. Les stratégies de test sont élaborées sur base d'avis d'experts et en étroite collaboration avec les autorités compétentes en matière de prévention, de soins de santé, de contrôle des maladies infectieuses et de gestion du risque (RAG/RMG).

Il est important de souligner que le nombre de cas diagnostiqués dépend de la stratégie de test.

Finalement, cette figure permet également de visualiser les dates de début des différentes phases de la campagne de vaccination pour la population belge et de comprendre comment cette stratégie a été implémentée. Il est important de souligner que la stratégie de vaccination a officiellement débuté le 5 janvier 2021 mais uniquement pour certains groupes à risque ciblés, tels que les maisons de repos et les prestataires de soins de santé, pour ensuite s'étendre progressivement à l'ensemble de la population. En Belgique, quatre différents types de vaccins sont utilisés: Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), Spikevax® (Moderna), Vaxzevria® (AstraZeneca) et COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Une telle stratégie, en augmentant le nombre de personnes vaccinées, a pour but de diminuer le nombre de nouveaux cas confirmés.

Cette ligne de temps a uniquement une visée descriptive et n'a pas pour objet d'estimer l'impact des différentes interventions.


4. Modélisation

4.1. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

4.1.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le R_t estimé à partir des nouvelles hospitalisations est présenté ci-dessous sous forme de graphique et en tableau. Quand les chiffres à partir desquels le R_t est estimé diminuent, l'intervalle de confiance s'élargit et il devient plus difficile de présenter une estimation stable. Le R_t doit donc toujours être interprété en complément d'autres indicateurs de propagation et de transmission de la maladie.



Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (24/09/21 au 30/09/21)	1,018	0,919-1,124

4.1.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Belgique	0,956	0,940	0,973
Antwerpen	0,961	0,912	1,012
Brabant wallon	1,058	0,975	1,143
Hainaut	0,999	0,945	1,055
Liège	0,934	0,898	0,971
Limburg	0,809	0,737	0,884
Luxembourg	0,932	0,836	1,034
Namur	1,021	0,939	1,105
Oost-Vlaanderen	0,869	0,815	0,926
Vlaams-Brabant	1,025	0,971	1,080
West-Vlaanderen	0,939	0,865	1,016
Région bruxelloise	0,958	0,924	0,994
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,184	1,027	1,353

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

4.2. MODÈLE DE PRÉDICTION À COURT TERME POUR LES NOUVELLES HOSPITALISATIONS

Les prédictions ci-dessous sont basées sur un modèle réalisé par Sciensano (INLA). Ce modèle utilise différents indicateurs tels que, par exemple, le nombre de cas confirmés, l'absentéisme ou la mobilité, pour prédire le nombre de nouvelles hospitalisations de cas confirmés de COVID-19 pour les 14 prochains jours. Ce modèle utilise des indicateurs multiples et différents, les prévisions qui en résultent peuvent donc varier. Plus de détails sur les modèles ainsi que des analyses supplémentaires sont disponibles sur le [site epistat](#).

Dans la figure ci-dessous, la ligne noire montre le nombre de nouvelles hospitalisations observé et les lignes pointillées colorées indiquent les prévisions de chaque modèle. L'intervalle de confiance de chaque modèle est indiqué dans la couleur correspondante.




Une note explicative sur les modèles de prediction utilisés ci-dessus est disponible via [ce lien](#).

4.3. MODÈLE DE PRÉDICTION DU TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN SOINS INTENSIFS

La figure ci-dessous montre l'occupation des lits en soins intensifs. L'occupation des lits observée est indiquée par la ligne pointillée. Les prévisions (ligne pleine) et leur intervalle de confiance (zone vert clair) sont présentés jusqu'aux 14 jours à venir.

Le modèle utilise toutes les données disponibles jusqu'au moment présent et fournit la meilleure approximation possible sur base de toutes les valeurs observées. En conséquence, les valeurs de prédiction pour une période passée peuvent toujours évoluer.

Le nombre de lits de soins intensifs disponibles en phases 1 et 2 (voir section 3.4) sont indiqués par les lignes horizontales correspondantes (Phase 1 ligne grise; phase 2 ligne rouge).



Les prévisions et leur intervalle de confiance à 95% pour le nombre de lits en soins intensifs occupés sont présentés ci-dessous pour les 14 jours à venir. Un éventuel dépassement de la capacité de l'USI est présenté en rouge.

Date	Valeur observée	Valeur prédite	2,5% IC	97,5% IC
2021-09-29	217	178	122	239
2021-09-30	211	174	123	235
2021-10-01		180	127	248
2021-10-02		185	128	249
2021-10-03		183	129	252
2021-10-07		191	133	260

5. Situation épidémiologique internationale et Européenne

5.1. SITUATION INTERNATIONALE

31/12/19 - 30/09/21	Cases	Deaths	Proportion deaths/cases	5 most affected countries (cases)
Worldwide	232 355 216	4 749 863	2,0%	
America	89 562 546	2 203 816	2,5%	United States Of America Brazil Argentina Colombia Mexico
Europe	67 523 445	1 302 506	1,9%	United Kingdom Russia Turkey France Spain
Asia	66 883 277	1 034 271	1,5%	India Iran Indonesia Philippines Malaysia
Africa	8 147 835	206 290	2,5%	South Africa Morocco Tunisia Ethiopia Libya
Oceania	238 113	2 980	1,3%	Australia Fiji French Polynesia Papua New Guinea Guam


Source: ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>)

5.2. SITUATION EUROPÉENNE (EU/EEA ET UK), SOURCE ECDC SITUATION


ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Note: ECDC switched to a weekly reporting schedule for the COVID-19 situation worldwide and in the EU/EEA and the UK on 17 December 2020. Hence, all daily updates have been discontinued from 14 December 2020. ECDC will publish updates on the number of cases and deaths reported worldwide and aggregated by week every Thursday.

Distribution of cumulative confirmed cases per 100 000 inhabitants (13/09/21 - 26/09/21)



Le graphique ci-dessous présente l'évolution de l'incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants pour les pays desquels les voyageurs, ayant rempli un PLF, arrivent majoritairement en Belgique. Ce graphique a uniquement une visée descriptive de la situation épidémiologique basée sur cet indicateur, et n'a pas pour objet de faire une comparaison entre pays. Il doit être interprété avec prudence car l'incidence cumulée sur 14 jours peut être influencée par différents facteurs tels que la stratégie de testing et les mesures en place dans les différents pays.



Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 2 weeks (13/09/21-26/09/21)	Incidence/100,000 for the last 2 weeks (13/09/21-26/09/21)
Lithuania	327 896	4 946	18 041	646
United Kingdom	7 664 230	136 168	437 954	643
Slovenia	290 994	4 857	13 141	627
Estonia	153 926	1 346	7 042	530
Romania	1 199 761	36 450	77 108	399
Latvia	154 786	2 684	7 593	398
Croatia	400 108	8 606	16 026	395
Ireland	384 677	5 209	18 018	363
Bulgaria	492 861	20 489	21 589	311
Austria	732 259	10 736	25 611	288
Greece	645 969	14 679	30 812	287
Belgium	1 238 782	25 568	27 947	243
Slovakia	798 921	12 596	12 782	234
Cyprus	119 767	552	1 836	207
Norway	186 926	850	10 792	201
Luxembourg	77 762	835	1 130	180
Netherlands	1 996 455	18 150	25 674	147
Liechtenstein	3 445	60	55	142
Germany	4 199 400	93 403	116 249	140
France	6 994 319	116 463	89 248	133
Iceland	11 722	33	443	122
Portugal	1 067 175	17 955	11 133	108
Finland	139 405	1 069	5 767	104
Sweden	1 150 105	14 850	10 569	102
Italy	4 660 314	130 697	53 901	90
Denmark	357 370	2 646	4 734	81
Spain	4 951 640	86 298	36 375	77
Malta	37 103	457	310	60
Czechia	1 689 620	30 454	6 305	59
Hungary	821 261	30 171	5 656	58
Poland	2 903 655	75 572	9 736	26

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

6. Annexes

6.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	30/8-5/9	6/9-12/9	13/9-19/9	20/9-26/9
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	1 963	1 959	2 060	1 935
Temps de doublement ^(b)	189	2297	96	77
Taux de reproduction ^(c)	0,975	1,003	1,021	0,971
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	2 449	2 595	2 869	2 882
Taux de positivité ^(a)	5,5%	5,1%	4,8%	4,5%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	242	238	244	243
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	69	61	61	51
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	4,18	3,70	3,73	3,08
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	687	681	709	667
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	229	218	215	202
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	11%	11%	11%	10%
Moyenne journalière de décès COVID-19	7	7	6	8
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	0	1	1	1
Indicateur de vaccination				
Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a)	23 705	13 615	13 436	19 062
Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g)	84,3%	85,3%	85,9%	86,4%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

6.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 24 AOÛT 2021 ET LE 30 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
24/08/21	2 451	
25/08/21	2 395	
26/08/21	2 182	14 383 cas au cours de cette période de 7 jours
27/08/21	2 215	Soit 2 054,7 cas en moyenne par jour
28/08/21	1 370	Soit une incidence sur une semaine de 125,1/100 000 habitants
29/08/21	832	
30/08/21	2 938	
31/08/21	2 355	
01/09/21	2 220	
02/09/21	2 107	13 587 cas au cours de cette période de 7 jours
03/09/21	2 151	Soit 1 941,0 cas en moyenne par jour
04/09/21	1 239	Soit une incidence sur une semaine de 118,2/100 000 habitants
05/09/21	731	
06/09/21	2 784	
07/09/21	2 356	
08/09/21	2 180	
09/09/21	2 096	13 842 cas au cours de cette période de 7 jours
10/09/21	2 320	Soit 1 977,4 cas en moyenne par jour
11/09/21	1 300	Soit une incidence sur une semaine de 120,4/100 000 habitants
12/09/21	676	
13/09/21	2 914	
14/09/21	2 491	
15/09/21	2 312	
16/09/21	2 420	14 435 cas au cours de cette période de 7 jours
17/09/21	2 380	Soit 2 062,1 cas en moyenne par jour
18/09/21	1 255	Soit une incidence sur une semaine de 125,6/100 000 habitants
19/09/21	649	
20/09/21	2 928	
21/09/21	2 220	Soit -8,4% de diminution entre les deux périodes
22/09/21	2 163	Soit une incidence sur une période 14 jours de 240,7 nouveaux cas/100 000 habitants
23/09/21	2 070	13 228 cas au cours de cette période de 7 jours
24/09/21	2 239	Soit 1 889,7 cas en moyenne par jour
25/09/21	1 206	Soit une incidence sur une semaine de 115,1/100 000 habitants
26/09/21	719	
27/09/21	2 611	
28/09/21	2 342	
29/09/21	1 088	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
30/09/21	2	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

6.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 24 AOÛT 2021 ET LE 30 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
24/08/21	46 343	
25/08/21	40 986	
26/08/21	43 131	
27/08/21	50 394	287 000 tests au cours de la semaine, soit 41 000/jour
28/08/21	43 063	
29/08/21	21 232	
30/08/21	41 851	
31/08/21	49 488	
01/09/21	39 392	
02/09/21	41 998	
03/09/21	49 088	278 596 tests au cours de la semaine, soit 39 799/jour
04/09/21	41 274	
05/09/21	19 025	
06/09/21	38 331	
07/09/21	47 171	
08/09/21	45 826	
09/09/21	44 487	
10/09/21	55 052	302 410 tests au cours de la semaine, soit 43 201/jour
11/09/21	45 813	
12/09/21	22 318	
13/09/21	41 743	
14/09/21	59 586	
15/09/21	53 894	
16/09/21	50 416	
17/09/21	56 937	334 674 tests au cours de la semaine, soit 47 811/jour
18/09/21	45 581	
19/09/21	22 394	
20/09/21	45 866	
21/09/21	60 858	
22/09/21	54 173	
23/09/21	51 737	
24/09/21	54 845	327 190 tests au cours de la semaine, soit 46 741/jour
25/09/21	43 910	
26/09/21	20 669	
27/09/21	40 998	
28/09/21	56 112	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
29/09/21	49 846	
30/09/21	2 129	

6.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 27 AOÛT 2021 ET LE 30 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
27/08/21	58		64	596	185	6
28/08/21	69		69	611	194	4
29/08/21	47	454 nouvelles hospitalisations Soit 64,9/jour en moyenne	25	631	191	7
30/08/21	58		27	677	201	23
31/08/21	82		102	668	192	7
01/09/21	66		89	661	193	6
02/09/21	74		81	657	195	9
03/09/21	66		64	683	200	11
04/09/21	80		90	669	218	6
05/09/21	56	478 nouvelles hospitalisations Soit 68,3/jour en moyenne	40	687	229	5
06/09/21	66		39	725	237	2
07/09/21	82		100	702	226	3
08/09/21	64		89	704	220	3
09/09/21	64		72	709	217	8
10/09/21	61		76	703	228	5
11/09/21	47		77	675	219	9
12/09/21	42	424 nouvelles hospitalisations Soit 60,6/jour en moyenne	37	681	218	14
13/09/21	58		45	702	224	26
14/09/21	77		101	699	219	12
15/09/21	62		86	683	215	7
16/09/21	77		80	703	220	9
17/09/21	56		66	713	213	6
18/09/21	57		77	696	213	4
19/09/21	43	388 nouvelles hospitalisations Soit 55,4/jour en moyenne	36	709	215	5
20/09/21	46		33	727	222	18
21/09/21	60		99	684	214	13
22/09/21	61		62	688	217	11
23/09/21	65		73	691	216	11
24/09/21	32		61	662	209	9
25/09/21	52		79	646	196	10
26/09/21	39	380 nouvelles hospitalisations Soit 54,3/jour en moyenne	27	667	202	13
27/09/21	55		28	700	206	8
28/09/21	72		79	702	207	14
29/09/21	66		73	699	217	12
30/09/21	64		62	713	212	12

6.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 24 AOÛT 2021 ET LE 30 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
24/08/21	6	
25/08/21	7	
26/08/21	6	
27/08/21	5	37 décès au cours de la semaine, soit 5,3/jour
28/08/21	4	
29/08/21	4	
30/08/21	5	
31/08/21	4	
01/09/21	7	
02/09/21	6	
03/09/21	6	48 décès au cours de la semaine, soit 6,9/jour
04/09/21	10	
05/09/21	8	
06/09/21	7	
07/09/21	9	
08/09/21	9	
09/09/21	6	
10/09/21	7	52 décès au cours de la semaine, soit 7,4/jour
11/09/21	7	
12/09/21	7	
13/09/21	7	
14/09/21	8	
15/09/21	7	
16/09/21	1	
17/09/21	5	43 décès au cours de la semaine, soit 6,1/jour
18/09/21	9	
19/09/21	7	
20/09/21	6	
21/09/21	5	
22/09/21	11	
23/09/21	10	
24/09/21	7	60 décès au cours de la semaine, soit 8,6/jour
25/09/21	7	
26/09/21	7	
27/09/21	13	
28/09/21	7	
29/09/21	7	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes.
30/09/21	2	

7. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire.
Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.