

COVID-19
EPIDEMIOLOGISCHER BERICHT AUF
WOCHENBASIS
(3. MÄRZ 2023)

Dieser Text ist eine Übersetzung von ausgewählten Wochenberichtsauszügen über Covid-19. Dieser Bericht wurde auf Französisch verfasst. Bei Abweichungen zwischen den verschiedenen Versionen ist die französische Version maßgebend.

1. Kernpunkte

- **Allgemeine Lage:** Die 14-Tage-Inzidenz für COVID-19 Fälle in Belgien beträgt 162 pro 100.000 Einwohner, die 7-Tage-Inzidenz für die Anzahl der Hospitalisierungen liegt bei 7,4 pro 100.000 Einwohner.
- **Anzahl neuer Fälle:** Auf nationaler Ebene stieg die Anzahl der neuen Fälle im Zeitraum vom 20. bis 26. Februar im Vergleich zur vorherigen 7-Tage-Periode weiter leicht an (+8 %). Der R-Wert, der auf der Anzahl der diagnostizierten Fälle basiert, ist im selben Zeitraum zurückgegangen (1,038).
- **Tests und Positivrate:** Die Anzahl der durchgeführten Tests ist mittlerweile zurückgegangen, mit durchschnittlich 5.980 Tests pro Tag im Zeitraum vom 20. bis 26. Februar. Im selben Zeitraum stieg die Positivrate für Belgien weiter an (25,1 %).
- **Hospitalisierungen:** Die Anzahl der neuen Hospitalisierungen stieg im Zeitraum vom 23. Februar bis 1. März verglichen mit der vorherigen 7-Tages-Periode weiter an (+13 %). Die Anzahl der belegten Betten in der Intensivpflege stieg ebenfalls an (+ 25 %).
- **Mortalität:** Die Mortalität im Zusammenhang mit COVID-19 stieg in Woche 8 erneut leicht an. Die gemeldeten Todesfälle ereigneten sich hauptsächlich in Krankenhäusern. In Woche 6 gab es keine statistisch signifikante Übersterblichkeit.
- **Impfung:** Die Wirksamkeit der ersten Auffrischungsimpfung bei Personen ab 65 Jahren wird in den ersten 50 Tagen nach der Verabreichung auf 76,4 % gegen Hospitalisierungen und 84,2 % gegen Aufnahmen auf die Intensivstation geschätzt. Der Anteil der Personen, die in den letzten 6 Monaten eine letzte Impfdosis bekamen betrug 68,4 % bei Personen im Alter von 65 bis 84 Jahren und 56,3 % bei Personen ab 85 Jahren.
- **Surveillance durch Allgemeinmediziner:** Die durchschnittliche Anzahl der Kontakte mit einem Allgemeinmediziner wegen eines COVID-19-Verdachts stieg in KW 8 auf nationaler Ebene leicht an (11 Kontakte pro 100.000 Einwohner pro Tag im Vergleich zu 10 Kontakten in der Vorwoche). Die Inzidenz von Hausarztbesuchen auf Grund von grippeähnlichen Symptomen ist inzwischen zurückgegangen mit 300 Konsultationen pro 100 000 Einwohner in dieser Woche.
- **Surveillance in Senioren- und Pflegeheimen:** Auf nationaler Ebene zeigt die epidemiologische Situation einen leichten Anstieg der Anzahl neuer Fälle unter den Bewohnern und unter dem Personal. Die Anzahl der Krankenhauseinweisungen unter den Bewohnern und die Anzahl der Cluster blieben stabil.
- **Abwasserbasierte Überwachung :** Die Resultate vom 22. Februar zeigen, dass die Viruslast im Abwasser je nach Region variieren; in Flandern war ein Rückgang, in Wallonien und Brüssel ein Anstieg zu verzeichnen.

2. Schlüsselindikatoren – Trends

Zur Überwachung der Entwicklung der Epidemie werden vier Indikatoren verwendet: bestätigte Fälle, neue Hospitalisierungen von laborbestätigten COVID-19-Fällen, Belegung der Intensivstationen (ITS) und Todesfälle. Die Schlüsselindikatoren konzentrieren sich auf das Datum der Diagnose, des Todesfalls oder der Aufnahme in das Krankenhaus. Für die Berechnung dieser Indikatoren werden Daten aus 7-Tage-Zeiträumen verwendet, ebenso wie für deren Vergleich. Die Daten für die 7-Tage-Zeiträume werden als Tagesmittelwerte ausgedrückt; die Entwicklung gibt die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden 7-Tage-Zeiträumen in % an.

Anzahl der Patienten	Insgesamt	Tagesmittelwert während des vorletzten 7-Tage-Zeitraums	Tagesmittelwert während des letzten 7-Tage-Zeitraums	Entwicklung
Bestätigte COVID-19-Fälle	4 727 795	1 284	1 391*	+8%
In ein Krankenhaus aufgenommen	149 875***	115,1	129,7**	+13%
Todesfälle****	33 775	7,6	8,0*	+6%
<i>Im Krankenhaus</i>	23 083	6,3	7,3	+16%
<i>Im Seniorenheim</i>	10 499	1,3	0,7	-44%

*Vom 20 Februar 2023 bis 26 Februar 2023 (Daten der letzten 3 Tage nicht konsolidiert).

**Vom 23 Februar 2023 bis 1 März 2023.

*** Anzahl der Hospitalisationen seit dem 15. März 2020. Ausführlichere Informationen über die Anzahl der Hospitalisationen finden Sie unter Punkt 5 des Dokuments [Häufig gestellte Fragen](#).

****Todesfälle in allen Einrichtungen.


Belegung von Krankenhausbetten	Mittwoch 22 Februar 2023	Mittwoch 1 März 2023	Entwicklung
Anzahl der belegten Krankenhausbetten	1 589	1 761	+11%
Anzahl der belegten ITS-Betten	60	75	+25%

Die Daten in dieser Tabelle können nicht mit der vorhergehenden verglichen werden. Grund dafür sind mögliche Verzögerungen bei der Meldung der Daten und kleine Korrekturen, die laufend vorgenommen werden können.

2.1. TRENDS


Die vier Schlüsselindikatoren sind unten mit dem gleitenden Durchschnitt über 7 Tage (grüne Linie) dargestellt. Dieser gleitende Durchschnitt wird verwendet, um einen Trend zu veranschaulichen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Kurve geglättet und die täglichen Schwankungen abgeschwächt werden.

Entwicklung der neuen bestätigten Fälle




Quelle: Netzwerk klinischer Labors und nationale Plattform

Entwicklung der Neuaufnahmen von laborbestätigten COVID-19-Fällen in Krankenhäuser




Quelle: Surveillance/Überwachung von Krankenhäusern (Sciensano)

Entwicklung der Anzahl von Patienten auf der ITS



Quelle: Surveillance/Überwachung von Krankenhäusern (Sciensano)

Entwicklung der Anzahl der Todesfälle




Quelle: Surveillance/Überwachung der Mortalität bei COVID-19 (Sciensano)


2.2. AKTUELLE LAGE

Die folgenden Abbildungen zeigen die geografische Verteilung und die Verteilung nach Alter und Geschlecht für die letzten 14 Tage (konsolidierte Daten).

Verteilung der bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner zwischen dem 13/02/23 und dem 26/02/23



Anzahl der bestätigten Fälle nach Altersgruppe und Geschlecht pro 100 000 Einwohner zwischen dem 13/02/23 und dem 26/02/23



Quelle: Netzwerk klinischer Labors und nationale Plattform.
Die für diese Karte verwendete Farbskala ist eine kontinuierliche Skala, die sich automatisch entsprechend der niedrigsten und höchsten gemeldeten Inzidenzen in jeder der belgischen Gemeinden verändert.

Hinweis: Für 102 Fälle waren keine Informationen über Alter und/oder Geschlecht verfügbar.

Sie unter Punkt 2.4 des Dokuments Häufig gestellte Fragen [Häufig gestellte Fragen](#).

Die Verteilung der Anzahl neu diagnostizierter Fälle sowie die Zeit bis zur Verdoppelung (oder Halbierung) der Fälle für Belgien, die einzelnen Provinzen, die Region Brüssel und die deutschsprachige Gemeinschaft sind in der unten folgenden Tabelle dargestellt.

	13/02/23- 19/02/23	20/02/23- 26/02/23	Veränderung (absoluter Wert)	Veränderung (Prozent)	Zeit für Verdoppelung/H albierung (Tage)*	Inzidenz pro 100 000 (14 Tage)**
Belgien	8 991	9 736	745	+8%	61	162
Antwerpen	2 007	2 065	58	+3%	170	216
Brabant wallon	182	167	-15	-8%	56	85
Hainaut	472	581	109	+23%	23	78
Liège***	349	409	60	+17%	31	68
Limburg	692	799	107	+15%	34	168
Luxembourg	104	128	24	+23%	23	80
Namur	170	209	39	+23%	23	76
Oost-Vlaanderen	1 834	1 965	131	+7%	70	246
Vlaams-Brabant	1 028	1 098	70	+7%	74	181
West-Vlaanderen	1 746	1 826	80	+5%	108	295
Region Brüssel- Hauptstadt	335	404	69	+21%	26	60
Deutschsprachige Gemeinschaft	21	45	24	+114%	6	84

*Die Verdopplungszeit (orange) ist ein Maß für exponentielles Wachstum. Es wird die Zeit dargestellt, die benötigt wird, bis sich der Wert der diagnostizierten Fälle verdoppelt. Die Halbierungszeit (grün) hingegen gibt an, wie lange es dauert, bis die Anzahl der diagnostizierten Fälle ihren Wert halbiert hat.

**Die für diese Berechnungen verwendeten Nenner sind die von STATBEL veröffentlichten belgischen Bevölkerungszahlen vom 01.01.2021.

***Die Daten für die Provinz Lüttich beinhalten die der deutschsprachigen Gemeinschaft.

2.3. STRATEGIE FÜR DAS EPIDEMIEMANAGEMENT UND AUSBLICK

Die Risk Assessment Group (RAG) wurde gebeten, Warnstufen vorzuschlagen, die eine politische Entscheidungsfindung auf lokaler oder nationaler Ebene darüber unterstützen sollen, welche Maßnahmen anzuwenden oder zu lockern sind, sobald die Schwellenwerte erreicht werden und die wöchentliche Bewertung der epidemiologischen Lage die Notwendigkeit dafür unterstreicht. Die Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen bleibt immer eine politische Entscheidung, bei der die Analyse und die Meinung der RAG, aber auch andere als nützlich erachtete Elemente berücksichtigt werden. Die Warnstufen sind daher nicht als mechanistisches oder deterministisches Instrument zu betrachten, sondern als Hilfsmittel für die politische Entscheidungsfindung.

Es wurden drei Warnstufen festgelegt, damit die verschiedenen Akteure ihre Maßnahmen koordinieren können. Je nach Warnstufe werden Maßnahmen entweder auf lokaler oder auf nationaler Ebene ergriffen. Die für das Risikomanagement verwendeten Indikatoren und Schwellenwerte wurden von der RAG festgelegt und wurden in der [Bekanntmachung der RAG vom 15. Dezember 2021](#) veröffentlicht.

Jede Woche am Mittwoch bestimmt die RAG die Warnstufe auf nationaler Ebene und Provinzebene auf der Grundlage einer Bewertung der epidemiologischen Situation, bei der unter anderem folgende Indikatoren berücksichtigt werden: Anzahl der neuen Hospitalisationen, Anteil der Betten in der Intensivpflege (ITS), die mit COVID-19-bestätigten Patienten belegt sind, Anzahl der Konsultationen mit Verdacht auf COVID-19 bei Allgemeinmedizinerinnen, Infektionsinzidenz über 14 Tage, R-Wert auf der Grundlage der Anzahl der Fälle, Positivrate. Andere spezifischere Indikatoren wie die Arbeitsbelastung der Allgemeinmediziner oder auch die Durchimpfungsrate können bei Bedarf ebenfalls analysiert werden.

Laut der neuesten epidemiologischen Bewertung der RAG befindet sich Belgien auf der **Entscheidungsebene 2**, mit einem weiteren Anstieg der Viruszirkulation und der Inzidenz von Hospitalisierungen.