

CONTACT Dr. Paul Pardon  
TEL. +32(0)474 85 19 33  
E-MAIL paul.pardon@health.fgov.be

## Fiche coronavirus COVID-19 voor ambulanciers (update: 26/06/2020)

### Nieuwe RMG-richtlijnen ter bevordering van het rationeel gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen

Bij de COVID-19 uitbraak zal het **ambulancepersoneel zich voor elke missie beschermen met een chirurgisch masker**, zelfs als de patiënt niet voldoet aan de criteria voor een mogelijk COVID-19 geval. Het dragen van een FFP2/FFP3-masker wordt aanbevolen tijdens aërosoliserende procedures en langdurig nauw contact (<1.5m en >15 min) met een mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënt die niet in staat is om een chirurgisch masker te dragen (zie noot hieronder).

<b>Causaal agens</b>	
Virus (Coronavirus : SARS-CoV-2)	
Criteria : Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met - minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie <sup>1</sup> of dysgeusie <sup>2</sup> ; OF - minstens twee <sup>3</sup> van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree <sup>4</sup> ; acute verwardheid <sup>4</sup> ; plotse val <sup>4</sup> ; OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...), <u>zonder andere duidelijke oorzaak.</u> ( <a href="#">zie gevalsdefinitie</a> ).	
<b>Wijze van overdracht</b>	
Respiratoir	
<b>Isolatietype</b>	
<b>Respiratoire isolatie: handschoenen en chirurgisch masker + beschermende wegwerpkledij (gele overjas en veiligheidsbril) als er gevaar bestaat voor projectie of contact met lichaamsvloeistoffen.</b> Als het doel van de missie niet duidelijk is, doe dan uit voorzorg uw masker op voordat u de patiënt benadert of houdt een afstand van 1,5 m voor de anamnese van de patiënt. <b>Patiënt voor transport: handhygiëne met hydro-alcoholische oplossing</b> (indien mogelijk eerst handen wassen met water en zeep) <b>en chirurgisch masker.</b> Als de patiënt het masker tijdens het hele transport heeft opgehouden, is er geen speciale decontaminatie nodig. Desinfecteer alleen oppervlakken waar de patiënt contact mee had. Wikkel de patiënt in een laken om het contact met de ambulance te beperken. Indien O <sub>2</sub> nodig is: max 5l/min via zuurstofbril + chirurgisch masker voor patiënt.	
<b>Voor vervoer binnen 112-systeem</b>	<b>Verwittig NC 112 en het ziekenhuis van bestemming via NC 112; begeef u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis na voorafgaand contact.</b> NB : Geen MUG vanaf het begin, tenzij de toestand van de patiënt dit vereist. MUG-begeleiding gebeurt in functie van het oordeel van de MUG-arts.
<b>Voor niet dringend patiëntenvervoer</b>	Controleer of de bestemming voorbereid is om de patiënt te ontvangen.

<sup>1</sup> Anosmie : tijdelijk of permanent totaal verlies van reukzin.

<sup>2</sup> Dysgeusie : gedeeltelijke of totale smaakstoornis.

<sup>3</sup> Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie.

<sup>4</sup> Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.

Maatregelen na interventie		
Voertuig	Indien beschermingsmaatregelen werden genomen voorafgaand aan het ophalen van een patiënt: zie interne procedure voor <b>dagelijkse reiniging</b> (Voorbeeld: procedure 1). Indien geen beschermingsmaatregelen genomen werden: zie interne procedure voor <b>maandelijkse reiniging</b> (Voorbeeld: procedure 2).	
Materiaal	Eenmalig gebruik	Zie interne procedure voor " <b>besmet afval</b> ". <b>Absoluut alles</b> elimineren in 'geel' circuit, hetzij in eigen voorziening, hetzij in ziekenhuis.
	Ander	Zie interne procedure.
Personeel	<b>Handhygiëne. Als de ambulancier symptomen van COVID-19 vertoont</b> , moet hij een arts consulteren (zie procedure " <b>huisartsen</b> " of " <b>ziekenhuis</b> ").	
Kleding	Lakens in contact met de patiënt	Zie interne procedure voor " <b>besmet linnen</b> ". <b>Verplicht</b> achter te laten bij de patiënt in ziekenhuis.
	Persoonlijke bezittingen van ambulanciers	Als kleren bevuild zijn: verwissel en was ze volgens interne procedure voor " <b>besmet linnen</b> ".
		Beschermende wegwerpkledij: grijze zak voor verbranding.
<b>Risico's voor collega's / familie van de ambulancier : -</b>		

### Mededeling betreffende het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de instructies van de Risk Assessment Group voor het gebruik van maskers.

Deze maatregelen gelden alleen in het kader van de COVID-19 epidemie die België doormaakt en moeten worden aangepast aan de epidemiologische situatie van COVID-19 en de beschikbare voorraden:

- Het beheer van de maskers en andere beschermingsmiddelen moet worden **gecentraliseerd en onder één enkel beheer worden geplaatst**.
- Ziekenwagenpersoneel zal zichzelf en de COVID-19-patiënt steeds beschermen door gebruik te maken van **chirurgische maskers**. Er zal ook aan de patiënt een chirurgisch masker aangeboden worden.
- **Alleen bij interventies met risico op aërosolvorming (intubatie, aspiratie van de luchtwegen, reanimatie, ...) en bij langdurig nauw contact (<1.5m en >15min) met een mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënt die niet in staat is een chirurgisch masker te dragen zal er gebruik gemaakt worden van FFP2-maskers<sup>5</sup>**. Deze interventies gaan steeds gepaard met de inzet van een MUG. Omwille dit laatste gegeven zal er aan de MUG-ploeg gevraagd worden om bij correct gebruik van FFP2-maskers door ziekenwagenpersoneel – deze maskers te willen vervangen binnen de dotatie van de ziekenwagen.
- Bij een tekort aan FFP2-maskers mogen zorgverstrekkers chirurgische maskers **in combinatie met een face shield** gebruiken.

<sup>5</sup>Om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te beperken, dient bij voorkeur hetzelfde masker gedragen te worden gedurende de volledige shift. Indien men op een gegeven moment tijdens de shift een aërosolverwekkende procedure tegenkomt, dient er vanaf het begin een FFP2-masker gedragen te worden. Het masker moet vervangen worden wanneer deze duidelijk vuil of nat is, of na een gebruik van maximum 8 uur.

Op de website [www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be) vindt u informatie en veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus.

Hoogachtend,  
Dr. Paul Pardon  
Chief Medical Officer  
Voorzitter Risk Management Group

